



RICCARDO FARISELLI, MICHELE ALEFFI,  
MARIA SPERANZA

*Check List delle Briofite  
dell'Emilia-Romagna*



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
2018

In copertina e nelle immagini del testo: *Tortula revolvens* (Schimp.) G. Roth (fotografie di Michele Aleffi)

Prima edizione 2018

Questo volume è frutto della collaborazione dei tre autori Riccardo Fariselli<sup>1</sup>, Michele Aleffi<sup>2</sup>, Maria Speranza<sup>3</sup> ed è stato sottoposto alla *peer review*.

1 Via Romea 294, 48015 Savio (RA), Italia;

2 Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, Unità di Biodiversità Vegetale e Gestione degli Ecosistemi, Laboratorio ed Erbario di Briologia, Università di Camerino, Via Pontoni 5, 62032 Camerino (MC), Italia;

3 Dipartimento di Scienze e Tecnologia Agro-Alimentari, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Viale Fanin 44, 40127 Bologna, Italia.

Realizzazione editoriale

Federica Rossi, Biblioteca di Agraria “Gabriele Goidanich”

E-mail: federica.rossi@unibo.it

Licenza



Pubblicato in AMS Acta

DOI

ISBN -----

## Sommario

Introduzione	p. 5
Schema tassonomico per le epatiche ( <i>Marchantiophyta</i> )	p. 9
Metodi	p. 9
Schema tassonomico per i muschi ( <i>Bryophyta</i> )	p. 10
Elenco floristico delle epatiche	p. 13
Elenco floristico dei muschi	p. 28
Sintesi della distribuzione delle epatiche in Emilia-Romagna	p. 129
Sintesi della distribuzione dei muschi in Emilia-Romagna	p. 133
Numero di segnalazioni prima e dopo il 1950, per le epatiche ed i muschi in Emilia-Romagna	p. 149
Elenco dei sinonimi delle epatiche	p. 151
Elenco dei sinonimi dei muschi	p. 152
Bibliografia	p. 163



# *Check List delle Briofite dell'Emilia-Romagna*

Riccardo Fariselli, Michele Aleffi, Maria Speranza

## **Riassunto**

Viene presentata una sintesi delle conoscenze in merito alla distribuzione delle briofite in Emilia-Romagna sulla base dei dati disponibili nei lavori pubblicati fino al 2017. Si è costruito un database di oltre 7300 record di cui 6900 effettivamente utilizzati nella compilazione della Check List. Vengono qui riportati gli elenchi delle specie segnalate (epatiche e muschi) suddivise secondo le diverse provincie. All'interno degli elenchi, per ogni segnalazione si indica la località di rinvenimento. Sulla base dei dati disponibili sono presenti in Emilia-Romagna 546 *taxa* (comprendenti specie, sottospecie e varietà) di cui 87 epatiche e 459 muschi.

**Parole chiave:** Briofite, Check List, Emilia-Romagna

## **Introduzione**

Le conoscenze sulla distribuzione delle briofite in Emilia-Romagna sono piuttosto scarse. Gran parte degli studi più importanti sono molto antichi anche se negli ultimi anni si è assistito ad un certo risveglio dell'interesse sull'argomento. Le provincie di Ferrara e Rimini sono pressoché sconosciute. Poco si sa anche di quelle di Piacenza e Ravenna. Per la prima la quasi totalità dei dati risale alla fine dell'Ottocento (Bracciforti 1877). Più cospicuo è l'elenco di specie note per le provincie di Parma e Forlì-Cesena. Anche in questo caso, per quel che riguarda la prima, la maggior parte dei dati risale alla fine dell'Ottocento (Avetta 1897) mentre per la provincia di Forlì-Cesena le ricerche coprono un ampio arco temporale ma se si eccettua uno studio recente di Bonini (2009) la maggior parte delle informazioni disponibili sono piuttosto datate (Del Testa 1903; Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b). Per quel che riguarda il Modenese la quasi totalità dei dati disponibili derivano da lavori di Fiori risalenti anch'essi agli ultimi anni dell'Ottocento (Fiori 1886; Fiori 1892a; Fiori 1892b). La provincia di Reggio Emilia è la più ricca di studi floristici rilevanti e comprende una ricerca molto interessante di Velluti piuttosto recente (Velluti 1993) e parte di una di Aleffi et al. (2014) ma anche in questo caso altre fonti importanti di dati risalgono a circa 120 anni fa e oltre (Fiori 1886; Fiori 1892a; Fiori 1892b; Casali 1899a; Casali 1899b). La provincia di Bologna è quella che ha visto il maggior numero di lavori pubblicati negli ultimi 20 anni (Aleffi & Silenzi 2000, Aleffi et al. 2014 e Fariselli et al. 2017) ma prima di allora anche in questo caso i dati disponibili derivavano in gran parte da un lavoro di fine Ottocento (Farneti 1889).

## **Metodi**

La ricerca si è svolta in più fasi. Innanzi tutto si sono analizzati i lavori comprendenti le segnalazioni floristiche per l'Emilia-Romagna fino al 2017 e si è compilato un database contenente un record per ogni località di rinvenimento di ogni specie segnalata negli articoli. In totale si sono inseriti oltre 7300 record. In seguito è stato effettuato l'aggiornamento della nomenclatura che segue le pubblicazioni di Aleffi et al. (2008) per le epatiche e di Ros et al. (2013) per i muschi. Si è poi provveduto ad attribuire ogni località di rinvenimento alla rispettiva provincia di appartenenza. Dove ciò non è stato possibile a causa delle indicazioni stazionali troppo generiche la segnalazione è stata attribuita all'Emilia (Province di Piacenza, Parma, Reggio

Emilia, Modena, Bologna e Ferrara) oppure alla Romagna (Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini). Parallelemente a questo lavoro si è effettuata un'operazione di scrematura del database eliminando tutte le segnalazioni non appartenenti al territorio regionale presenti negli articoli analizzati o che comunque potevano avere una elevata ambiguità. Per le segnalazioni utilizzate in questo lavoro l'appartenenza alla Regione è certa per le aree interne del territorio regionale mentre una fonte di incertezza è costituita dalle aree di confine. Queste sono rappresentate dai monti che sono condivisi fra l'Emilia-Romagna e la Toscana (Monte Orsaro, Monte Prado, Monte Rondinaio ecc.) oppure da indicazioni stazionali generiche presenti nei lavori più antichi (ad esempio Fitzgerald & Bottini 1881) quali "Alpi di Camporaghena", "Alpi di Mommio", "Alpi di Sillano", "Alpi di Soraggio", toponimi che designano parte della catena appenninica situata fra la provincia di Reggio Emilia e quelle di Massa Carrara e Lucca fra Emilia-Romagna e Toscana. Questi sono i soli casi in cui è possibile incertezza di cui si è tenuto conto nella compilazione degli elenchi floristici. Negli altri casi si è cercato di adottare un criterio prudenziale escludendo le segnalazioni non chiaramente attribuibili al territorio regionale oppure ricadenti immediatamente al di là del confine toscano ed incluse in vecchi lavori floristici relativi al territorio dell'Emilia-Romagna (Valle delle Pozze, Boscolungo ecc.). Sono altresì state escluse le segnalazioni troppo generiche come ad esempio l'indicazione "Appennino toscano-emiliano". Ciò ha in parte ridotto il totale delle segnalazioni utilizzate per la compilazione di questa Check List: dalle oltre 7300 inserite a 6900.

Talvolta sono riportate località di distribuzione inedite il che è evidenziato nel testo. A volte l'incertezza può sussistere anche per l'attribuzione delle segnalazioni tra due province della Regione, in particolare per le località poste al confine fra di esse. Ad esempio l'indicazione "Sopra Rigoso" potrebbe indicare stazioni situate nella provincia di Parma ma non è del tutto esclusa la possibilità che si riferisca a stazioni della provincia di Reggio Emilia. In tali eventualità si è riportata la segnalazione nella provincia a cui appartiene la località menzionata. Qualora invece la segnalazione si riferisca a toponimi condivisi fra due province (ad esempio Monte Cappellbuso fra Modena e Bologna) si è deciso di riportare la segnalazione in entrambe le province. Gli elenchi floristici sono preceduti dai due schemi tassonomici riportati in ordine alfabetico che seguono Crandall-Stotler et al. (2009) per le epatiche e Goffinet et al. (2009) per i muschi eccetto i generi *Alleniella* S. Olsson, Enroth & D. Quandt, *Exsertotheca* S. Olsson, Enroth & D. Quandt, *Imbribryum* N. Pedersen, *Nyholmiella* Holmen & Warncke e *Sarmentypnum* Tuom. & T.J. Kop. che non sono considerati nella pubblicazione. All'interno dei due elenchi floristici le specie sono elencate in ordine alfabetico. Per pochissime specie, 19 in tutto di cui 2 epatiche e 17 muschi, dopo le segnalazioni derivanti dalle pubblicazioni, è presente una sezione denominata Erbario Crittogamico Italiano. L'Erbario Crittogamico Italiano (E.C.I.) fu pubblicato in due serie, la prima dal 1858 al 1866 e la seconda dal 1868 al 1885. I fascicoli dell'Erbario sono in parte introvabili ed i dati qui utilizzati sono stati ricavati da una pubblicazione di Cuccuini (1997) nella quale venivano indicati, oltre ai dati dei campioni, la provincia di raccolta degli stessi. Le due epatiche dell'E.C.I. sono trattate in dettaglio nel lavoro di Massalongo (1903) che costituisce una revisione dei campioni delle epatiche dell'Erbario Crittogamico Italiano. Proseguendo nella descrizione della struttura del testo della Check List si evidenzia come le segnalazioni derivanti da revisione di materiale d'erbario sono riportate in una sezione distinta nell'ambito delle relative specie denominata Dati d'erbario adottando il seguente formato: Località di rinvenimento, Dati del campione (Riferimento bibliografico). Gli erbari citati in questo lavoro sono quelli di Firenze [FI], Pisa [PI], Camerino [CAME], Stoccolma [S] e l'erbario privato Poelt [H-POELT]. Le segnalazioni sono ordinate sulla base dell'anno di raccolta dei campioni.

Occorre sottolineare come a volte, in particolare per quel che riguarda gli sfagni, per una stessa località sono presenti in letteratura diversi campioni appartenenti alla stessa specie; qui ne viene citato solo uno, quello più recente. Successivamente, all'interno del testo delle singole specie, può comparire una sezione denominata Ecologia che contiene le indicazioni riportate a tale riguardo nei diversi articoli ed in seguito un campo Altitudine nel quale sono indicate le quote di rinvenimento oppure informazioni più generiche quali le fasce altitudinali di distribuzione delle specie, tratte anche in questo caso dal testo delle pubblicazioni. A tale proposito occorre evidenziare come i dati numerici relativi alla quota siano presenti quasi sempre in articoli che hanno quale area di studio alcune delle porzioni più elevate della Regione per cui questo tipo di informazione risulta in parte distorta. Sono infatti molto rare le segnalazioni di quote inferiori ai 1000 m.

I dati di quota derivanti da revisione di materiale d'erbario presentano il seguente formato: valore di quota (Riferimento bibliografico, "dati d'erbario" Dati del campione). L'ordine di presentazione è quello della data di pubblicazione dell'articolo mentre per quel che riguarda il materiale d'erbario è costituito dalla data di raccolta dei campioni. Nell'elencazione dei dati i valori numerici originali precedono quelli derivanti da revisione di materiale d'erbario mentre in fondo sono poste le indicazioni generali sulle fasce altitudinali. Anche in questo caso, così come è avvenuto per località le cui segnalazioni derivavano da revisione di materiale d'erbario, per uno stesso valore di quota possono essere presenti più campioni appartenenti alla medesima specie. Viene qui citato solo il campione più recente. Successivamente nel testo può essere presente un campo Note. Al termine degli elenchi floristici sono inserite le tre tabelle di sintesi dei dati delle segnalazioni. Per le tabelle 1 e 2 viene adottata la simbologia di seguito indicata:

- segnalazione anteriore al 1950
- segnalazione del 1950 o posteriore
- (○) segnalazione dubbia anteriore al 1950
- (●) segnalazione dubbia del 1950 o posteriore

Nelle tabelle le sigle delle diverse province sono le seguenti: PC = Piacenza, PR = Parma, RE = Reggio Emilia, MO = Modena, BO = Bologna, FE = Ferrara, RA = Ravenna, FC = Forlì-Cesena, RN = Rimini (Figura 1). Le sigle EM, RO ed ER corrispondono rispettivamente ad Emilia, Romagna ed Emilia-Romagna. Queste ultime contengono la sintesi dei dati delle province che le compongono oltre a dati più generici che non è stato possibile attribuire con precisione a nessuna provincia come già evidenziato. Per la determinazione dell'anno della segnalazione delle specie all'interno delle tabelle 1 e 2 si considera ovviamente l'anno dell'articolo.

Nei casi invece di segnalazioni derivanti da revisione di materiale d'erbario, è stato adottato il seguente criterio: l'anno non sarà quello dell'articolo in esame bensì quello di raccolta del campione che è stato revisionato. Ad esempio nella pubblicazione di Raffaelli (1973) sul genere *Andreaea* vengono utilizzati come fonti delle segnalazioni campioni risalenti alla fine del 1800. In questo caso le segnalazioni riportate sono quindi antecedenti al 1950 e non fanno riferimento all'anno 1973 in cui è stato pubblicato l'articolo. Nel lavoro di Raffaelli sugli sfagni tosco-emiliani (1976) si utilizzano invece sia campioni d'erbario sia indagini originali. In questo caso le segnalazioni saranno considerate antecedenti al 1950 qualora si utilizzino, analogamente a quanto esposto in precedenza, campioni risalenti al secolo scorso (ad esempio i campioni di Lunardi o di Bottini risalenti al secondo decennio del 1900) mentre le segnalazioni saranno considerate successive al 1950 quando il lavoro citerà esplicitamente la presenza di dati originali. Si è applicato tale criterio anche nel caso di citazioni di segnalazioni precedenti. Ad esempio la segnalazione per il forlivese di *Aloina ambigua* di Zangheri (1959) deriva in realtà da una citazione di un lavoro di Del Testa del 1903. In questo caso la segnalazione è da considerarsi anteriore al 1950. Una situazione simile si riscontra negli studi di Zodda (1921) e di Zangheri (1966b). Zodda riporta di aver ricevuto i campioni utilizzati nella compilazione del suo articolo da Zangheri il quale a sua volta cita tra le fonti impiegate per redigere il suo elenco lo stesso studio di Zodda. È da ritenere quindi che qualora i dati della pubblicazione di Zangheri coincidano con quelli di Zodda essi derivino dai medesimi campioni e siano di conseguenza identici. In tal caso in questo lavoro si è considerata la data delle segnalazioni presenti nell'elenco di Zangheri come anteriore al 1950 attribuendola cioè al 1921 (data dell'articolo di Zodda) e non al 1966 (data della pubblicazione di Zangheri). Un discorso analogo si riscontra per la segnalazione di *Orthotrichum shawii* nelle pubblicazioni di Dismier (1929) e Zangheri (1966b). Si è applicato tale criterio ogni volta che questo genere di informazioni è disponibile nelle pubblicazioni.

All'interno della tabella 3, contenente i valori numerici riassuntivi, vengono conteggiate anche le segnalazioni dubbie. Al termine del lavoro, prima della bibliografia, è riportato l'elenco dei sinonimi delle epatiche e dei muschi. I sinonimi sono anche indicati in una sezione apposita dell'elenco floristico.

Le abbreviazioni utilizzate per le sinonimie all'interno degli elenchi floristici e negli elenchi conclusivi sono le seguenti:

*hom. illeg.* = nome con la stessa ortografia di un altro nome, ma pubblicato più tardi (non può essere usato).

*nom. inval.* = *nomen invalidum*, nome non validamente pubblicato.

*nom. inval. err. orthogr.* = *nomen invalidum* per errore di ortografia.

*nom. inval. in synon.* = nome non validamente pubblicato perché menzionato in sinonimia.

*nom. illeg.* = *nomen illegitimum*, nome contrario alle regole della nomenclatura.

*nom. illeg. incl. spec. prior.* = nome specifico illegittimo perché nomenclaturalmente superfluo quando è stato pubblicato. La specie come descritta dal suo autore includeva il tipo di un epiteto specifico che avrebbe dovuto essere adottato secondo le regole nomenclaturali.

*nom. illeg. incl. typ. spec.* = La specie come descritta dal suo autore includeva il nome del tipo della specie che avrebbe dovuto essere adottato secondo le regole nomenclaturali. Il nome specifico non è stato citato come tale nella sinonimia del nome illegittimo.

*nom. illeg. incl. var. prior.* = come nel caso di *nom. illeg. incl. spec. prior.*, ma in questo caso riferito al rango di varietà.

*nom. rejic.* = *nomen rejiciendum*, nome da rifiutare a favore di un nome successivo da mantenere.

Si segnalano in conclusione alcune pubblicazioni utili per il reperimento delle informazioni necessarie alla compilazione dell'elenco floristico le più importanti delle quali sono le Check List delle epatiche e dei muschi d'Italia (Aleffi & Schumacker 1995; Aleffi 2005; Cortini-Pedrotti 1992; Cortini-Pedrotti 2001; Aleffi et al. 2008) e del Mediterraneo (Ros et al. 2007; Ros et al. 2013).




Figura 1. La Regione Emilia-Romagna. Le sigle si riferiscono alle diverse provincie.  
In verde scuro l'Emilia e in verde chiaro la Romagna.



**Schema tassonomico per le epatiche (*Marchantiophyta*)**

**Marchantiopsida Gonquist, Takht & W. Zimm.**

- Lunulariales D.G. Long
  - Lunulariaceae H. Klinggr. (1)
    - Lunularia* Adans. (1)
- Marchantiales Limpr.
  - Aytoniaceae Cavers (3)
    - Mannia* Opiz (2)
    - Reboulia* Raddi (1)
  - Conocephalaceae Müll. Frib. ex Grolle (1)
    - Conocephalum* Hill (1)
  - Marchantiaceae (Bisch.) Lindl. (2)
    - Marchantia* L. (1)
    - Preissia* Corda (1)
  - Ricciaceae Rchb. (8)
    - Riccia* L. (7)
    - Ricciocarpos* Corda (1)
  - Targioniaceae Dumort. (1)
    - Targionia* L. (1)
  - Sphaerocarpaceae Cavers
    - Sphaerocarpaceae Heeg (1)
      - Sphaerocarpos* Boehm. (1)

**Jungermanniopsida Stotler & Crand.-Stotl.**

- Fossombroniales Schljakov
  - Fossombroniaceae Hazslinszky (1)
    - Fossombronia* Raddi (1)
- Jungermanniales H. Klinggr.
  - Antheliaceae R.M. Schust. (1)
    - Anthelia* (Dumort.) Dumort. (1)
  - Arnelliaceae Nakai (1)
    - Southbya* Spruce (1)
  - Calypogeiaceae (Müll. Frib.) Arnell (1)
    - Calypogeia* Raddi (1)
  - Cephaloziaceae Mig. (3)
    - Cephalozia* (Dumort.) Dumort. (2)
    - Odontoschisma* (Dumort.) Dumort. (1)
  - Cephaloziellaceae Douin (5)
    - Cephaloziella* (Spruce) Schiffn. (5)
  - Gymnomitriaceae H. Klinggr. (6)
    - Eremonotus* Lindb. & Kaal. ex Pearson (1)
    - Gymnomitrium* Corda (1)
    - Marsupella* Dumort. (4)
  - Jungermanniaceae Rchb. (5)
    - Jungermannia* L. (4)
    - Nardia* Gray (1)

- Lophocoleaceae Vanden Bergen (6)
  - Chiloscyphus* Corda (2)
  - Lophocolea* (Dumort.) Dumort. (4)
- Plagiochilaceae (Jörg.) Müll. Frib. (3)
  - Pedinophyllum* (Lindb.) Lindb. (1)
  - Plagiochila* (Dumort.) Dumort. (2)
- Pseudolepicoleaceae Fulford & J. Taylor (1)
  - Blepharostoma* (Dumort.) Dumort. (1)
- Scapaniaceae Mig. (19)
  - Anastrophyllum* (Spruce) Steph. (1)
  - Barbilophozia* Loeske (2)
  - Diplophyllum* (Dumort.) Dumort. (2)
  - Gymnocolea* (Dumort.) Dumort. (1)
  - Leiocolea* (Müll. Frib.) H. Buch (2)
  - Lophozia* (Dumort.) Dumort. (4)
  - Scapania* (Dumort.) Dumort. (6)
  - Tritomaria* Schiffn. ex Loeske (1)

**Metzgeriales Chalaud**

- Aneuraceae H. Klinggr. (2)
  - Aneura* Dumort. (1)
  - Riccardia* Gray (1)
- Metzgeriaceae H. Klinggr. (2)
  - Apometzgeria* Kuwah. (1)
  - Metzgeria* Raddi (1)

**Pelliales He-Nygrèn, Juslén, Ahone, Glenney & Piippo**

- Pelliaceae H. Klinggr. (2)
  - Pellia* Raddi (2)

**Porellales Schljakov**

- Frullaniaceae Lorch (3)
  - Frullania* Raddi (3)
- Lejeuneaceae Cavers (3)
  - Cololejeunea* (Spruce) Schiffn. (1)
  - Lejeunea* Lib. (1)
  - Marchesinia* Gray (1)
- Porellaceae Cavers (3)
  - Porella* L. (3)
- Radulaceae Müll. Frib. (2)
  - Radula* Dumort. (2)

**Ptilidiales Schljakov**

- Ptilidiaceae H. Klinggr. (1)
  - Ptilidium* Nees (1)

## Schema tassonomico per i muschi (*Bryophyta*)

### Sphagnopsida Ochyra

- Sphagnales Limpr.
- Sphagnaceae Dumort. (21)
- Sphagnum* L. (21)

### Andreaeopsida Rothm.

- Andreaeales Limpr.
- Andreaeaceae Dumort. (1)
- Andreaea* Hedw. (1)

### Polytrichopsida Doweld

- Polytrichales M. Fleisch.
- Polytrichaceae Schwägr. (13)
- Atrichum* P. Beauv. (2)
- Oligotrichum* Lam. & DC. (1)
- Pogonatum* P. Beauv. (3)
- Polytrichastrum* G.L. Sm. (2)
- Polytrichum* Hedw. (5)

### Bryopsida Rothm.

- Archidiales Limpr.
- Archidiaceae Schimp. (1)
- Archidium* Brid. (1)
- Bartramiales D. Quandt, N.E. Bell & Stech
- Bartramiaceae Schwägr. (9)
- Bartramia* Hedw. (3)
- Philonotis* Brid. (5)
- Plagiopus* Brid. (1)
- Bryales Limpr.
- Bryaceae Schwägr. (27)
- Anomobryum* Schimp. (1)
- Bryum* Hedw. (13)
- Imbriobryum* N. Pedersen (2)
- Ptychostomum* Hornsch. (11)
- Catoscopiaceae Broth. (1)
- Catoscopium* Brid. (1)
- Mniaceae Schwägr. (28)
- Mielichhoferia* Nees & Hornsch. (1)
- Mnium* Hedw. (6)
- Plagiomnium* T.J. Kop. (7)
- Pohlia* Hedw. (12)
- Rhizomnium* (Broth.) T.J. Kop. (2)
- Dicranales H. Philib. ex M. Fleisch.
- Dicranaceae Schimp. (13)
- Dicranella* (Müll. Hal.) Schimp. (6)
- Dicranum* Hedw. (5)
- Paraleucobryum* (Limpr.) Loeske (1)
- Pseudephemerum* (Lindb.) I. Hagen (1)

- Ditrichaceae Limpr. (12)
- Ceratodon* Brid. (1)
- Distichium* Bruch & Schimp. (2)
- Ditrichum* Hampe (6)
- Pleuridium* Rabenh. (1)
- Saelania* Lindb. (1)
- Trichodon* Schimp. (1)
- Fissidentaceae Schimp. (12)
- Fissidens* Hedw. (12)
- Leucobryaceae Schimp. (3)
- Campylopus* Brid. (1)
- Dicranodontium* Bruch & Schimp. (1)
- Leucobryum* Hampe (1)
- Rhabdoweisiaceae Limpr. (12)
- Amphidium* Schimp. (1)
- Cynodontium* Schimp. (4)
- Dichodontium* Schimp. (3)
- Dicranoweisia* Milde (1)
- Hymenoloma* Dusén (1)
- Kiaeria* I. Hagen (1)
- Oncophorus* (Brid.) Brid. (1)
- Diphysciales M. Fleisch.
- Diphysciaceae M. Fleisch. (1)
- Diphyscium* D. Mohr (1)
- Encalyptales Dixon
- Encalyptaceae Schimp. (5)
- Encalypta* Hedw. (5)
- Funariales M. Fleisch.
- Funariaceae Schwägr. (6)
- Entosthodon* Schwägr. (3)
- Funaria* Hedw. (2)
- Physcomitrium* (Brid.) Brid. (1)
- Grimmiales M. Fleisch.
- Grimmiaceae Arn. (28)
- Grimmia* Hedw. (13)
- Racomitrium* Brid. (8)
- Schistidium* Bruch & Schimp. (7)
- Seligeriaceae Schimp. (6)
- Blindia* Bruch & Schimp. (1)
- Brachyodontium* Fürnr. (1)
- Seligeria* Bruch & Schimp. (4)
- Hedwigiales Ochyra
- Hedwigiaceae Schimp. (1)
- Hedwigia* P. Beauv. (1)
- Hypnales (M. Fleisch.) W.R. Buck & Vitt
- Amblystegiaceae G. Roth (18)
- Amblystegium* Schimp. (1)

- Campyliadelphus* (Kindb.) R.S. Chopra (1)  
*Campylium* (Sull.) Mitt. (2)  
*Cratoneuron* (Sull.) Spruce (1)  
*Drepanocladus* (Müll. Hal.) G. Roth (1)  
*Hygroamblystegium* Loeske (2)  
*Hygrohypnum* Lindb. (2)  
*Leptodictyum* (Schimp.) Warnst. (1)  
*Palustriella* Ochyra (3)  
*Pseudoamblystegium* Vanderp. & Hedenäs (1)  
*Sanionia* Loeske (1)  
*Scorpidium* (Schimp.) Limpr. (2)  
Anomodontaceae Kindb. (3)  
*Anomodon* Hook & Taylor (3)  
Brachytheciaceae Schimp. (43)  
*Brachytheciastrum* Ignatov & Huttunen (3)  
*Brachythecium* Schimp. (9)  
*Cirriphyllum* Grout (2)  
*Eurhynchiastrum* Ignatov & Huttunen (1)  
*Eurhynchium* Bruch & Schimp. (1)  
*Homalothecium* Schimp. (3)  
*Kindbergia* Ochyra (1)  
*Microeurhynchium* Ignatov & Vanderp. (1)  
*Oxyrrhynchium* (Schimp.) Warnst. (3)  
*Plasteurhynchium* Broth. (2)  
*Pseudoscleropodium* (Limpr.) M. Fleisch. (1)  
*Rhynchostegiella* (Schimp.) Limpr. (2)  
*Rhynchostegium* Bruch & Schimp. (5)  
*Sciuro-hypnum* (Hampe) Hampe (6)  
*Scleropodium* Bruch & Schimp. (1)  
*Scorpiurium* Schimp. (1)  
*Tomentypnum* Loeske (1)  
Calliergonaceae Vanderp., Hedenäs, C.J. Cox & A.J. Shaw (6)  
*Calliergon* (Sull.) Kindb. (2)  
*Hamatocaulis* Hedenäs (1)  
*Sarmentypnum* Tuom. & T.J. Kop. (1)  
*Straminergon* Hedenäs (1)  
*Warnstorfia* Loeske (1)  
Climaciaceae Kindb. (1)  
*Climacium* F. Weber & D. Mohr (1)  
Cryphaeaceae Schimp. (1)  
*Cryphaea* D. Mohr (1)  
Entodontaceae Kindb. (2)  
*Entodon* Müll. Hal. (2)  
Fabroniaceae Schimp. (1)  
*Fabronia* Raddi (1)  
Fontinalaceae Schimp. (4)  
*Fontinalis* Hedw. (4)  
Hylocomiaceae M. Fleisch (7)  
*Ctenidium* (Schimp.) Mitt. (1)  
*Hylocomiastrum* Broth. (1)  
*Hylocomium* Bruch & Schimp. (1)  
*Pleurozium* Mitt. (1)  
*Rhytidiadelphus* (Limpr.) Warnst. (3)  
Hypnaceae Schimp. (22)  
*Calliergonella* Loeske (2)  
*Campylophyllum* (Schimp.) M. Fleisch. (3)  
*Herzogiella* Broth. (1)  
*Homomallium* (Schimp.) Loeske (1)  
*Hypnum* Hedw. (10)  
*Isopterygiopsis* Z. Iwats. (1)  
*Orthothecium* Bruch & Schimp. (1)  
*Pseudotaxiphyllum* Z. Iwats. (1)  
*Pylaisia* Schimp. (1)  
*Taxiphyllum* M. Fleisch. (1)  
Lembophyllaceae Broth. (2)  
*Isothecium* Brid. (2)  
Leptodontaceae Schimp. (1)  
*Leptodon* D. Mohr (1)  
Leskeaceae Schimp. (9)  
*Lescuraea* Schimp. (5)  
*Leskea* Hedw. (1)  
*Pseudoleskeella* Kindb. (3)  
Leucodontaceae Schimp. (3)  
*Antitrichia* Brid. (1)  
*Leucodon* Schwägr. (1)  
*Nogopterium* Crosby & W.R. Buck (1)  
Neckeraceae Schimp. (6)  
*Alleniella* S. Olsson, Enroth & D. Quandt (1)  
*Exsertotheca* S. Olsson, Enroth & D. Quandt (1)  
*Homalia* Brid. (1)  
*Neckera* Hedw. (2)  
*Thamnobryum* Nieuwl. (1)  
Plagiotheciaceae (Broth) M. Fleisch. (8)  
*Plagiothecium* Bruch & Schimp. (8)  
Pterigynandraceae Schimp. (5)  
*Heterocladium* Bruch & Schimp. (2)  
*Myurella* Bruch & Schimp. (2)  
*Pterigynandrum* Hedw. (1)  
Pylaisiadelphaceae Goffinet & W.R. Buck (1)  
*Platygyrium* Bruch & Schimp. (1)  
Rhytidiaceae Broth. (1)  
*Rhytidium* (Sull.) Kindb. (1)  
Sematophyllaceae Broth. (1)  
*Sematophyllum* Mitt. (1)

- Thuidiaceae Schimp. (5)  
*Abietinella* Müll. Hal. (1)  
*Thuidium* Bruch & Schimp. (4)
- Orthotrichales Dixon  
 Orthotrichaceae Arn. (23)  
*Nyholmiella* Holmen & Warncke (1)  
*Orthotrichum* Hedw. (17)  
*Ulotia* D. Mohr (3)  
*Zygodon* Hook. & Taylor (2)
- Pottiales M. Fleisch.  
 Pottiaceae Schimp. (80)  
*Acaulon* Müll. Hal. (1)  
*Aloina* Kindb. (3)  
*Barbula* Hedw. (2)  
*Bryoerythrophyllum* PC. Chen (1)  
*Cinclidotus* P. Beauv. (2)  
*Crossidium* Jur. (2)  
*Didymodon* Hedw. (12)  
*Eucladium* Bruch & Schimp. (1)  
*Gymnostomum* Nees & Hornsch. (3)  
*Gyroweisia* Schimp. (1)  
*Hymenostylium* Brid. (1)  
*Leptobarbula* Schimp. (1)  
*Microbryum* Schimp. (1)
- Oxystegus* (Broth.) Hilp. (1)  
*Pottiopsis* Blockeel & A.J.E. Sm. (1)  
*Pseudocrossidium* R.S. Williams (2)  
*Pterygoneurum* Jur. (2)  
*Syntrichia* Brid. (7)  
*Timmiella* (Lindb.) Limpr. (1)  
*Tortella* (Müll. Hal.) Limpr. (9)  
*Tortula* Hedw. (17)  
*Trichostomum* Bruch (2)  
*Weissia* Hedw. (7)
- Rhizogoniales Goffinet & W.R. Buck  
 Aulacomniaceae Schimp. (1)  
*Aulacomnium* Schwägr. (1)
- Splachnales Ochyra  
 Meesiaceae Schimp. (2)  
*Leptobryum* (Bruch & Schimp.) Wilson (1)  
*Meesia* Hedw. (1)
- Splachnaceae Grev. & Arn. (2)  
*Splachnum* Hedw. (1)  
*Tetraplodon* Bruch & Schimp. (1)
- Timmiales Ochyra  
 Timmiaceae Schimp. (1)  
*Timmia* Hedw. (1)

## Elenco floristico delle epatiche

### *Marchantiophyta*

#### *Anastrophyllum* (Spruce) Steph. (Scapaniaceae)

*Anastrophyllum minutum* (Schreb.) R. M. Schust.

*SINONIMI*: *Jungermannia bicornis* F. Weber & D. Mohr

**Ravenna**: Pinete di Ravenna (Zangheri 1925)

*ECOLOGIA*: Sulle radici degli alberi (Zangheri 1925)

#### *Aneura* Dumort. (Aneuraceae)

*Aneura pinguis* (L.) Dumort.

*SINONIMI*: *Aneura pinguis* (L.) Dumort. var. *angustior* (Hook.) Dumort.; *Riccardia pinguis* (L.) Gray; *Jungermannia pinguis* L.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Paduli di Cima (Gerdol & Tomaselli 1993) –

**Reggio Emilia**: Roncoesi tra il Crostolo e la Modolena (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena**: Fiume Secchia a Campogalliano (Fiori 1892a) – **Emilia**: Emilia (Zodda 1934)

*ECOLOGIA*: Cresce sulle rive dei ruscelli, dei canali, non che sulla terra umida dei boschi (Bracciforti 1877); Sulle sabbie umide (Fiori 1892a)

*ALTITUDINE*: 1200 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

#### *Anthelia* (Dumort.) Dumort. (Antheliaceae)

*Anthelia juratzkana* (Limpr.) Trevis.

**Reggio Emilia**: Monte Prado (Tomaselli 1991; Rossi & Ferrari 1994)

*NOTE*: La pubblicazione di Tomaselli (1991) è uno studio fitosociologico sulla classe *Salicetea herbaceae* nell'Appennino settentrionale in cui la localizzazione dei rilievi non è riportata in dettaglio ma nella quale vengono indicate genericamente le aree di rilevamento rappresentate dalle zone di Monte Giovo e Monte Cimone (Modenese) e di Monte Cusna e Monte Prado (Reggiano). È comunque possibile in diversi casi stabilire almeno la provincia in cui sono stati eseguiti i rilievi sulla base di quanto è riportato nell'articolo e cioè la presenza dell'associazione *Salicetum herbaceae* solo a Monte Prado ed inoltre la misurazione di alcuni parametri ecologici solo in alcuni rilievi (indicati nel testo) eseguiti nelle stazioni reggiane. I dati della pubblicazione di Rossi & Ferrari (1994) sono in gran parte dedotti dalla letteratura precedente

#### *Apometzgeria* Kuwah. (Metzgeriaceae)

*Apometzgeria pubescens* (Schrank) Kuwah.

*SINONIMI*: *Metzgeria pubescens* (Schrank) Raddi

**Parma**: Monte Orsaio (Barsali 1907) – **Reggio Emilia**: Monte Casarola (Casali 1899a; Casali 1899b) –

**Modena**: Monte Modino a Frassinoro (Fiori 1892a) – **Bologna**: Madonna dell'Acero (Fiori 1892a)

*ECOLOGIA*: Boschi (Fiori 1892a; Casali 1899a; Casali 1899b)

*ALTITUDINE*: Alto Appennino (Casali 1899b)

#### *Barbilophozia* Loeske (Scapaniaceae)

*Barbilophozia barbata* (Schmidel ex Schreb.) Loeske

**Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

***Barbilophozia lycopodioides*** (Wallr.) Loeske

**Reggio Emilia:** Passo della Cisa, Monte Prado, Monte Ravino, Monte Cusna (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Radici di faggio e suolo in un faggeto, suolo in una prateria discontinua di crinale, arenaria e suolo in un vacciniato (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1450 m, 1460 m, 1560 m, 1600 m, 1750 m, 1770 m, 1980 m, 1990 m, 2000 m (Velluti 1993)

**NOTE:** All'interno del lavoro di Velluti (1993) si intende sempre il Passo della Cisa in provincia di Reggio Emilia e non quello più noto in provincia di Parma

***Blepharostoma*** (Dumort.) Dumort. (Pseudolepicoleaceae)

***Blepharostoma trichophyllum*** (L.) Dumort.

**SINONIMI:** *Jungermannia trichophylla* L.

**Parma:** Monte Gottro (Bertoloni 1859) – **Reggio Emilia:** Monte Ravino, Monte Prado (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Microconglomerato in un faggeto e suolo in un vacciniato (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1450 m, 1770 m (Velluti 1993)

***Calypogeia*** Raddi (Calypogeiaceae)

***Calypogeia fissa*** (L.) Raddi

**SINONIMI:** *Kantia trichomanis* (L.) Gray var. *fixa* (L.) Lindb.

**Reggio Emilia:** La Veggia presso Sassuolo (Fiori 1892a citato in Casali 1899b) – **Forlì-Cesena:** Polenta (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Sulla terra ombrosa (Fiori 1892a; Casali 1899b); Terreno (Zangheri 1966b)

**NOTE:** Il lavoro di Zangheri (1966b) è basato su campioni raccolti in diversi casi anche moltissimi anni prima della data della sua pubblicazione (si veda anche quanto esposto nella sezione Metodi)

***Cephalozia*** (Dumort.) Dumort. (Cephaloziaceae)

***Cephalozia bicuspidata*** (L.) Dumort.

**SINONIMI:** *Jungermannia bicuspidata* L.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Fra Passo Paitino e Lago Rocca Pianaccia, Capanna Biancani (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Cerreto dell'Alpi (Fiori 1892a citato in Casali 1899b); Albinea al Castello, Roncolo, Roncoesi (Casali 1899b); La Bargetana (Gerdol & Tomaselli 1993); Monte Prado (Velluti 1993) – **Modena:** San Faustino presso Modena, Casinalbo (Fiori 1892a) – **Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

**ECOLOGIA:** Questa specie debole e strisciante cresce in terra nei luoghi ombrosi (Bracciforti 1877); Nei luoghi umidi e lungo le sponde dei fossati (Fiori 1892a; Casali 1899b); Presso le fontane (Casali 1899b); Suolo in un vacciniato (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1570 m, 1700 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1750, 1760 (Velluti 1993)

***Cephalozia connivens*** (Dicks.) Lindb.

**Reggio Emilia:** Pian Vallese, Monte La Piella versante Nord (Gerdol & Tomaselli 1993)

**ALTITUDINE:** 1300 m, 1870 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

***Cephaloziella*** (Spruce) Schiffn. (Cephaloziellaceae)

***Cephaloziella baumgartneri*** Schiffn.

**Reggio Emilia:** SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) alla Tana della Mussina (Aleffi 2016) – **Bologna:** Gessi bolognesi al Buco dei Buoi (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014) alla Grotta M. Gortani (Aleffi 2016); Parco Storico di

Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Rimini**: SIC Onferno (Aleffi et al. 2014)  
*ECOLOGIA*: Su roccia in un inghiottitoio (Aleffi & Silenzi 2000)

*Cephaloziella calyculata* (Durieu & Mont.) Müll. Frib.

**Reggio Emilia**: SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014)

*Cephaloziella divaricata* (Sm.) Schiffn.

**Bologna**: Gessi bolognesi al Buco dei Vinchi (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) – **Forlì-Cesena**: Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA*: Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*Cephaloziella hampeana* (Nees) Schiffn.

*SINONIMI*: *Cephalozia byssacea* (A. Roth) Dumort. *nom. rejic.* var. *divaricata* (Sm.) C. Massal.

**Reggio Emilia**: Monte del Gesso presso Scandiano (Fiori 1892a citato in Casali 1899b) – **Bologna**: Gessi bolognesi a Miserazzano e al Buco dei Vinchi (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014)

*ECOLOGIA*: Sulla terra bagnata (Fiori 1892a; Casali 1899b); Su roccia gessosa, su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

*Cephaloziella rubella* (Nees) Warnst.

**Reggio Emilia**: Abetina Reale (Velluti 1993) – **Bologna**: Gessi bolognesi al Buco dei Quercioli (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014)

*ECOLOGIA*: Suolo in un vaccinieto (Velluti 1993); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1820 m (Velluti 1993)

#### *Chiloscyphus* Corda (Lophocoleaceae)

*Chiloscyphus pallescens* (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.

*SINONIMI*: *Chiloscyphus polyanthos* (L.) Corda var. *pallescens* (Ehrh.) Hartm.

**Modena**: Alta Valle delle Tagliole (Gerdol & Tomaselli 1988); Circo glaciale di Monte (Lago) Turchino (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Bologna**: Corno alle Scale (Gerdol & Tomaselli 1988) – **Forlì-Cesena**: Piancancelli (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Terreno (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 1600-1660 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

*Chiloscyphus polyanthos* (L.) Corda

**Reggio Emilia**: Lago Cerretano (Fiori 1892a citato in Casali 1899b; Provasi 1938)

*ECOLOGIA*: Nei rigagnoli (Fiori 1892a; Casali 1899b)

*NOTE*: In letteratura esiste anche una segnalazione più recente per l'Appennino tosco-emiliano (Ferrarini 1982) con l'indicazione stazionale generica di "Laghetti e acquitrini dal Passo della Cisa al Passo delle Radici"

#### *Cololejeunea* (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae)

*Cololejeunea rossettiana* (C. Massal.) Schiffn.

**Bologna**: Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000)

*ECOLOGIA*: Su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

#### *Conocephalum* Hill (Conocephalaceae)

*Conocephalum conicum* (L.) Dumort.

*SINONIMI*: *Conocephalus vulgaris* De Not.; *Fegatella conica* (L.) Corda; *Hepatica conica* (L.) Lindb.; *Marchantia conica* L.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Bosco di Corniglio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Riarbero (Fiori 1892a citato in Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Modena:** Montecuccolo presso Pavullo (Fiori 1892a) – **Bologna:** Rio Maggiore (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Monte della Croce sopra il bagno Donzelle (Cocconi 1881); Buca della Spipola presso Bologna (Fiori 1892a); Gessi bolognesi a Acquafredda, a Siberia, al Buco dei Buoi, al Buco del Budriolo, al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) alla Gaibola, alla Spipola e nella Valle dell'Acquafredda (Aleffi 2016) – **Forlì-Cesena:** Forlì (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Monte dei Cappuccini (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009)

**ECOLOGIA:** Sulle rupi gocciolanti acqua delle ripe (Bertoloni 1865); Alveo e boschi lungo un rio (Cocconi 1881); Cresce nei boschi umidi (Bracciforti 1877); Presso le scaturigini (Fiori 1892a; Casali 1899b); Sulle pareti di un pozzo (Zodda 1921); Terra umida, roccia calcarea (Zangheri 1966b); Su roccia lungo un torrente, su terreno, su gesso, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

**NOTE:** Le segnalazioni di Cocconi (1881) riprendono quasi sempre quelle dei lavori di Antonio e Giuseppe Bertoloni di anni precedenti (1844; 1859; 1865). Sulla concordanza dei dati presenti nelle pubblicazioni di Zodda (1921) e Zangheri (1966b) si veda quanto esposto nella sezione Metodi

### *Diplophyllum* (Dumort.) Dumort. (Scapaniaceae)

*Diplophyllum albicans* (L.) Dumort.

**SINONIMI:** *Jungermannia albicans* L.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877)

**ECOLOGIA:** Sulla terra umida e sulle vecchie ceppate nei luoghi ombrosi (Bracciforti 1877)

*Diplophyllum taxifolium* (Wahlenb.) Dumort.

**Reggio Emilia:** Monte Prado, Monte Ravino (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Suolo in un vacciniato e microconglomerato in un faggeto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1450 m, 1750 m, 1770 m, 1780 m (Velluti 1993)

### *Eremonotus* Lindb. & Kaal. ex Pearson (Gymnomitriaceae)

*Eremonotus myriocarpus* (Carrington) Pearson

**Reggio Emilia:** Monte Prado, Abetina Reale (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Suolo e arenaria in un vacciniato e in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1750 m, 1820 m, 1920 m, 1970 m, 1980 m (Velluti 1993)

### *Fossombronia* Raddi (Fossombroniaceae)

*Fossombronia caespitiformis* De Not. ex Rabenh. subsp. *caespitiformis*

**Bologna:** Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi & al. 2014) nella Valle dell'Acquafredda (Aleffi 2016)

**ECOLOGIA:** Su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

### *Frullania* Raddi (Frullaniaceae)

*Frullania dilatata* (L.) Dumort.

**SINONIMI:** *Jungermannia dilatata* L.

**Parma:** Vigheffio, Collecchio, Rigoso, Rondebocco (Cisa) (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Borzano, Albinea, Stiano, Cerè Marabino, Monte Casarola (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena:** Montegibbio, Montefiorino, Serpentine di Varana (Fiori 1892a) – **Bologna:** Rio Maggiore (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Gessi bolognesi al Buco del Budriolo, sulla via della Gaibola, al Buco della Gaibola e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017)



– **Ravenna:** Pineta di Classe, Pineta di San Vitale (Zangheri 1966b); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** Macchia della Monda (Carpena), Ladino, Scardavilla (Zodda 1921; Zangheri 1966b); San Savino (Zangheri 1966b) a Casa Trove (Zodda 1921); Polenta, Portico di Romagna, Monte Aiola, Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA:* Ne' poggi umidi lungo un rio (Bertoloni 1865); Alveo e boschi lungo un rio (Cocconi 1881); Sopra gli alberi (Fiori 1892a; Casali 1899a; Casali 1899b); Sui tronchi di querce (Zodda 1921); Su tronco di *Fraxinus ornus*, su *Quercus cerris*, su terreno, su *Quercus pubescens* nel fondo di una dolina (Aleffi & Silenzi 2000); Su *Pinus pinaster* e su *Populus nigra* (Fariselli 2015)

*Frullania fragilifolia* (Taylor) Gottsche et al.

**Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)

*Frullania tamarisci* (L.) Dumort.

*SINONIMI:* *Jungermannia tamarisci* L.; *Jungermannia tamariscifolia* L. *nom. illeg.*

**Parma:** Costa Gabardi (Berceto) (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Monte Casarola, Vetto (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena:** Monte Modino di Frassinoro, Montegibbio, Fiumalbo (Fiori 1892a) – **Bologna:** Madonna dell'Acero (Bertoloni 1844); Monte Granaglione (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Monte della Croce, Rio Maggiore (Cocconi 1881)

*ECOLOGIA:* Comunissima incontrasi ne' poggi ombrosi, cupi ed umidi (Bertoloni 1865); Alveo e boschi lungo un rio (Cocconi 1881); Comune sui faggi, sulle rocce (Casali 1899a); Sulle rocce e sugli alberi comune (Fiori 1892a; Casali 1899b)

*Gymnocolea* (Dumort.) Dumort. (Scapaniaceae)

*Gymnocolea inflata* (Huds.) Dumort.

**Reggio Emilia:** Monte Acuto, Lago Gora (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Forlì-Cesena:** Bertinoro (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA:* Rocce calcaree umide (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE:* 1425 m, 1576 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

*Gymnomitrium* Corda (Gymnomitriaceae)

*Gymnomitrium concinnatum* (Lightf.) Corda

**Reggio Emilia:** Monte Cusna (Velluti 1993)

*ECOLOGIA:* Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE:* 2030 m (Velluti 1993)

*Jungermannia* L. (Jungermanniaceae)

*Jungermannia atrovirens* Dumort.

**Bologna:** Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola e al Buco dei Buoi (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) – **Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA:* Su gesso in una grotta, su roccia umida in un inghiottitoio (Aleffi & Silenzi 2000)

*Jungermannia gracillima* Sm.

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Velluti 1993) – **Bologna:** Gessi bolognesi al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-4 e 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

*ECOLOGIA:* Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE:* 2020 m (Velluti 1993)

***Jungermannia leiantha*** Grolle

**Reggio Emilia:** Pian Vallese, Abetina Reale, Passo della Cisa, Monte Prado (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Scorza e radici di faggio, suolo e tronco di faggio morto in un faggeto, suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1284 m, 1560 m, 1600 m, 1980 m (Velluti 1993)

***Jungermannia sphaerocarpa*** Hook.

**SINONIMI:** *Solenostoma sphaerocarpum* (Hook.) Steph.

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Tomaselli 1991; Rossi & Ferrari 1994) – **Emilia:** Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991)

**NOTE:** Nella pubblicazione di Tomaselli (1991) le stazioni qui riportate con l'indicazione "Modenese/Reggiano" corrispondono rispettivamente alle aree di Monte Giovo/Monte Cimone e di Monte Cusna/Monte Prado ma non è chiaro in quali di queste siano effettivamente presenti le specie segnalate (si vedano anche le note di *Anthelia juratzkana*)

***Leiocolea*** (Müll. Frib.) H. Buch (Scapaniaceae)

***Leiocolea bantriensis*** (Hook.) Jörg.

**Reggio Emilia:** SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) alla Tana della Mussina (Aleffi 2016) – **Bologna:** SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014)

***Leiocolea turbinata*** (Raddi) H. Buch

**Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11633-4, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Casticciano (Zodda 1921); San Martino in Strada, Castelnuovo di Meldola, Monte Casale (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Sul suolo calcareo umido (Zodda 1921); Terreno, roccia calcarea (Zangheri 1966b)

***Lejeunea*** Lib. (Lejeuneaceae)

***Lejeunea cavifolia*** (Ehrh.) Lindb.

**SINONIMI:** *Lejeunea serpyllifolia* (Dicks.) Lib. *nom. illeg.*

**Reggio Emilia:** Monte Ravino (Velluti 1993) – **Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11633-4, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** San Savino (Zangheri 1966b) a Casa Trove (Zodda 1921); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Nei boschi di querce e di castagno (Zodda 1921); Terreno, ceppi (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Velluti 1993)

**NOTE:** Secondo Ros et al. (2007) le segnalazioni *L. serpyllifolia* (Dicks.) Lib. (qui presente in Zodda) sono di difficile interpretazione ma corrispondono per la maggior parte a *L. cavifolia*

***Lophocolea*** (Dumort.) Dumort. (Lophocoleaceae)

***Lophocolea bidentata*** (L.) Dumort.

**Bologna:** Gessi bolognesi al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)

**ECOLOGIA:** Su roccia lungo un sentiero (Aleffi & Silenzi 2000)

***Lophocolea fragrans*** (Moris & De Not.) Gottsche et al.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877)

**ECOLOGIA:** Nei luoghi umidi, in riva ai fossati ecc. (Bracciforti 1877)

***Lophocolea heterophylla*** (Schrad.) Dumort.

**Reggio Emilia:** Monte Casarola (Casali 1899a; Casali 1899b); Abetina Reale, Monte Cusna, Monte Ravino (Velluti 1993); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Bologna:** Madonna dell'Acero (Fiori 1892a); Gessi bolognesi a Acquafredda, al Buco della Gaibola, sulla via della Gaibola, al Buco dei Vinchi, alla Grotta della Spipola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) nella Valle dell'Acquafredda (Aleffi 2016); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11633-4, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** Ladino (Zodda 1921; Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Sui faggi marci (Fiori 1892a); Sui faggi (Casali 1899a; Casali 1899b); Sui tronchi (Zodda 1921); Cortecce (Zangheri 1966b); Tronco di faggio morto in un faggeto e suolo in una prateria al limite del bosco (Velluti 1993); Su legno marcescente lungo un torrente, su gesso in una grotta e in un inghiottitoio, su terreno nel fondo di una dolina, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000); Su *Pinus pinaster* (Fariselli 2015)

**ALTITUDINE:** 1400 m, 1600 m, 1750 m (Velluti 1993)

***Lophocolea minor*** Nees

**SINONIMI:** *Lophocolea crocata* Mich.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

**ECOLOGIA:** Nei luoghi umidi, in riva ai fossati ecc. (Bracciforti 1877)

***Lophozia*** (Dumort.) Dumort. (Scapaniaceae)

***Lophozia obtusa*** (Lindb.) A. Evans

**Reggio Emilia:** Passo della Cisa (Velluti 1993) – **Forlì-Cesena:** Piancancelli (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Legni secchi (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1600 m (Velluti 1993)

***Lophozia sudetica*** (Nees ex Huebener) Grolle

**Reggio Emilia:** Monte Cusna, Monte Prado (Velluti 1993) – **Bologna:** Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) nella Valle dell'Acquafredda (Aleffi 2016)

**ECOLOGIA:** Suolo in una prateria discontinua di crinale e in un vaccinieto (Velluti 1993); Su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

**ALTITUDINE:** 1750 m, 2000 m, 2050 m (Velluti 1993)

***Lophozia ventricosa*** (Dicks.) Dumort.

**Reggio Emilia:** SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Bologna:** Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) nella Valle dell'Acquafredda (Aleffi 2016)

**ECOLOGIA:** Su *Fraxinus ornus*, su roccia lungo un fosso (Aleffi & Silenzi 2000)

***Lophozia wenzelii*** (Nees) Steph.

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Tomaselli 1991; Rossi & Ferrari 1994) – **Emilia:** Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991)

***Lunularia*** Adans. (Lunulariaceae)

***Lunularia cruciata*** (L.) Lindb.

**SINONIMI:** *Lunularia vulgaris* Raddi *nom. illeg.*

**Parma:** Parma (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Coviolo, Castelnuovo Sotto (Casali 1899a; Casali 1899b) –

**Modena:** Orto Botanico di Modena (Fiori 1892a) – **Bologna:** Bologna nel giardino Margherita (Fiori 1892a) – **Ferrara:** Provincia di Ferrara (Massalongo 1916) – **Forlì-Cesena:** Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1966b)  
**ECOLOGIA:** Sulla terra in un orto (Avetta 1897); Sul terreno (Casali 1899a; Casali 1899b; Zodda 1921); Incrostazioni calcaree (Zangheri 1966b)

*Mannia* Opiz (Aytoniaceae)

*Mannia androgyna* (L.) A. Evans

**SINONIMI:** *Grimaldia dichotoma* Raddi *nom. illeg.*

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877)

**ECOLOGIA:** Tra le borrhaccine e le fessure dei sassi (Bracciforti 1877)

*Mannia fragrans* (Balbis) Frye & L. Clark

**SINONIMI:** *Grimaldia barbifrons* Bisch.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877)

**ECOLOGIA:** Tra le borrhaccine e le fenditure delle pietre nei luoghi umidi (Bracciforti 1877)

*Marchantia* L. (Marchantiaceae)

*Marchantia polymorpha* L.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Passo della Cappelletta (Sburlino et al. 1980) – **Reggio Emilia:** Tra Cavola e Cerè Marabino, Mora presso Toano, Monte Casarola (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena:** Orto Botanico di Modena, Monte Cimone (Fiori 1892a) – **Bologna:** Madonna dell'Acero (Bertoloni 1844) – **Forlì-Cesena:** Alfero, Campigna, Poggio Martino, Pian delle Fontanelle, Piancancelli (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Cresce sulle pietre, sulla terra umida, sui margini dei ruscelli, delle sorgenti, dei pozzi, formando talora della piastre larghe da a cinque centimetri e più (Bracciforti 1877); Presso uno stillicidio, sul terreno umido (Casali 1899a); Lungo i rigagnoli e sulla terra umida (Fiori 1892a; Casali 1899b); Terreno, legni fradici (Zangheri 1966b)

*Marchesinia* Gray (Lejeuneaceae)

*Marchesinia mackaii* (Hook.) Gray

**Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

*Marsupella* Dumort. (Gymnomitriaceae)

*Marsupella brevissima* (Dumort.) Grolle

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Tomaselli 1991; Rossi & Ferrari 1994); Alto Appennino reggiano (Ferrari 2002a) – **Emilia:** Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991)

*Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dumort.

**SINONIMI:** *Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dumort. var. *minor* C. Massal. ex Schiffn. *nom. illeg.*; *Nardia emarginata* (Ehrh.) Gray

**Reggio Emilia:** Ospitaletto di Ligonchio (Fiori 1892a citato in Casali 1899b e genericamente in Barsali 1914); Le Forbici (Barsali 1914)

**ECOLOGIA:** Nelle faggete (Fiori 1892a; Casali 1899b)

**ALTITUDINE:** 1550 m (Barsali 1914)

*Marsupella funckii* (F. Weber & D. Mohr) Dumort.

**Reggio Emilia:** Monte Cusna (Velluti 1993)

*ECOLOGIA*: Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1990 m (Velluti 1993)

*Marsupella sprucei* (Limpr.) Bernet

**Reggio Emilia**: Monte Ravino (Velluti 1993)

*ECOLOGIA*: Microconglomerato in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1450 m (Velluti 1993)

*Metzgeria* Raddi (Metzgeriaceae)

*Metzgeria furcata* (L.) Dumort.

*SINONIMI*: *Jungermannia furcata* L.; *Metzgeria glabra* Raddi *nom. illeg.*

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Collecchio, Berceto (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Montemiscoso, Vetto (Casali 1899a; Casali 1899b); Passo della Cisa (Velluti 1993) – **Bologna**: Gessi bolognesi al Buco dei Vinchi (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Scardavilla (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Selbagnone, Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Comunissima sulla corteccia degli alberi e sulla terra (Bracciforti 1877); Sul terreno nei luoghi muscosi (Casali 1899a; Casali 1899b); Sulle querci (Zodda 1921); Cortecce (Zangheri 1966b); Scorza e radici di faggio in un faggeto (Velluti 1993); Su ceppaia di *Fraxinus ornus* e su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1560 m, 1590 m (Velluti 1993)

*Nardia* Gray (Jungermanniaceae)

*Nardia scalaris* Gray

**Reggio Emilia**: Monte Prado (Velluti 1993)

*ECOLOGIA*: Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1950 m (Velluti 1993)

*Odontoschisma* (Dumort.) Dumort. (Cephaloziaceae)

*Odontoschisma denudatum* (Mart.) Dumort.

**Parma**: Circo glaciale di Monte Bocco, Capanna Biancani (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia**: La Bargetana (Gerdol & Tomaselli 1993)

*ALTITUDINE*: 1570 m, 1760 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

*Pedinophyllum* (Lindb.) Lindb. (Plagiochilaceae)

*Pedinophyllum interruptum* (Nees) Kaal.

**Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

*Pellia* Raddi (Pelliaceae)

*Pellia endiviifolia* (Dicks.) Dumort.

*SINONIMI*: *Pellia fabbroniana* Raddi

**Reggio Emilia**: Monte Ravino (Velluti 1993) – **Bologna**: SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) a Gaibola e alla Spipola (Aleffi 2016); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014) alla Grotta M. Gortani (Aleffi 2016) – **Forlì-Cesena**: Casticciano (Zodda 1921); Carpena (Zodda 1921; Zangheri 1966b); San Martino in Strada, Predappio, Monte Casale (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA*: Sopra suolo calcareo (Zodda 1921); Terreno, fanghiglia calcarea, stillicidi (Zangheri 1966b);

Suolo lungo un sentiero di un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1470 m (Velluti 1993)

***Pellia epiphylla*** (L.) Corda

*SINONIMI*: *Jungermannia epiphylla* L.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Fragno, Cassio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Monte Cusna (Fiori 1892a citato in Casali 1899b); Roncocesi (Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Modena**: Fontanazzi di San Faustino presso Modena, Casinalbo (Fiori 1892a); Circo glaciale di Monte (Lago) Turchino (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Bologna**: Gessi bolognesi a Acquafredda e al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) a Gaibola e Spipola e nella Valle dell'Acquafredda (Aleffi 2016) – **Forlì-Cesena**: Scadavilla (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Cresce nei boschi in tutta la provincia (Bracciforti 1877); Presso le fonti e lungo le sponde dei fossati (Fiori 1892a; Casali 1899b); Nello stillicidio di una fontana, in una cascata (Avetta 1897); Incrostazioni calcaree (Zangheri 1966b); Su roccia lungo un torrente (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1600-1660 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

***Plagiochila*** (Dumort.) Dumort. (Plagiochilaceae)

***Plagiochila asplenoides*** (L. emend. Taylor) Dumort.

*SINONIMI*: *Jungermannia asplenoides* L.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Reggio Emilia**: Colli di San Valentino, Civago (Fiori 1892a citato in Casali 1899b); Monte Ravino (Velluti 1993) – **Forlì-Cesena**: San Savino (Zangheri 1966b) a Casa Trove (Zodda 1921); Polenta, Campigna, Campigna località Burraia, Monte Fumaiolo (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Cresce in terra tra le erbe nei boschi umidi (Bracciforti 1877); Boschi (Fiori 1892a; Casali 1899b; Zodda 1921); Terreno, ceppi, cortecce (Zangheri 1966b); Scorza di faggio, tronco di faggio morto e suolo su arenaria in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1420 m, 1450 m, 1550 m (Velluti 1993)

*NOTE*: In letteratura *P. asplenoides* e *P. porelloides* sono spesso confuse (Aleffi et al. 2008)

***Plagiochila porelloides*** (Torrey ex Nees) Lindenb.

**Reggio Emilia**: Passo della Cisa, Pian Vallese, Monte Ravino (Velluti 1993); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Bologna**: Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola, a Siberia, a Miserazzano e al Buco dei Vinchi (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA*: Suolo, arenaria e tronco di un faggio morto in un faggeto (Velluti 1993); Su gesso, sulla parete rocciosa di un inghiottitoio e su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1250 m, 1284 m, 1400 m, 1500 m (Velluti 1993)

*NOTE*: Si vedano le note della specie precedente

***Porella*** L. (Porellaceae)

***Porella arboris-vitae*** (With.) Grolle

*SINONIMI*: *Madotheca laevigata* (Schrad.) Dumort.; *Porella laevigata* (Schrad.) Pfeiff.

**Reggio Emilia**: Borzano, Cavazzone (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena**: Colli di Montegibbio, Varana, Fiumalbo (Fiori 1892a) – **Bologna**: Gessi bolognesi (Cobau 1932); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: San Savino (Zangheri 1966b) a Casa Trove (Zodda 1921); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Nei boschi (Fiori 1892a; Casali 1899a; Casali 1899b; Zodda 1921); Cortecce (Zangheri 1966b)

***Porella cordaeana*** (Huebener) Moore

*SINONIMI*: *Madotheca cordaeana* (Huebener) Dumort.; *Madotheca dentata* (Hartm.) C. Massal.

**Parma**: Laghetto sopra il Lago Santo nel Monte Orsaro (Barsali 1914); Lago dell'Olmo di Monte Molinatico (Provasi 1938) – **Reggio Emilia**: Monte Ravino (Velluti 1993)

*ECOLOGIA*: Tronco di faggio vivo e morto in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1420 m (Velluti 1993)

***Porella platyphylla*** (L.) Pfeiff.

*SINONIMI*: *Jungermannia platyphylla* L.; *Madotheca platyphylla* (L.) Dumort.

**Parma**: San Pellegrino (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Chiozza, Toano, Cerè Marabino (Casali 1899a; Casali 1899b); Passo della Cisa, Monte Ravino, Monte Prado (Velluti 1993); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) – **Modena**: Orto Botanico di Modena, Montefiorino, presso Sassuolo, Rocca Santa Maria (Fiori 1892a) – **Bologna**: Monte Granaglione (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Buca della Spipola presso Bologna (Fiori 1892a); Gessi bolognesi a Acquafredda, alla Grotta della Spipola, al Buco della Gaibola, e lungo la via della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2, 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Persolino presso Faenza (Bertoloni 1859); Castelraniero (Zangheri 1966b) – **Forlì-Cesena**: Ladino, Selbagnone, Monte dei Cappuccini, Colmano, Castrocaro località Cozzi, Rocca San Casciano, Campigna, Campigna località Burraia, Balze (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Rimini**: SIC Onferno (Aleffi et al. 2014) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sulla terra negli alti castagneti (Bertoloni 1865); Sugli alberi (Fiori 1892a; Casali 1899a; Casali 1899b); Terreno, cortecce (Zangheri 1966b); Scorza e radici di faggio, microconglomerato, suolo e arenaria in un faggeto, suolo e arenaria in un vaccinieto (Velluti 1993); Su *Quercus cerris*, su terreno, su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1400 m, 1420 m, 1450 m, 1460 m, 1500 m, 1550 m, 1560 m, 1770 m, 2020 m (Velluti 1993)

***Preissia*** Corda (Marchantiaceae)

***Preissia quadrata*** (Scop.) Müll. Frib.

*SINONIMI*: *Cyathophora commutata* (Lindenb.) Trevis.; *Marchantia quadrata* Scop.; *Preissia commutata* (Lindenb.) Nees

**Modena**: San Pellegrino (Fiori 1892a) – **Bologna**: Bologna a Sasso lungo la via che scende al Reno, Corno alle Scale alla Macchia del Signore (Bertoloni 1859; Cocconi 1881) – **Emilia**: Emilia (Massalongo 1916)

*ECOLOGIA*: Sulle rupi (Bertoloni 1859)

***Ptilidium*** Nees (Ptilidiaceae)

***Ptilidium ciliare*** (L.) Hampe

*SINONIMI*: *Blepharozia ciliaris* (L.) Dumort.

**Piacenza**: Appennino di Bobbio (Brizi 1889) – **Parma**: Nord di Monte Bocco (Tomaselli & Gerdol 1983); Paduli di Cima (Gerdol & Tomaselli 1993)

*ALTITUDINE*: 1200 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

***Radula*** Dumort. (Radulaceae)

***Radula complanata*** (L.) Dumort.

*SINONIMI*: *Jungermannia complanata* L.

**Parma**: Collecchio, San Pellegrino (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Chiozza, Salvaterra (Casali 1899a; Casali 1899b); Monte Ravino, Abetina Reale (Velluti 1993) – **Modena**: Bosco di Campogalliano, colli di Sassuolo, Casinalbo (Fiori 1892a) – **Bologna**: Rio Maggiore (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); San Luca presso Bologna

(Fiori 1892a); Gessi bolognesi al Buco della Gaibola, alla Grotta della Spipola, al Buco del Budriolo e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-2, 11633-3, 11732-2, 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Pineta di Classe (Zangheri 1966b); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: San Savino (Zangheri 1966b) presso Casa Trove (Zodda 1921); Ladino (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Bracciano, Bertinoro, Polenta, Predappio, Colmano, Monte Aiola, Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Rimini**: SIC Onferno (Aleffi et al. 2014) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
**ECOLOGIA**: Ripe umide (Bertoloni 1865); Alveo e boschi lungo un rio (Cocconi 1881); Sopra gli alberi (Fiori 1892a; Casali 1899a; Casali 1899b); Nei boschi (Zodda 1921); Cortecce, ceppi (Zangheri 1966b); Tronco di faggio e arenaria in un faggeto, calcare sulle sponde di un torrente (Velluti 1993); Su terreno lungo un sentiero, su *Ulmus minor* in una piccola dolina, su tronco marcescente, su *Quercus pubescens* nel fondo di una dolina, su gesso lungo la parete di un inghiottitoio, su gesso, su tronco di *Fraxinus ornus* e di *Alnus glutinosa*, su *Quercus cerris* (Aleffi & Silenzi 2000); Su *Quercus robur* (Fariselli 2015)  
**ALTITUDINE**: 1250 m, 1420 m, 1450 m (Velluti 1993)

**Radula lindenbergiana** Gott. ex C. Hartm.

**Forlì-Cesena**: Sasso Fratino (Bonini 2009)

### **Reboulia** Raddi (Aytoniaceae)

**Reboulia hemisphaerica** (L.) Raddi

**Parma**: Monte Prinzerà, Collecchio, Varano dei Marchesi (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Monte del Gesso a Scandiano (Fiori 1892a citato in Casali 1899b); Cavazzone (Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Modena**: Serpentine di Varana (Fiori 1892a) – **Bologna**: Gessi bolognesi al Buco dei Vinchi, al Buco del Budriolo ed al Buco dei Buoi (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) alla Tana del Re Tiberio e a Ca' di Sasso (inedito) al Monte Mauro (Aleffi 2016) – **Romagna**: Romagna (Massalongo 1916)  
**ECOLOGIA**: Sui muri e le rupi (Fiori 1892a; Casali 1899b); Rocce gessifere (Zangheri 1966b); Su terreno, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

### **Riccardia** Gray (Aneuraceae)

**Riccardia multifida** (L.) Gray

**SINONIMI**: *Aneura multifida* (L.) Dumort.

**Forlì-Cesena**: San Martino in Strada, Polenta (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA**: Terreno, terra dei castagneti (Zangheri 1966b)

### **Riccia** L. (Ricciaceae)

**Riccia bifurca** Hoffm.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877)

**ECOLOGIA**: Nei luoghi umidi, nei boschi, nei giardini (Bracciforti 1877)

**Riccia cavernosa** Hoffm.

**Ravenna**: Bardello (Piccoli & Merloni 1989; Lazzari et al. 2008)

**Riccia crystallina** L. emend. Raddi

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877)

**ECOLOGIA**: Nei boschi e lungo i ruscelli e nei luoghi umidi (Bracciforti 1877)



***Riccia fluitans*** L.

**Parma:** Parma (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** San Savino, Traghettino (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena:** Bosco di San Felice (Fiori 1892a) – **Bologna:** Valle La Comune 2 km a Sud-Est di Malalbergo (Piccoli & Gerdol 1979) – **Ferrara:** Cassa di espansione di Campotto, Cassa di espansione di Valle Santa (Piccoli 1976); Risaie (Piccoli 1977; Piccoli & Gerdol 1981) – **Ravenna:** Punte Alberete-Valle Mandriole (Merloni & Piccoli 2001; Lazzari et al. 2007)

**ECOLOGIA:** Fossati (Fiori 1892a); Nelle fosse (Avetta 1897; Casali 1899a; Casali 1899b)

***Riccia frostii*** Austin

**Piacenza:** Presso Piacenza (Zodda 1934) – **Ferrara:** Presso Francolino (Massalongo 1912; Müller 1906-1916); Provincia di Ferrara (Zodda 1934)

**NOTE:** Le segnalazioni di Massalongo e di Müller derivano entrambe da un campione raccolto da Ferrioli nel 1911; si tratta forse di dati coincidenti

***Riccia glauca*** L.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Reggio Emilia:** Po a Guastalla (Fiori 1892a citato in Casali 1899b)

**ECOLOGIA:** Intorno agli stagni (Bracciforti 1877); Nelle sabbie (Fiori 1892a; Casali 1899b)

***Riccia sorocarpa*** Bisch. var. *sorocarpa*

**Ravenna:** SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Monte Mauro (Aleffi 2016)

***Ricciocarpos*** Corda (Ricciaceae)

***Ricciocarpos natans*** (L.) Corda

**SINONIMI:** *Riccia natans* L.

**Parma:** Parma (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** San Savino, Poviglio (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Emilia:** Emilia (Zodda 1934)

**ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO:** Provincia di Parma, Serie I Fascicolo XXIV 160 (1160), Passerini 1863

**DATI D'ERBARIO:** **Parma:** Presso Parma, Passerini 1863 [FI] (Massalongo 1903)

**ECOLOGIA:** Nelle fosse (Avetta 1897; Casali 1899a; Casali 1899b); In un rigagnolo d'acqua sorgente (Massalongo 1903)

**NOTE:** Avetta (1897) afferma di aver revisionato, per la compilazione suo lavoro, il materiale dell'erbario privato di Passerini il quale ha raccolto i campioni di briofite della provincia di Parma contenuti nell'Erbario Crittogamico Italiano. È quindi possibile che lo stesso Avetta abbia avuto a disposizione anche questo materiale per le sue segnalazioni

***Scapania*** (Dumort.) Dumort. (Scapaniaceae)

***Scapania aequiloba*** (Schwagr.) Dumort.

**Reggio Emilia:** SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Bologna:** Gessi bolognesi al Buco della Gaibola e a Miserazzano (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014)

**ECOLOGIA:** Su gesso al margine di una dolina, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

***Scapania curta*** (Mart.) Dumort.

**Reggio Emilia:** Monte Cusna/Monte Prado (Tomaselli 1991); Monte Prado (Rossi & Ferrari 1994) –

**Modena:** Campo di Lolio verso Serramazzone (Fiori 1892a) – **Emilia:** Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991)

**ECOLOGIA:** Boschi (Fiori 1892a)

**NOTE:** In letteratura esiste una citazione di Massalongo (1902) della segnalazione di Fiori (1892a) relativa alla località di Campo di Lolio ma la citazione riporta erroneamente *S. curta* (Mart.) Dumort. var. *geniculata*

(C. Massal.) Müll. Frib. (che corrisponde a *S. helvetica* Gottsche) e non *S. curta* (Mart.) Dumort. come indicato da Fiori

*Scapania irrigua* (Nees) Nees

**Parma:** Laghetto sopra il Lago Santo nel Monte Orsaro (Barsali 1914)

*Scapania nemorea* (L.) Grolle

*SINONIMI:* *Jungermannia nemorosa* L. *nom. illeg.*; *Scapania nemorosa* Dumort. *nom. illeg.*; *Scapania nemorosa* Dumort. *nom. illeg.* var. *aconiensis* (De Not.) C. Massal.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Ranzano (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Civago, Borzano (Fiori 1892a citato in Casali 1899b e genericamente in Massalongo 1902); Regnano, Cavazzone, Vetto, Crovara (Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Forlì-Cesena:** Polenta (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA:* Nei boschi umidi (Bracciforti 1877); Nei boschi (Fiori 1892a; Casali 1899b); Terreno di castagneti (Zangheri 1966b)

*Scapania subalpina* (Nees ex Lindenb.) Dumort.

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Velluti 1993)

*ECOLOGIA:* Suolo lungo un ruscellamento (Velluti 1993)

*ALTITUDINE:* 1750 m (Velluti 1993)

*Scapania undulata* (L.) Dumort.

*SINONIMI:* *Scapania dentata* (Dumort.) Dumort.

**Parma:** Laghetto sopra il Lago Santo nel Monte Orsaro (Barsali 1914); Monte Bocco (Gerdol & Tomaselli 1988); Capanne Badignana, tra I Lagoni e il Lago Scuro, fra Passo Paitino e Lago Rocca Pianaccia, Circo glaciale di Monte Bocco, Capanna Biancani (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Cerreto dell'Alpi (Fiori 1892a citato in Casali 1899b e genericamente in Barsali 1914); Lago Cerretano (Fiori 1892a citato in Casali 1899b e genericamente in Barsali 1914; Provasi 1938); Lago Gora, Prati di Pranda (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena:** Le Maccherie, Lagacci di Porticciola (Gerdol & Tomaselli 1993)

*ECOLOGIA:* Nei rigagnoli (Fiori 1892a; Casali 1899b)

*ALTITUDINE:* 1290 m, 1425 m, 1480 m, 1550 m, 1570 m, 1584 m, 1700 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

*NOTE:* In letteratura esiste una segnalazione di Massalongo (1902) relativa alla località di Ospedaletto, nel reggiano, sulla base di una citazione di Fiori (1892a) ma la citazione non è corretta in quanto la località in tale lavoro non è indicata

### *Southbya* Spruce (Arnelliaceae)

*Southbya tophacea* (Spruce) Spruce

*SINONIMI:* *Southbya stillicidiorum* (Raddi) Lindb.

**Emilia:** Emilia (Zodda 1934) – **Forlì-Cesena:** Dintorni di Cesena (Rossetti 1893)

*NOTE:* Il termine Emilia è stato talvolta usato in passato per indicare l'intera Regione Emilia-Romagna; non è quindi da escludere che la segnalazione di Zodda faccia riferimento a quella di Rossetti

### *Sphaerocarpos* Boehm. (Sphaerocarpaceae)

*Sphaerocarpos michelii* Bellardi

*SINONIMI:* *Sphaerocarpos terrestris* Sm. *nom. Illeg.*

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Reggio Emilia:** Coviolo, Sesso, Massenzatico (Casali 1899a; Casali 1899b); **Modena:** Orto Botanico di Modena (Fiori 1892a) – **Emilia:** Emilia (Zodda 1934)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO:* Provincia di Ferrara, Serie II Fascicolo XX 957, Massalongo 1879

*DATI D'ERBARIO:* **Ferrara:** Orto Botanico di Ferrara, Massalongo 1879 [FI] (Massalongo 1903)

*ECOLOGIA*: Nei siti arenosi umidi (Bracciforti 1877); Sulla terra nelle ajole (Fiori 1892a); Sul terreno (Casali 1899a; Casali 1899b)

*Targionia* L. (Targioniaceae)

*Targionia hypophylla* L.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877)

*ECOLOGIA*: Incontrasi ovunque nei luoghi coperti ed umidi (Bracciforti 1877)

*Tritomaria* Schiffn. ex Loeske (Scapaniaceae)

*Tritomaria quinquedentata* (Huds.) H. Buch

*SINONIMI*: *Jungermannia quinquedentata* Huds.

**Reggio Emilia**: Montebabbio, Civago (Fiori 1892a citato in Casali 1899b e genericamente in Massalongo 1895); Vetto (Casali 1899b); Monte Prado (Velluti 1993)

*ECOLOGIA*: Castagneti, boschi (Fiori 1892a; Casali 1899b); Suolo lungo dei ruscellamenti (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1770 m (Velluti 1993)

## Elenco floristico dei muschi

### *Bryophyta*

#### *Abietinella* Müll. Hal. (Thuidiaceae)

*Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch. var. *abietina*

*SINONIMI*: *Hypnum abietinum* Hedw.; *Thuidium abietinum* (Hedw.) Schimp.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980) – **Reggio Emilia**: Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); San Valentino (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: Montegibbio, Pescaro, Casinalbo (Fiori 1886); Vallata del Dardagna alla Riva (Farneti 1889) – **Bologna**: Zola Predosa (Bertoloni 1859 citato in Farneti 1889; Cocconi 1881); Sasso a Mongardino, Vallata del Dardagna alla Chiesina e alla Riva (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena**: Colle Garampo presso Cesena (Del Testa 1903); Ladino, Monte Ajola (Zangheri 1966b)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO*: Provincia di Bologna, Serie II Fascicolo XXVII 1307, Farneti 1882  
*ECOLOGIA*: Nei boschi e luoghi sabbiosi, sterili (Bracciforti 1877); Castagneti, gineprai (Farneti 1889); Nei boschi e lungo le rive (Casali 1899b); Pendici erbose (Del Testa 1903); Terra, fessure rocce calcaree, ceppi (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 1800 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

#### *Acaulon* Müll. Hal. (Pottiaceae)

*Acaulon muticum* (Hedw.) Müll. Hal.

**Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Borgo Rivola (inedito)

*ECOLOGIA*: Rocce gessifere (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

#### *Alleniella* S. Olsson, Enroth & D. Quandt (Neckeraceae)

*Alleniella complanata* (Hedw.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt

*SINONIMI*: *Homalia complanata* (Hedw.) De Not.; *Neckera complanata* (Hedw.) Huebener

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881) – **Reggio Emilia**: Alpe di Camporaghena (Fitzgerald & Bottini 1881); Colli Scandianesi, Cerreto dell'Alpi (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Regnano (Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881); Montegibbio, Montefiorino (Fiori 1886); Vallata del Dardagna al Monte Capelbuso (Farneti 1889) – **Bologna**: Vallata del Dardagna all'Acero, al Monte Capelbuso e a Rio Piano (Farneti 1889); Gessi bolognesi a Acquafredda ed al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) nella Valle dell'Acquafredda (Aleffi 2016); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano alla Grotta M. Gortani (Aleffi 2016); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Comero (Del Testa 1903); Selbagnone, Campigna, Balze località Scalette (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sulle rupi calcaree e di macigno (Farneti 1889); Sui faggi (Del Testa 1903); Terra, roccia calcarea, ceppi (Zangheri 1966b); Su gesso, su terreno e su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

#### *Aloina* Kindb. (Pottiaceae)

*Aloina aloides* (Koch ex Schultz) Kindb.

*SINONIMI*: *Barbula aloides* (Koch ex Schultz) Bruch; *Tortula aloides* (Koch ex Schultz) De Not.

**Reggio Emilia**: Monte del Gesso a Scandiano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); SIC Ca` del Vento, Ca` del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) al Castello di Borzano (Aleffi 2016); SIC Gessi Triassici (Aleffi

et al. 2014) – **Forlì-Cesena**: Dintorni di Cesena (Del Testa 1903); Castrocaro località Cozzi, Monte dei Cappuccini, Bagnolo di Castrocaro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)  
*ECOLOGIA*: Sul terreno e su muri (Del Testa 1903); Nelle fessure della roccia calcarea, sul calcare (Zangheri 1959); Suolo e rocce calceree (Zangheri 1966b)

***Aloina ambigua*** (Bruch & Schimp.) Limpr.

*SINONIMI*: *Barbula ambigua* Bruch & Schimp.; *Tortula ambigua* (Bruch & Schimp.) Ångstr.; *Aloina ericaefolia* (Lindb.) Kindb. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Reggio Emilia**: Villa San Pellegrino, Vezzano sul Crostolo (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena**: Orto Botanico di Modena, lungo la via Giardini tra Formigine e Maranello, Montegibbio (Fiori 1886); Lungo la Secchia a Sassuolo (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Bologna**: Monte Donato presso Bologna (Fiori 1886) – **Forlì-Cesena**: Colli di Cesena (Del Testa 1903); Bertinoro (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959)  
*ECOLOGIA*: Sui muri, sui sassi ed anche sul terreno (Fiori 1886; Casali 1899b); Sui muri e sul terreno (Casali 1899a)

*NOTE*: La segnalazione di Fiori “Lungo la Secchia a Sassuolo” non è ben chiaro se sia da attribuirsi alla parte modenese o reggiana; Casali la cita per il Reggiano

***Aloina rigida*** (Hedw.) Limpr.

*SINONIMI*: *Aloina stellata* Kindb. *nom. illeg. incl. spec. prior.*; *Barbula rigida* Hedw.

**Modena**: Fiumalbo (Fiori 1886) – **Forlì-Cesena**: Monte dei Cappuccini di Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Sui muri (Fiori 1886)

*ALTITUDINE*: 300 m (Zodda 1921)

### ***Amblystegium*** Schimp. (Amblystegiaceae)

***Amblystegium serpens*** (Hedw.) Schimp.

*SINONIMI*: *Amblystegium juratzkanum* Schimp.; *Amblystegium serpens* (Hedw.) Schimp. var. *rigescens* (Limpr.) Loeske; *Amblystegium serpens* (Hedw.) Schimp. var. *tenue* (Brid.) Schimp.; *Hypnum serpens* Hedw.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Collecchio, Orto Botanico di Parma, Baganzola, Marzano (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Monte Ventasso selva del Pizzetto (Re 1798 citato in Casali 1899b); Colli di San Valentino (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Albinea (Casali 1899b) – **Modena**: Casinalbo, Montegibbio, Montese (Fiori 1886) – **Bologna**: Bologna ai gessi (Bertoloni 1859); Bologna a Barbiano (Bertoloni 1859 citato in Farneti 1889; Cocconi 1881); Gaibola nei dintorni di Bologna (Fiori 1886; Farneti 1889); Gessi bolognesi a Siberia, al Buco del Budriolo, a Acquafredda e sulla via della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3, 11633-4, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ferrara**: Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Ravenna**: Persolino presso Faenza, Sarna presso Faenza (Del Testa 1903); Rivola, Rontana (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Castelraniero (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Borgo Rivola e a Rontana (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Dintorni di Cesena (Del Testa 1903); Monte dei Cappuccini di Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Romiti presso Forlì, Ladino (Zodda 1921; Zangheri 1966b); San Savino (Zangheri 1966b) a Casa Trove (Zodda 1921); Castrocaro località Cozzi (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Busecchio, Selbagnone, Vecchiazano (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO*: Provincia di Parma, Serie I Fascicolo XXIX 402 (1402), Passerini 1866

*ECOLOGIA*: Trovati sopra la terra, sui tronchi d'alberi, sui sassi e sui legni fracidi (Bracciforti 1877); Al piede degli alberi e sul terreno (Fiori 1886; Casali 1899b; Del Testa 1903); Bosco di querce, sugli alberi (Zodda 1921); Sullo sfaticcio della roccia calcarea, sulle rocce gessifere (Zangheri 1959); Terra, macerie, grotte, rocce gessifere, sfaticcio calcareo, muri, cortecce (Zangheri 1966b); Su *Sambucus nigra*, su roccia, su *Fraxinus ornus*, su terreno, su *Quercus pubescens*, su *Ulmus minor* e su tronco marcescente (Aleffi & Silenzi 2000); Su *Ulmus minor* (Fariselli 2015)

*NOTE:* Quasi tutte le segnalazioni di Del Testa per la provincia di Ravenna fanno riferimento a campioni raccolti da Caldesi

*Amphidium* Schimp. (Rhabdoweisiaceae)

*Amphidium lapponicum* (Hedw.) Schimp.

*SINONIMI:* *Amphoridium lapponicum* (Hedw.) Schimp.

**Modena:** Passetto del Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Rondinajo (Fiori 1892b)

*ECOLOGIA:* Nelle fessure del macigno (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*ALTITUDINE:* 1900 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*NOTE:* Secondo Fiori (1892b) va ricondotta a questa specie la segnalazione erroneamente attribuita a *Amphoridium mougeotii* Schimp. (= *Amphidium mougeotii*) riportata nella pubblicazione dello stesso Fiori del 1886

*Andreaea* Hedw. (Andreaeaceae)

*Andreaea rupestris* Hedw. var. *rupestris*

*SINONIMI:* *Andreaea petrophila* Ehrh. ex Fürnr.

**Parma:** Lago Merdaro, Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Santo (Fitzgerald & Bottini 1881) – **Reggio Emilia:** Alpi di Camporaghena (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Alpi di Mommio, Le Forbici alle sorgenti del Dolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Lago Cerretano, Praderena sopra Ospitaletto di Ligonchio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Lago Cerretano, Monte Casarola (Casali 1899b) – **Modena:** San Pellegrino, Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Santo (Fiori 1886) – **Bologna:** Vallata del Dardagna al Corno alle Scale (Farneti 1889)

*DATI D'ERBARIO:* **Parma:** Lago Palo, Fitzgerald 1879 [FI] (Raffaelli 1973) – **Reggio Emilia:** Lago Cerretano, Fiori 1885 [FI] (Raffaelli 1973); Ospitaletto di Ligonchio, Fiori 1885 [FI] (Raffaelli 1973) – **Modena:** Lago Santo, Fiori 1884 [FI] (Raffaelli 1973); Appennino modenese, Fiori 1884 [FI] (Raffaelli 1973)

*ECOLOGIA:* Sulle rupi (Farneti 1889); Sul macigno delle rupi, dirupi (Fiori 1886; Casali 1899b)

*ALTITUDINE:* Da 1500 m alla cima (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1500 m (Raffaelli 1973, dati d'erbario Fitzgerald 1879); Nella regione nuda dell'Appennino, più raramente al limite superiore dei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b)

*NOTE:* La segnalazione del Lago Cerretano di Casali è sia una citazione della segnalazione di Fiori sia una conferma con dati propri. Non è ben chiaro se le segnalazioni di Fiori (1886) al Lago Santo si riferiscano al Lago Santo modenese o a quello parmense. Raffaelli (1973) nel suo lavoro riporta in realtà la segnalazione per la provincia di Parma. Occorre però notare che Fiori, sulla base delle località citate nel suo lavoro (1886), pare non essersi mai spinto in quella zona e tutte le segnalazioni relative a quell'area derivano da citazioni della pubblicazione di Fitzgerald & Bottini (1881). Inoltre a volte è evidenziato come l'autore citi esplicitamente il lago del modenese. Per tale motivo, qualora compaia l'indicazione da parte di Fiori (1886) del Lago Santo, verrà sempre inteso il Lago Santo modenese. Si tratta chiaramente di una ipotesi per cui la questione in sostanza non è chiara

*Anomobryum* Schimp. (Bryaceae)

*Anomobryum concinnatum* (Spruce) Lindb.

*SINONIMI:* *Anomobryum filiforme* (Dicks.) Husn. subsp. *concinnatum* (Spruce) J.J. Amann

**Ravenna:** Pineta di San Vitale (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA:* Muri (Zangheri 1966b)

*Anomodon* Hook. & Taylor (Anomodontaceae)

*Anomodon attenuatus* (Hedw.) Huebener

**Reggio Emilia:** Campegine, Roncocesi, Roncolo (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena:** Bosco di Campogalliano lungo la Secchia presso Modena, Rio Vallurbana (Fiori 1886) – **Bologna:** Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola e al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000) – **Forlì-Cesena:** San Giovanni in Galilea (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Polenta (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Al piede degli alberi nel bosco, boschetti lungo un rio (Fiori 1886); Al piede degli alberi (Casali 1899a; Casali 1899b); Nelle fessure delle rocce (Zangheri 1959); Terra, ceppi, fessure rocce calcaree (Zangheri 1966b); Su tronco marcescente e su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

*Anomodon rugelii* (Müll. Hal.) Keissl.

**SINONIMI:** *Anomodon apiculatus* Sull.

**Parma:** Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Geheeb 1883)

**ECOLOGIA:** Sulle rupi (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Geheeb 1883)

**ALTITUDINE:** 1000 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Geheeb 1883)

*Anomodon viticulosus* (Hedw.) Hook. & Taylor

**Parma:** Vigheffio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** La Veggia presso Sassuolo, Castello di Borzano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Villa Canali, Villa Cavazzoli, San Claudio (Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) – **Modena:** Casinalbo, Bosco di Campogalliano, San Cataldo presso Modena (Fiori 1886) – **Bologna:** Madonna dell'Acero (Bertoloni 1844; Cocconi 1881); Rio Maggiore (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Provincia di Bologna (Farneti 1889); Gessi bolognesi (Cobau 1932); Gessi bolognesi al Buco del Budriolo, a Acquafredda, al Buco dei Vinchi, al Buco della Gaibola, al Buco dei Buoi, a Monte Castello (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano alla Grotta M. Gortani (Aleffi 2016); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3, 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Castelraniero (Zangheri 1966b) – **Forlì-Cesena:** Roversano, Colli di Cesena, San Demetrio (Del Testa 1903); Selbagnone (Zodda 1921; Zangheri 1966b); San Savino (Zangheri 1966b) presso Casa Trove (Zodda 1921); Predappio, Ricò (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Bracciano, Polenta (Zangheri 1966b) – **Rimini:** SIC Onferno (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Posizioni alte delle ripe, al calcio degli alberi (Bertoloni 1865); Alveo e corso di un rio (Cocconi 1881); Appiè dei vecchi alberi (Avetta 1897); Al piede degli alberi specialmente quercie ed olmi, sui vecchi muri e sulle rupi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sugli abeti in un parco, in un bosco di querce (Zodda 1921); Sul terriccio e rocce calcaree (Zangheri 1959); Terra, ceppi, roccia calcarea (Zangheri 1966b); Su roccia, su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

**ALTITUDINE:** Fino alla regione del faggio (Farneti 1889); In pianura e in collina (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Antitrichia* Brid. (Leucodontaceae)

*Antitrichia curtispindula* (Hedw.) Brid.

**Parma:** Monte Orsajo, Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Montebabbio, Cerreto dell'Alpi, Valle dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Carpineti, Toano, Cervarezza, Montemiscoso, Vetto (Casali 1899b) – **Modena:** San Pellegrino, Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Montefiorino (Fiori 1886) – **Forlì-Cesena:** Comero (Del Testa 1903); Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Al piede degli alberi e sui sassi nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sui faggi (Del Testa 1903); Terra (Zangheri 1966b)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Dai colli alle alte montagne (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Archidium* Brid. (Archidiaceae)

*Archidium alternifolium* (Hedw.) Mitt.

**Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11733-1 (Fariselli et al. 2017)

*Atrichum* P. Beauv. (Polytrichaceae)

*Atrichum angustatum* (Brid.) Bruch & Schimp.

**Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11733-1 (Fariselli et al. 2017)

*Atrichum undulatum* (Hedw.) P. Beauv.

*SINONIMI:* *Catharinea undulata* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr; *Polytrichum undulatum* Hedw.

**Parma:** Collecchio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** La Veggia presso Sassuolo, Civago (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Cervarezza, Vetto (Casali 1899b); Pian Vallese, Abetina Reale, Monte Ravino (Velluti 1993); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Modena:** Montegibbio, Castelvetro (Fiori 1886) – **Bologna:** Madonna dell’Acerò (Bertoloni 1844; Fiori 1886); Gaibola (Bertoloni 1859 citato in Farneti 1889); Bologna, Ravone, Vallata del Sela sopra Vidicciatico (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Castelraniero (Bertoloni 1859; Del Testa 1903) – **Forlì-Cesena:** Comero, Colli di Cesena (Del Testa 1903); Ladino, Poggio Martino (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Appennino romagnolo (Del Testa 1903); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a) *ECOLOGIA:* Margini dei boschi (Avetta 1897); Nei boschi, boschetti, castagneti (Fiori 1886; Casali 1899b); Nei boschi (Del Testa 1903); Terreno, ceppi (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto (Velluti 1993) *ALTITUDINE:* 1284 m, 1500 m, 1500 m (Velluti 1993); Dai colli fino alla base dell’Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b); Nell’Appennino e nei colli (Del Testa 1903)

*Aulacomnium* Schwägr. (Aulacomniaceae)

*Aulacomnium palustre* (Hedw.) Schwägr.

**Piacenza:** Pratogrande di Granere (Razzara 1981) – **Parma:** Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Raimondo et al. 1980); Tra I Lagoni e il Lago Scuro, Circo glaciale di Monte Bocco, Prato Spilla, Paduli di Cima (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Prati di Pranda; Paduletta di Sillano (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena:** Monte Cantiere di Barigazzo (Fiori 1886); Cimone (Fiori 1886 citato in Raimondo et al. 1980); Prati di San Geminiano, Circo glaciale di Monte (Lago) Turchino (Gerdol & Tomaselli 1993); Lago Baccio (Fiori 1886; Provasi 1926 entrambi citati in Raimondo et al. 1980; Raffaelli et al. 1997)

*DATI D’ERBARIO:* **Modena:** Monte Cantiere di Barigazzo, Fiori 1884 [FI] (Raimondo et al. 1980); Lago Baccio, Fiori 1885 [FI] (Raimondo et al. 1980); Piandelagotti, Lunardi 1913 [FI] (Raimondo et al. 1980)

*ECOLOGIA:* Nei luoghi torbosi ed uliginosi (Fiori 1886)

*ALTITUDINE:* 1200 m, 1290 m, 1370 m, 1470 m, 1480 m, 1570 m, 1600-1660 m, 1660 m (Gerdol & Tomaselli 1993); Nelle alte montagne (Fiori 1886)

*Barbula* Hedw. (Pottiaceae)

*Barbula convoluta* Hedw. var. *convoluta*

*SINONIMI:* *Streblotrichum convolutum* (Hedw.) P. Beauv.

**Reggio Emilia:** Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena:** Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Montegibbio, Varana, Pescaro (Fiori 1886) – **Bologna:** Croara/Miserazzano (Ferrari 1974); Gessi bolognesi al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** San Martino in Strada (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)



*ECOLOGIA*: Sulla terra, sui muri e sulle rupi aride (Fiori 1886; Casali 1899b); Terreno (Zangheri 1966b); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000); Al suolo (Fariselli 2015)

*ALTITUDINE*: 1400 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Barbula unguiculata*** Hedw.

*SINONIMI*: *Tortula unguiculata* (Hedw.) P. Beauv. *nom. illeg.*

**Parma**: Orto Botanico di Parma, alveo della Baganza a Vigheffio, Monte Prinzera (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Cerreto dell'Alpi (Fiori 1866 citato in Casali 1899b); Dintorni di Reggio, Ca' dei Conti, Figno, Baiso (Casali 1899b); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Modena**: Orto Botanico di Modena, Casinalbo, Colli di Sassuolo, Fiumalbo (Fiori 1886) – **Bologna**: Gessi bolognesi a Siberia (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) a Miserazzano (Aleffi 2016); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-2, 11633-3, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Roversano, Colli di Cesena (Del Testa 1903); Ladino (Zodda 1921; Zangheri 1966b); San Savino (Zangheri 1966b) a Casa Trove (Zodda 1921); Castrocaro località Cozzi, Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959, Zangheri 1966b); Forlì, Romiti (Forlì), Vecchiazzano, Ronco, Castrocaro, Scardavilla, Lardiano, Passo dei Mandrioli (Zangheri 1966b) – **Rimini**: SIC Onferno (Aleffi et al. 2014) alla base del Castello (Aleffi 2016) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO*: Provincia di Parma, Serie II Fascicolo XVI 754, Passerini 1871

*ECOLOGIA*: Sul terreno ed i muri e le rupi terrose (Fiori 1886); Appiè degli alberi (Avetta 1897); Sul terreno, al piede degli alberi, sui muri e sulle rupi terrose (Casali 1899b); Nel bosco (Zodda 1921); Sul terriccio calcareo, sul calcare, sui gessi (Zangheri 1959); Terra, argille azzurre, terriccio e sfaticcio calcarei e gessosi (Zangheri 1966b); Ex cava su roccia (Aleffi & Silenzi 2000); Al suolo (Fariselli 2015)

***Bartramia*** Hedw. (Bartramiaceae)

***Bartramia halleriana*** Hedw.

*SINONIMI*: *Bartramia norvegica* Lindb. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Parma**: Lago Ballano (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Le Forbici (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b) – **Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Bologna**: Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Vallata del Dardagna all'Acero e al Fossone della Nuda (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena**: Monte Aiola (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sul macigno (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Sulle rupi lungo un ruscello (Fiori 1886); Nelle fessure delle rupi in luoghi umidi (Farneti 1889); Ceppi abete (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 1600 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)

***Bartramia ityphylla*** Brid.

**Reggio Emilia**: Vertice delle Alpi di Soraggio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Civago, Montevecchio alle sorgenti dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Alpe di Succiso (Avetta 1897 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Abetina Reale, Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Da Fiumalbo salendo il Cimone, Monte Cantiere di Barigazzo (Fiori 1886) – **Bologna**: Corno alle Scale, Santuario dell'Acero (Fiori 1886) – **Emilia**: Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991) – **Forlì-Cesena**: Campigna a La Tesa del Prete (Sanesi 1962); Campigna, Campigna località Burraia, Passo dei Mandrioli (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Nelle fessure del macigno sullo schisto argilloso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Nelle fessure dei sassi (Fiori 1886; Casali 1899b); Terra (Zangheri 1966b); Suolo in un vaccinieto e

in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1900 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1750 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Velluti 1993); 2050 m (Velluti 1993); Nei boschi e nella regione nuda dell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Bartramia pomiformis*** Hedw.

**SINONIMI:** *Bartramia pomiformis* Hedw. var. *crispa* (Brid.) Bruch & Schimp. *nom. illeg. incl. var. prior.*

**Parma:** Lago Ballano (Fitzgerald & Bottini 1881); Sala Baganza (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Cerreto dell'Alpi presso la Sega, Valle di Riarbero (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Modena:** Rocca Malatina (Fiori 1886) – **Bologna:** Madonna dell'Acero (Bertoloni 1844; Cocconi 1881); Monte Granaglione (Bertoloni 1865; Cocconi 1881; Fiori 1886); Vallata del Dardagna a Rio Piano (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena:** Monte Ajola (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sulle rupi umide e sulla terra alla base dei castagni (Bertoloni 1865); Castagneti (Fiori 1886); Sulle rupi umide ed ombreggiate (Farneti 1889); Boschi (Avetta 1897); Nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Terra (Zangheri 1966b)

**ALTITUDINE:** Nella regione montana ed appenninica (Fiori 1886; Casali 1899b);

***Blindia*** Bruch & Schimp. (Seligeriaceae)

***Blindia acuta*** (Hedw.) Bruch & Schimp.

**Parma:** Dal Monte Orsajo al lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881) – **Reggio Emilia:** Dal Monte Orsajo al lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881); Valle dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena:** Dal Monte Orsajo al lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881); Lago Santo (Fiori 1886)

**ECOLOGIA:** Sulle rupi umide (Casali 1899b)

**ALTITUDINE:** Alto Appennino (Casali 1899b)

***Brachydontium*** Fürnr. (Seligeriaceae)

***Brachydontium trichodes*** (F. Weber) Milde

**SINONIMI:** *Brachyodus trichodes* (F. Weber) Nees & Hornsch.

**Parma:** Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881); Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Lago del Barone (Lago Cerretano) (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b; Provasi 1938); Abetina Reale (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Sulle rupi umide (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Arenaria lungo le sponde di un torrente (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Velluti 1993)

***Brachytheciastrum*** Ignatov & Huttunen (Brachytheciaceae)

***Brachytheciastrum collinum*** (Schleich. ex Müll. Hal.) Ignatov & Huttunen

**SINONIMI:** *Brachythecium collinum* (Schleich. ex Müll. Hal.) Schimp.

**Reggio Emilia:** Monte Cusna (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Suolo in un nardeto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1700 m (Velluti 1993)

***Brachytheciastrum trachypodium*** (Brid.) Ignatov & Huttunen

**SINONIMI:** *Brachythecium trachypodium* (Brid.) Schimp.

**Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

***Brachytheciastrum velutinum*** (Hedw.) Ignatov & Huttunen var. ***velutinum***

**SINONIMI:** *Brachythecium velutinum* (Hedw.) Bruch & Schimp.; *Hypnum velutinum* L. ex Hedw.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Collecchio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Colli di Montebabbio, Cerreto dell'Alpi (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Regnano, Mora presso Toano, Quattro Castella (Casali 1899b); Passo della Cisa, Pian Vallese, Abetina Reale, Monte Cusna, Monte Prado, Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena:** Casinalbo, Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena, Colli di Sassuolo, da Fiumalbo salendo il Cimone, Fignola a Barigazzo (Fiori 1886) – **Bologna:** Santuario dell'Acero; Colle di San Luca presso Bologna (Fiori 1886); Vallata del Dardagna (Farneti 1889); Gessi bolognesi al Buco del Budriolo e al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) – **Forlì-Cesena:** Giogana dell'Appennino passato Poggio Scali (Pichi & Bottini 1888); Roversano, San Tommaso (Del Testa 1903); Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Nei boschi, nei prati, sulla terra, sui sassi e sui tronchi d'alberi (Bracciforti 1877); Alla base dei faggi e degli abeti (Pichi & Bottini 1888); Nei boschi (Avetta 1897); Sul terreno, al piede degli alberi nei boschi e sui ceppi lungo le siepi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul tronco degli alberi e sul terreno nei boschi (Del Testa 1903); Terra, rocce calcaree, cortecce (Zangheri 1966b); Suolo, arenaria, tronco di faggio morto e scorza di faggio in un faggeto, scorza di faggio in una prateria al limite del bosco, suolo in una prateria discontinua di crinale e in un vaccinieto (Velluti 1993); Su ceppaia, su terreno misto a gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

**ALTITUDINE:** 1250 m, 1284 m, 1400 m, 1420 m, 1460 m, 1500 m, 1550 m, 1600 m, 1720 m, 1750 m, 1820 m, 1980 m (Velluti 1993); In collina (Del Testa 1903)

***Brachythecium*** Schimp. (Brachytheciaceae)

***Brachythecium albicans*** (Hedw.) Schimp.

**Modena:** Le Radici lungo la via Nazionale (Bottini 1913)

**ALTITUDINE:** 1540 m (Bottini 1913)

***Brachythecium campestre*** (Müll. Hal.) Schimp.

**Reggio Emilia:** Abetina Reale, Monte Ravino (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Suolo, arenaria e scorza di faggio in un faggeto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1390 m, 1470 m, 1550 m, 1600 m, 1820 m (Velluti 1993)

***Brachythecium cirrosum*** (Schwägr.) Schimp.

**Parma:** Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Brachythecium erythrorrhizon*** Schimp. subsp. ***erythrorrhizon***

**DATI D'ERBARIO:** **Reggio Emilia:** Monte Prado, Velluti s.d. [CAME] (Aleffi et al. 2008)

**ALTITUDINE:** 1820 m (Aleffi et al. 2008)

**NOTE:** Nella nota alla pubblicazione di Aleffi et al. si legge che il campione risulta raccolto da Velluti sul Monte Prado; aggiungiamo noi, quasi certamente durante la ricerca che ha portato alla redazione della tesi di dottorato (Velluti 1993)

***Brachythecium geheebii*** Milde

**Parma:** Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Geheeb 1883)

**ECOLOGIA:** Nelle faggete, sulle rupi (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

**ALTITUDINE:** 1100 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1000 m (Geheeb 1883)

***Brachythecium glareosum*** (Bruch ex Spruce) Schimp.

**Reggio Emilia:** Passo della Cisa, Pian Vallese, Monte Cusna (Velluti 1993) – **Bologna:** Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889 citato in Fiori 1892b); Gessi bolognesi al Buco della Gaibola, alla Grotta della

Spipola e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Castelraniero (Zangheri 1966b)  
**ECOLOGIA**: Sulle rupi e alla base degli alberi (Farneti 1889 citato in Fiori 1892b); Terra (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto e in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993); Su terreno misto a gesso, su gesso, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)  
**ALTITUDINE**: 1284 m, 1500 m, 2050 m (Velluti 1993)

***Brachythecium rivulare*** Schimp.

**SINONIMI**: *Brachythecium rivulare* Schimp. var. *cataractarum* Saut.

**Parma**: Monte Orsajo, Monte Malpasso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Ballano (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1938); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980; Razzara 1981); Prato Spilla (Gerdol & Tomaselli 1988); Alta Val Parma e Cedra (Ferrari 2002b) – **Reggio Emilia**: Lama del Rio in Valle dell’Ozzola, Fontanone alle sorgenti del Dolo (Fiori 1892b citato in Casali 1899b); Monte Prado (Bottini 1913); Alto Appennino reggiano (Ferrari 2002a) – **Modena**: San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886, in Farneti 1889 e in Provasi 1926); Alpe di San Pellegrino presso la strada mulattiera Vandelli (Bottini 1913); Alta Valle delle Tagliole, Monte Rondinaio (circo Est) (Gerdol & Tomaselli 1988); Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1926; Raffaelli et al. 1997) – **Bologna**: Vallata del Dardagna a Rio Piano (Farneti 1889); Corno alle Scale (Gerdol & Tomaselli 1988); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Ladino, Monte Falco (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA**: Sul fondo ghiaioso dei ruscelli (Farneti 1889); Nei rigagnoli (Fiori 1892b; Casali 1899b); Nei boschi di faggi ed abeti ed in luoghi circconvicini, nei ruscelletti (Bottini 1913); Terra, rocce calcaree umide (Zangheri 1966b)

**ALTITUDINE**: 1650 m (Fitzgerald & Bottini 1881); 1700 m, 1800 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Bottini 1913); 1550 m (Bottini 1913); Alto Appennino (Fiori 1892b; Casali 1899b)

**NOTE**: In letteratura esiste anche una segnalazione per l’Appennino tosco-emiliano (Ferrarini 1982) con l’indicazione stazionale generica di “Lagheti e acquitrini dal Passo della Cisa al Passo delle Radici”

***Brachythecium rutabulum*** (Hedw.) Schimp. var. *rutabulum*

**SINONIMI**: *Hypnum rutabulum* Hedw.; *Brachythecium rutabulum* (Hedw.) Schimp. var. *plumulosum* Schimp.; *Brachythecium rutabulum* (Hedw.) Schimp. var. *turgescens* Limpr.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Parma, Noceto, Collecchio, Vigheffio (Avetta 1897); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980) – **Reggio Emilia**: Colli di San Valentino, Tana della Muscina a Borzano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Villa Ospizio, San Maurizio, Villa Cavazzoli a San Giulio, Roncoesi (Casali 1899b); Monte Prado (Velluti 1993) – **Modena**: San Faustino presso Modena, Orto Botanico di Modena, Casinalbo, Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena (Fiori 1886) – **Bologna**: Meloncello (Bertoloni 1859 citato in Farneti 1889; Cocconi 1881); Gessi bolognesi (Cobau 1932); Buca della Spipola (Fiori 1886; Aleffi & Silenzi 2000); Gaibola (Farneti 1889; Aleffi & Silenzi 2000); Gessi bolognesi a Miserazzano, al Buco dei Buoi e a Siberia (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3, 11633-4, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ferrara**: Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Ravenna**: Persolino presso Faenza, Castelraniero (Del Testa 1903); Pineta di Classe (Zangheri 1966b); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Colli di Cesena all’Eremo, Cesena (Del Testa 1903); Bertinoro (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); Monte dei Cappuccini presso Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Predappio (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Carpinello, Forlì, Ladino, Vecchiazano, Polenta, Campigna, Campigna località Burraia, Piancancelli (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA**: In terra, sui sassi e sui tronchi d’alberi (Bracciforti 1877); Sui gessi (Farneti 1889); Sulle mura, sui sassi (Avetta 1897); Lungo le sponde dei fossi e nei boschi sul terreno (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul

marginie dei fossi, sul terreno nei boschi, sugli alberi, nei cortili delle case, argini della ferrovia (Del Testa 1903); Terra, rocce calcaree, cortecce (Zangheri 1966b); Suolo lungo ruscellamenti ed arenaria lungo le sponde di un torrente (Velluti 1993): Sulla parete dell'inghiottitoio, su *Sambucus nigra*, su gesso, su roccia, su *Ulmus minor*, su *Quercus pubescens*, su tronco marcescente (Aleffi & Silenzi 2000); Al suolo, su *Pinus pinea*, su *Pinus pinaster* e su legno marcescente (Fariselli 2015)

**ALTITUDINE:** 1750 m, 1770 m (Velluti 1993); In pianura e collina (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Brachythecium salebrosum*** (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.

**Parma:** Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Alpe di Succiso (Avetta 1897 citato in Casali 1899b); Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Bosco di Campogalliano lungo la Secchia presso Modena (Fiori 1886); Serpentine di Varana (Fiori 1892b) – **Bologna:** Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena:** Bertinoro (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); Campigna località Burraia, Monte Fumaiolo (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sopra gli alberi (Fiori 1886); Sopra un faggio giacente e fracido (Avetta 1897 citato in Casali 1899b); Sul tronco degli alberi (Del Testa 1903); Sui gessi (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Suolo in un nardeto, in una prateria discontinua su detriti marnosi ed in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993); Terra, cortecce (Zangheri 1966b); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

**ALTITUDINE:** 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881; Velluti 1993); 1800 m, 1850 m, 1990 m (Velluti 1993)

**NOTE:** Sulla base della revisione dei campioni d'erbario la segnalazione di Fariselli (2015) è da ritenersi erronea in quanto il campione esaminato corrisponde in realtà a *B. rutabulum*

### ***Bryoerythrophyllum*** P.C. Chen (Pottiaceae)

***Bryoerythrophyllum recurvirostrum*** (Hedw.) P.C. Chen

SINONIMI *Didymodon rubellus* Bruch & Schimp.

**Parma:** Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Monti sopra Berceto (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Appennino di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Toano, Vetto, Leguigno (Casali 1899b); Monte Prado, Abetina Reale (Velluti 1993) – **Modena:** Montebanzone, Montefiorino, Fiumalbo (Fiori 1886) – **Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Monte Aiola, Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sulla terra (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Al margine dei boschi di faggio (Avetta 1897); Sui muri, sulle rupi ed al piede degli alberi (Fiori 1886; Casali 1899b); Terreno, muri a secco (Zangheri 1966b); Suolo in una prateria discontinua di crinale e argillite in un faggeto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1400 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1500 m, 1980 m (Velluti 1993); Al colle e al monte (Fiori 1886; Casali 1899b)

### ***Bryum*** Hedw. (Bryaceae)

***Bryum argenteum*** Hedw.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Alveo della Baganza a Vigheffio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Lungo la Secchia a Rubiera, Valle dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); San Polo presso l'Enza, Montecavolo, Rivalta lungo la Modolena, Villa San Pellegrino (Casali 1899b) – **Modena:** Casinalbo, Varana (Fiori 1886); Lungo la Secchia a Sassuolo (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Bologna:** Vallata del Sela lungo la mulattiera Porretta-Lizzano, Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889); Gessi bolognesi a Palestrina (Aleffi & Silenzi 2000); San Lazzaro di Savena nell'altipiano di Miserrazzano (Pellis et al. 2014); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca,

Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014) – **Ferrara:** Paludi ferraresi (Zangheri 1925) – **Ravenna:** Errano, Faenza (Del Testa 1903) – **Forlì-Cesena:** Castrocaro località Cozzi (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); San Martino in Villafranca, San Varano (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA:* Sui tronchi d'alberi fracidi (Bracciforti 1877); Nelle sabbie dei fiumi e lungo le vie (Fiori 1886; Casali 1899b); Su una capanna e sui ruderi del ponte vecchio (Del Testa 1903); Sullo sfaticcio calcareo (Zangheri 1959); Terra (Zangheri 1966b); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*NOTE:* In letteratura esiste una segnalazione per il SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) di cui non è stato possibile attribuire la provincia di appartenenza. La segnalazione di Fiori "Lungo la Secchia a Sassuolo" non è ben chiaro se sia da attribuirsi alla parte modenese o reggiana; Casali la cita per il Reggiano

***Bryum canariense*** Brid.

*SINONIMI:* *Bryum canariense* Brid. subsp. *provinciale* (H. Philib.) Giacom.

**Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

***Bryum dichotomum*** Hedw.

*SINONIMI:* *Bryum atropurpureum* Bruch & Schimp. *nom. Illeg.*; *Bryum bicolor* Dicks.; *Bryum versicolor* A. Braun *ex* Bruch & Schimp.

**Parma:** Collecchio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena:** Lungo la Fossetta presso Sassuolo (Fiori 1886) – **Bologna:** Croara/Miserazzano (Ferrari 1974); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Pineta di Classe (Zangheri 1966b) – **Forlì-Cesena:** Casticciano (Zodda 1921); Monte Casale (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Pianta, Forlì (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950)  
*ECOLOGIA:* Sulle rocce calcaree (Zodda 1921); Terra, roccia calcarea (Zangheri 1966b)

***Bryum elegans*** Nees

*SINONIMI:* *Bryum capillare* Hedw. subsp. *elegans* (Nees) Lindb.; *Bryum capillare* Hedw. var. *ferchellii* (Funck *ex* Brid.) Bruch & Schimp.

**Forlì-Cesena:** Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA:* Terra (Zangheri 1966b)

*NOTE:* In letteratura esistono diverse segnalazioni per l'aggregato *Bryum erythrocarpum* rispettivamente per le località di Collecchio, in provincia di Parma, nei boschi (Avetta 1897); a San Pellegrino, in provincia di Modena, sulla terra (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); ed infine per la località di Ladino, in provincia di Forlì-Cesena, in un bosco di querce (Zodda 1921) e, sempre a Ladino, sulla terra (Zangheri 1966b) In tutti i casi la segnalazione è relativa a *Bryum erythrocarpum* Schwägr. ad eccezione della segnalazione di Zodda in cui è citata come *B. erythrocarpum* Schwägr. var. *pseudomarginatum* Podp.

***Bryum intermedium*** (Brid.) Blandow

**Ravenna:** Pineta di Classe (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA:* Terra (Zangheri 1966b)

***Bryum klingraeffii*** Schimp.

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Velluti 1993)

*ECOLOGIA:* Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE:* 1980 m (Velluti 1993)

***Bryum kunzei*** Hornsch.

**Reggio Emilia:** Monte Cusna (Velluti 1993)

*ECOLOGIA:* Suolo in una prateria discontinua su detriti marnosi (Velluti 1993)

*ALTITUDINE:* 1800 m (Velluti 1993)

***Bryum radiculosum*** Brid.

*SINONIMI:* *Bryum murale* Wilson *ex* Hunt. *hom. illeg.*

**Reggio Emilia:** Castello di Albinea, Bianello alle Quattro Castella, Reggio, Bagnolo in Piano (Casali 1899b) – **Modena:** Rocca di Spezzano, Fiorano, Sant'Agnese presso Modena, lungo via Giardini da Formigine a Maranello (Fiori 1886 citato genericamente in Brizi 1892-1894) – **Bologna:** Gessi bolognesi lungo la via della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Emilia:** Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950) – **Forlì-Cesena:** Cesena (Del Testa 1903); Bertinoro (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); Ladino (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Forlì, Scardavilla (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950)  
*ECOLOGIA:* Nelle fessure dei muri (Fiori 1886; Casali 1899b); Ripe sabbiose dei colli (Del Testa 1903); Sulle rupi calcaree plioceniche (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); Sui muri (Zodda 1921); Terra, muri (Zangheri 1966b); Su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)  
*ALTITUDINE:* In pianura e in collina (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Bryum ruderale*** Crundw. & Nyholm

**Bologna:** Gessi bolognesi lungo la via della Gaibola, al Buco della Spipola e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); San Lazzaro di Savena nell'altipiano di Miserazzano (Pellis et al. 2014); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014)  
*ECOLOGIA:* Su terreno, su gesso, su roccia, su terreno fangoso lungo un fosso (Aleffi & Silenzi 2000)

***Bryum sauteri*** Bruch & Schimp.

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Velluti 1993)  
*ECOLOGIA:* Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)  
*ALTITUDINE:* 1980 m (Velluti 1993)

***Bryum schleicheri*** DC.

*SINONIMI:* *Bryum schleicheri* DC. var. *latifolium* (Schwägr.) Schimp.

**Parma:** Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980; Razzara 1981) – **Reggio Emilia:** Alpi di Soraggio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Prati di Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Lago Calamone, Lago della Caregine (Provasi 1938) – **Modena:** San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Monte Cantiere di Barigazzo, Salendo il Libro Aperto (Fiori 1886); Lago Scaffajolo (Fiori 1886; Farneti 1889 citato in Provasi 1926); Appennino modenese (Levier 1905); Piandelagotti sotto l'Imbrancamento (Bottini 1914); Rondinajo, Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1926); Lago Baccio-Monte Rondinaio (Credaro et al. 1980) – **Bologna:** Vallata del Dardagna al Baggioledo, a Valdigordo e al Cavone del Corno alle Scale (Farneti 1889); Alta valle di Dardagna (Credaro et al. 1980); Corno alle Scale (Gerdol & Tomaselli 1988) – **Forlì-Cesena:** Fumaiolo (Del Testa 1903); Piancancelli, Campigna località Burraia (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
*ECOLOGIA:* Nei luoghi acquitrinosi e lungo i ruscelli (Fiori 1886; Casali 1899b); Negli acquitrini (Farneti 1889; Del Testa 1903); Negli stillicidi (Bottini 1914); Terra (Zangheri 1966b)  
*ALTITUDINE:* A più di 1000 m (Del Testa 1903); 1300 m (Bottini 1914); 1500-1600 m, 1580-1700 m (Credaro et al. 1980); All'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Bryum turbinatum*** (Hedw.) Turner

**Reggio Emilia:** Passo della Cisa (Velluti 1993) – **Modena:** Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1926)  
*ECOLOGIA:* Sulla torba (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Suolo in un faggeto (Velluti 1993)  
*ALTITUDINE:* 1620 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1600 m (Velluti 1993)

***Bryum weigelii*** Spreng.

*SINONIMI:* *Bryum duvalii* Voit in Sturm

**Reggio Emilia:** Appennino di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)  
*ECOLOGIA:* In luogo uliginoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)

*Calliergon* (Sull.) Kindb. (Calliergonaceae)*Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb.

*SINONIMI*: *Hypnum cordifolium* Hedw.

**Parma**: Monte Orsaro tra il Lago Santo ed il vertice (Bottini 1914); Prato Spilla, Alto circo di Prato Spilla (Tomaselli & Gerdol 1983); Padule del Braiola, I Lagoni, Colla Val di Tacca, Capanna Biancani, Paduli di Cima, Lago Verdarolo, Lago Squincio (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia**: Versante Reggiano dell'Appennino di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886, in Casali 1899b e in Tomaselli & Gerdol 1983); Lago Cerretano (Bottini 1913); Lago di Monte Acuto (Tomaselli & Gerdol 1983) – **Modena**: Passo del Piastrino (Bottini 1913); Nell'alto Appennino di Piandelagotti (Bottini 1914); Le Maccherie (Tomaselli & Gerdol 1983), Lago Baccio (Tomaselli & Gerdol 1983; Gerdol & Tomaselli 1993; Raffaelli et al. 1997)

*DATI D'ERBARIO*: **Parma**: Tra il lago Santo ed il Monte Orsaro, Martelli 1913 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983) – **Reggio Emilia**: Lago Scuro, Bottini 1879 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Lago Cerretano, Bottini 1912 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983) – **Modena**: Passo del Piastrino, Bottini 1912 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Sotto le Radici, Lunardi 1913 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Piandelagotti al Lagaccio Palandri, Lunardi 1913 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Monte Spicchio, Lunardi 1913 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Sotto la Punta Cimetta, Bottini 1913 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Piandelagotti, Lunardi 1914 [FI] (Tomaselli & Gerdol 1983)

*ECOLOGIA*: Alto Appennino in luogo uliginoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Nelle acque lentamente scorrenti in una conca a Cariceto-Erioforeto, rive torbose di un lago (Bottini 1913); Nell'alto Appennino macigno, negli acquitrini ed al margine degli stagni (Bottini 1914)

*ALTITUDINE*: 1300 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b; Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Bottini 1879); 1520 m (Bottini 1913); 1360 m (Bottini 1913; Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Bottini 1912); 1350-1550 m (Bottini 1914); 1600 m (Bottini 1914; Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Martelli 1913); 1350 m, 1540 m, 1550 m, 1576 m, 1670 m (Tomaselli & Gerdol 1983); 1200 m, 1241 m, 1370 m, 1340-1380 m, 1390 m, 1554 m, 1570 m, 1574 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1450 m (Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Lunardi 1913); 1200-1600 (Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Lunardi 1914)

*Calliergon giganteum* (Schimp.) Kindb.

*SINONIMI*: *Hypnum giganteum* Schimp.

**Parma**: Lago Ballano (Bottini 1913); Sopra il Lago Verde, Capanna Biancani (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia**: Versante Reggiano dell'Appennino di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886, in Casali 1899b e in Tomaselli & Gerdol 1983) – **Modena**: Valli di Sant'Anna lungo il Panaro presso Modena (Fiori 1886); Presso Modena (Venturi 1886); Piandelagotti a San Geminiano (Bottini 1913); Piandelagotti presso il Prato del Morto, alla casa del Magnano e al Lagaccio Palandri (Bottini 1914); Lago della Risaia (Tomaselli & Gerdol 1983)

*DATI D'ERBARIO*: **Modena**: Prati di San Geminiano, Bottini 1912 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Piandelagotti, Lunardi 1913 [FI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Piandelagotti presso il Prato del Morto, Bottini 1913 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Alla casa del Magnano, Lunardi 1913 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Al Lagaccio Palandri, Lunardi 1913 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983)

*ECOLOGIA*: Alto Appennino in luogo uliginoso (Fitzgerald & Bottini 1881); Fossi (Venturi 1886); In un Erioforeto (Bottini 1913); Appennino calcareo sommerso in uno stagno, nell'acqua corrente di un ruscello (Bottini 1914)

*ALTITUDINE*: 1470 m (Bottini 1913; Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Bottini 1912); 1300 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Tomaselli & Gerdol 1983; Bottini 1914; Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Bottini 1913); 1200 m (Bottini 1914; Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Lunardi 1913); 1350 m (Bottini 1914; Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Lunardi 1913); 1550 m (Tomaselli & Gerdol 1983); 1570 m, 1600 m (Gerdol & Tomaselli 1993)



*Calliergonella* Loeske (Hypnaceae)

*Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske

*SINONIMI*: *Acrocladium cuspidatum* (Hedw.) Lindb.; *Hypnum cuspidatum* Hedw.; *Hypnum cuspidatum* Hedw. var. *pungens* Schimp.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877); Pratogrande di Granere (Razzara 1981) – **Parma**: Lago di Monte Caio (Provasi 1938); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980); Prato Spilla (Gerdol & Tomaselli 1988); Tra I Lagoni e il Lago Scuro, Paduli di Cima (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia**: Rio della Rocca a San Valentino (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Cavazzone, Roncolo lungo il Quaresimo, Codemondo lungo il Quaresimo, Roncoesi (Casali 1899b); Lago Cerretano (Provasi 1938); Pianacci, Lago Calamone, Prati di Pranda, Pian Vallese (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena**: Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena, Casinalbo, Guiglia, Maranello (Fiori 1886); Piandelagotti al Lagaccio Palandri (Bottini 1914); Le Maccherie, Passo Cento Croci (Gerdol & Tomaselli 1993); Lago Baccio (Gerdol & Tomaselli 1993; Raffaelli et al. 1997) – **Bologna**: Rio Maggiore (Bertoloni 1865); Vallata del Dardagna alla Chiesina, all'Acero e al Cavone del Corno alle Scale (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ferrara**: Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Forlì-Cesena**: Dintorni di Cesena (Del Testa 1903); Poggio Appennino presso Civitella (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Ladino, Vecchiazano, Scardavilla, Monte Casale, Polenta (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Entro l'acqua sopra rupi quasi sommerse (Bertoloni 1865); Nei boschi paludosi, nei fossati e negli stagni (Bracciforti 1877); Nei luoghi umidi (Farneti 1889); Nei prati, lungo le sponde dei fossi in luoghi umidi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul margine dei fossi, ripe umide dei colli, argini della ferrovia (Del Testa 1903); Appennino calcareo in una palude (Bottini 1914); In luoghi umidi di un bosco di castagno (Zodda 1921); Terra, sassi, ruscelli, cortecce (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 1350 m (Bottini 1914); 1200 m, 1240 m, 1270 m, 1290 m, 1300 m, 1396 m, 1480 m, 1550 m, 1554 m (Gerdol & Tomaselli 1993); In pianura e in montagna (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Calliergonella lindbergii* (Mitt.) Hedenäs

*SINONIMI* *Hypnum arcuatum* Lindb. *hom. illeg.*; *Hypnum lindbergii* Mitt.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) tra il Lago Santo ed il vertice (Bottini 1914) – **Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Nei pascoli umidi (Bottini 1914)

*ALTITUDINE*: 1200 m, 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1600 m (Bottini 1914)

*Campyliadelphus* (Kindb.) R.S. Chopra (Amblystegiaceae)

*Campyliadelphus chrysophyllus* (Brid.) R.S. Chopra

*SINONIMI*: *Hypnum chrysophyllum* Brid.; *Campylium chrysophyllum* (Brid.) Lange

**Parma**: Monte Orsajo, Sopra il Lago Verde (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Modena**: Casinalbo, Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena, Montecerato, Campo di Lolio (Fiori 1886) – **Bologna**: Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889); Gessi bolognesi sulla via della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-3, 11633-4, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ferrara**: Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Forlì-Cesena**: Colli di Cesena, sugli argini del Savio e della ferrovia, Cesena (Del Testa 1903); Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Scardavilla, Cabelli (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sopra gli alberi, sulle argille scagliose (Fiori 1886); Sulla terra, più raramente al piede degli alberi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sulle pendici erbose dei colli (Del Testa 1903); Sul terriccio calcareo (Zangheri 1959); Terra, prati secchi (Zangheri 1966b); Su terreno e su ceppaia di *Quercus pubescens* (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1400 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*Campylium* (Sull.) Mitt. (Amblystegiaceae)

*Campylium protensum* (Brid.) Kindb.

*SINONIMI*: *Campylium stellatum* (Hedw.) Lange & C.E.O. Jensen subsp. *protensum* (Brid.) C. Jens.; *Hypnum protensum* Brid.; *Hypnum stellatum* Schreb. ex Hedw. var. *protensum* (Brid.) Röhl.

**Parma**: Lago Ballano (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: La Veggia presso Sassuolo (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Sant’Agnese presso Modena (Fiori 1886); Le Radici al principio della via per San Pellegrino, Sant’Anna Pelago sotto il vertice del Saltello (Bottini 1913) – **Forlì-Cesena**: Monte Falco versante Nord (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sponde dei fossi (Fiori 1886); Sulla terra sotto i faggi, in una conca paludosa (Bottini 1913)

*ALTITUDINE*: 1400 m, 1750 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1540 m, 1580 m (Bottini 1913)

*Campylium stellatum* (Hedw.) Lange & C.E.O. Jensen

*SINONIMI*: *Hypnum stellatum* Schreb. ex Hedw.

**Piacenza**: Pratogrande di Granere (Razzara 1981) – **Parma**: Sopra il Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980); Tra I Lagoni e il Lago Scuro, Colla Val di Tacca, Circo glaciale di Monte Bocco, Capanna Biancani, Paduli di Cima (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia**: Vertice delle Alpi di Sillano, Vertice delle Alpi di Soraggio, Le Forbici alle sorgenti del Dolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Civago (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola, Montemiscoso, Roncolo, Roncocesi, Villa Cavazzoli al Fontanello (Casali 1899b); Alta valle del Dolo (Bottini 1913); Paduletta di Sillano, Pian Vallese (Gerdol & Tomaselli 1993); Monte Prado (Velluti 1993) – **Modena**: Rondinajo, Lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Valli di Sant’Anna lungo il Panaro, Fontanazzi di San Faustino presso Modena, Casinalbo, Monte Cantiere di Barigazzo, Montegibbio (Fiori 1886) – **Bologna**: Gessi bolognesi al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-2, 11633-3, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Monte Fumajolo (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Lungo le sponde dei fossi e nei luoghi acquitrinosi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sulla terra umida tra i faggi (Bottini 1913); Rocce calcaree (Zangheri 1966b); Suolo lungo ruscellamenti (Velluti 1993); Alla base di *Quercus pubescens* (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1750 m, 1800 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1500 m (Bottini 1913); 1200 m, 1300 m, 1370 m, 1480 m, 1570 m, 1660 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1770 m (Velluti 1993)

*Campylophyllum* (Schimp.) M. Fleisch. (Hypnaceae)

*Campylophyllum calcareum* (Crundw. & Nyholm) Hedenäs

*SINONIMI*: *Campylium calcareum* Crundw. & Nyholm

**Bologna**: Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola, al Buco della Gaibola, al Buco del Budriolo, a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (Aleffi et al. 2014) a Acquafredda (Aleffi 2016) – **Forlì-Cesena**: Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA*: Su gesso, su terreno, su roccia, su *Quercus cerris*, su roccia lungo un torrente e su tronco marcescente (Aleffi & Silenzi 2000)

*Campylophyllum halleri* (Hedw.) M. Fleisch.

*SINONIMI*: *Campylium halleri* (Hedw.) Lindb.

**Bologna**: Gessi bolognesi al Buco dei Buoi e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (Aleffi et al. 2014) nella Valle dell’Acquafredda (Aleffi 2016)

*ECOLOGIA*: Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

***Campylophyllum sommerfeltii*** (Myrin) Hedenäs

**SINONIMI:** *Campylium hispidulum* Brid. var. *sommerfeltii* (Myr.) Lindb.; *Campylium sommerfeltii* (Myrin) Bryhn; *Hypnum sommerfeltii* Myrin

**Parma:** Roccamurata (Razzara 1981) – **Reggio Emilia:** Cavazzone, Regnano (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena:** Bosco di Campogalliano lungo la Secchia presso Modena, Rocca di Spezzano, Colli di Guiglia, Monteciccio presso Montebanzone (Fiori 1886) – **Forlì-Cesena:** Ladino, Meldola, Colmano (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Boschetti (Fiori 1886); Sui sassi ed al piede degli alberi (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Campylopus*** Brid. (Leucobryaceae)

***Campylopus pyriformis*** (Schultz) Brid.

**SINONIMI:** *Campylopus torfaceus* Bruch & Schimp.

**Parma:** Lago Ballano (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b; Provasi 1938)

**ECOLOGIA:** In luogo torboso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)

***Catoscopium*** Brid. (Catoscopiaceae)

***Catoscopium nigratum*** (Hedw.) Brid.

**Reggio Emilia:** Monte Cusna/Monte Prado (Tomaselli 1991)

***Ceratodon*** Brid. (Ditrichaceae)

***Ceratodon purpureus*** (Hedw.) Brid.

**Parma:** Collecchio, La Cisa, Monte Cajo, Lago Santo (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Civago, Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Collagna, Cinque Cerri, Ramiseto, Praderena, Monte Casarola (Casali 1899b); Monte Cusna/Monte Prado (Tomaselli 1991); Passo della Cisa, Abetina Reale, Monte Prado Monte Cusna (Velluti 1993); Alto Appennino reggiano (Ferrari 2002a) – **Modena:** Monte Cantiere di Barigazzo (Fiori 1886); Vallata del Dardagna al Monte Capelbuso (Farneti 1889) – **Bologna:** Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Vallata del Dardagna al Farneto, presso Cà d'Julio, a Monte Grande, al Cavone del Corno alle Scale; al Monte Capelbuso (Farneti 1889) – **Ravenna:** Sassatello (Zangheri 1966b) – **Forlì-Cesena:** Castrocaro, Campigna, Passo dei Mandrioli (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO:** Provincia di Parma, Serie II Fascicolo XI 509, Passerini 1871

**ECOLOGIA:** Sulle argille scagliose, sul macigno (Farneti 1889); Nei boschi cedui (Avetta 1897); Nei pascoli sui muri e sui tetti (Fiori 1886; Casali 1899b); Argille di calanco, sfaticcio di rocce gessose, terreno abetine (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto, in una prateria al limite del bosco e in una prateria discontinua di crinale, scorza di faggio in un nardeto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1500 m, 1600 m, 1700 m, 1720 m, 1750 m, 1820 m, 1980 m (Velluti 1993); Dalla regione montana all'appenninica (Fiori 1886) Al monte (Casali 1899b)

**NOTE:** Sulla base della revisione dei campioni d'erbario la segnalazione di Fariselli (2015) è stata esclusa prudenzialmente in quanto non si è rinvenuta la specie all'interno del campione

***Cinclidotus*** P. Beauv. (Pottiaceae)

***Cinclidotus aquaticus*** (Hedw.) Bruch & Schimp.

**SINONIMI:** *Gymnostomum aquaticum* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877)

**ECOLOGIA:** Cresce nei ruscelli, nei fossati e nelle fontane, ed attaccasi alle pietre del fondo (Bracciforti 1877)

*Cinclidotus fontinaloides* (Hedw.) P. Beauv.

**Bologna:** Bologna al Ravone (Farneti 1889)

*Cirriphyllum* Grout (Brachytheciaceae)

*Cirriphyllum crassinervium* (Taylor) Loeske & M. Fleisch.

*SINONIMI:* *Cirriphyllum crassinervium* (Taylor) Loeske & M. Fleisch. var. *turgescens* (Molendo) Mönk.; *Eurhynchium crassinervium* (Taylor) Schimp.; *Rhynchostegium crassinervium* (Taylor) De Not.

**Modena:** Vallata del Dardagna al Monte Capelbuso (Farneti 1889) – **Bologna:** Vallata del Dardagna alla Chiesina e al Monte Capelbuso (Farneti 1889); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Dintorni di Cesena (Del Testa 1903); Bagnolo di Castrocaro, Campigna, Balze località Scalette (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA:* Sul terreno (Del Testa 1903); Terreno, roccia calcarea, stillicidi (Zangheri 1966b)

*NOTE:* In letteratura esistono due segnalazioni per il modenese (Serpentini di Varana) ed il Reggiano (Monte del Gesso a Sandiano) erroneamente attribuite da Fiori (1886) a questa specie ma che in realtà si riferivano a *Plasteurhynchium striatulum* (Fiori 1892b)

*Cirriphyllum piliferum* (Hedw.) Grout

**Reggio Emilia:** Monte Cusna (Velluti 1993)

*ECOLOGIA:* Suolo in una prateria discontinua su detriti marnosi (Velluti 1993)

*ALTITUDINE:* 1850 m (Velluti 1993)

*Climacium* F. Weber & D. Mohr (Climaciaceae)

*Climacium dendroides* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr

**Piacenza:** Pratogrande di Granere (Razzara 1981) – **Parma:** Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980); Colla Val di Tacca, Capanna Biancani, Prato Spilla, Paduli di Cima, Lago Verde (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Civago, Valle di Riarbero (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Lago Cerretano (Casali 1899b); Lago Verde di Monte Ventasso (Provasi 1938); Monte La Piella versante Nord (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena:** Fignola a Barigazzo, Monte Modino di Frassinoro (Fiori 1886); Le Maccherie, Passo Cento Croci (Gerdol & Tomaselli 1993); Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1926; Gerdol & Tomaselli 1993; Raffaelli et al. 1997) – **Bologna:** Provincia di Bologna (Farneti 1889)

*ECOLOGIA:* Nei prati uliginosi e nei luoghi umidi dei boschi (Fiori 1886); Nei luoghi ombrosi ed umidi (Farneti 1889)

*ALTITUDINE:* 1620 (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1200 m, 1270 m, 1370 m, 1460 m, 1550 m, 1554 m, 1570 m, 1870 m (Gerdol & Tomaselli 1993); Nelle alte montagne (Fiori 1886); Nei colli e nei monti (Farneti 1889)

*Cratoneuron* (Sull.) Spruce (Amblystegiaceae)

*Cratoneuron filicinum* (Hedw.) Spruce

*SINONIMI:* *Hypnum filicinum* Hedw.

**Parma:** Passo della Cappelletta (Razzara 1980) – **Reggio Emilia:** Rio della Rocca (Fiori 1886); Colli di Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** Montecerato, Varana, Mulino di Bagiovara (Fiori 1886) – **Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3, 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Casticciano (Zodda 1921); Castrocaro località Cozzi, Monte Casale (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Vecchiazzano, San Lorenzo in Noceto, Scardavilla, Civitella di Romagna, Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA:* Nei prati umidi, lungo i fossi e presso le fonti (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul suolo calcareo

(Zodda 1921); Terra, lugno ruscelli, stillicidi, cascatelle (Zangheri 1966b); Suolo in una prateria al limite del bosco (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1750 m (Velluti 1993)

*Crossidium* Jur. (Pottiaceae)

*Crossidium crassinervium* (De Not.) Jur.

**Ravenna**: SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Borgo Rivola (inedito)

*Crossidium squamiferum* (Viv.) Jur.

*SINONIMI*: *Barbula membranifolia* (Hook.) Schultz; *Crossidium squamigerum* (Viv.) Jur. *nom. inval. err. orthogr.*

**Reggio Emilia**: Pietra di Bismantova (Fiori 1892b citato in Casali 1899b) – **Bologna**: Crovara nei colli Bolognesi (Fiori 1886); Gessi bolognesi (Cobau 1932) – **Ravenna**: Sasso (Zangheri 1959); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Sasso (inedito)

*ECOLOGIA*: Sulle rupi calcaree aridissime (Fiori 1892b citato in Casali 1899b); Sui gessi (Fiori 1892b; Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

*NOTE*: In questo lavoro si sono sempre tenute separate le segnalazioni relative a Sasso (Sasso Letroso) da quelle di Sassatello (forse Ca' Sassatello nelle immediate vicinanze) anche se si ha l'impressione molto forte che i due toponimi siano stati utilizzati in sostituzione l'uno dell'altro nelle due pubblicazioni (rispettivamente Zangheri 1959 e 1966b)

*Cryphaea* D. Mohr (Cryphaeaceae)

*Cryphaea heteromalla* (Hedw.) D. Mohr

*SINONIMI*: *Cryphaea arborea* (P. Beauv.) Lindb. *nom. inval.*; *Daltonia heteromalla* (Hedw.) Hook. & Taylor

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Romagna**: Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950 citato in Raimondo & Dia 1978-1979)

*ECOLOGIA*: Sui tronchi d'alberi, nei boschi montuosi, dove forma dei cesti tinti di un verde assai cupo (Bracciforti 1877)

*Ctenidium* (Schimp.) Mitt. (Hylacomiaceae)

*Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt.

*SINONIMI*: *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt. var. *gracile* (Boulay) Loeske; *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt. var. *squarrosulum* (Boulay) G. Roth; *Hypnum molluscum* Hedw.; *Hypnum molluscum* Hedw. var. *crispulum* Holler ex Molendo; *Hypnum molluscum* Hedw. var. *squarrulosum* Boulay

**Parma**: Lalatta sopra Ranzano (Avetta 1897); Roccamurata (Razzara 1981) – **Reggio Emilia**: Colli di San Valentino (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Borzano, Cavazzone (Casali 1899b); Alta valle del Dolo (Bottini 1913); Abetina Reale, Monte Ravino (Velluti 1993); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) alla Tana della Mussina (Aleffi 2016) – **Modena**: Montegibbio, Casinalbo, Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena, Monte Cantiere di Barigazzo (Fiori 1886) – **Bologna**: Bologna a Castiglione (Bertoloni 1859); Barbiano (Cocconi 1881); Buca della Spipola (Fiori 1886); Bologna a Gaibola, Vallata del Dardagna (Farneti 1889); Gessi bolognesi (Cobau 1932); Gessi bolognesi al Buco del Budriolo, a Miserazzano, al Buco dei Vinchi, al Buco dei Quercioli, al Buco della Gaibola, alla Grotta della Spipola e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-3, 11633-4, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Sasso (Zangheri 1959); Rivola, Monte della Volpe, Zattaglia, Monte Mauro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello, Castelraniero (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Monte Mauro, alla Tana del Re Tiberio, a Ca' di Sasso, a Monte della Volpe, a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Forli-Cesena**: Monte Comero, Colli di Cesena, San Demetrio (Del Testa

1903); Poggio Appennino presso Civitella (Zodda 1921); Ricò (Zangheri 1959); Campigna a La Tesa del Prete (Sanesi 1962); Monte dei Cappuccini di Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Casticciano (Zodda 1921; Zangheri 1966b); San Savino (Zangheri 1966b) presso Casa Trove (Zodda 1921); Predappio, Monte Casale (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Scardavilla, Bertinoro, Civitella di Romagna, Monte Ajola, Bocconi, Seguno, Bagno di Romagna, Campigna, Passo dei Mandrioli, Balze località Scalette (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Rimini**: SIC Onferno (Aleffi et al. 2014)

*ECOLOGIA*: In terra (Avetta 1897); Nei boschi e lungo le rive (Fiori 1886; Casali 1899b); Su gesso (Farneti 1889); Nei castagneti (Farneti 1889; Del Testa 1903); Sul terreno nei boschi (Del Testa 1903); Sulla terra sotto i faggi (Bottini 1913); In un bosco di castagno e in un altro di querce (Zodda 1921); Sulla terra calcarea, sullo sfaticcio, su gesso (Zangheri 1959); Terreno, ceppi, terriccio e rocce calcaree e gessose (Zangheri 1966b); Suolo e arenaria in un faggeto, suolo lungo le sponde di un torrente (Velluti 1993); Su roccia, sulla parete dell'inghiottitoio, su terreno, su roccia calcarea, su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1250 m, 1500 m, 1600 m (Velluti 1993); In pianura e in montagna (Fiori 1886; Casali 1899b)

### *Cynodontium* Schimp. (Rhabdoweisiaceae)

*Cynodontium bruntonii* (Sm.) Bruch & Schimp.

*SINONIMI*: *Dicranoweisia bruntonii* (Sm.) Schimp.

**Parma**: Monte Orsajo, Appennino di Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Modena**: Fra il Rondinajo e il Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Santo (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sulle rupi (Fiori 1886)

*ALTITUDINE*: 1750 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*Cynodontium gracilescens* (F. Weber & D. Mohr) Schimp.

**Reggio Emilia**: Monte Prado (Velluti 1993)

*ECOLOGIA*: Arenaria in un vacciniato (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 2020 m (Velluti 1993)

*Cynodontium polycarpon* (Hedw.) Schimp.

**Modena**: Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sul macigno (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*ALTITUDINE*: 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*Cynodontium tenellum* (Schimp.) Limpr.

**Reggio Emilia**: Abetina Reale, Monte Ravino, Monte Prado (Velluti 1993)

*ECOLOGIA*: Suolo e arenaria in un faggeto, suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1400 m, 1470 m, 1600 m, 1950 m (Velluti 1993)

### *Dichodontium* Schimp. (Rhabdoweisiaceae)

*Dichodontium flavescens* (Dicks.) Lindb.

*SINONIMI*: *Dichodontium pellucidum* (Hedw.) Schimp. var. *serratum* (Bruch & Schimp.) Schimp.

**Parma**: Malpasso lungo il Torrente della Spilla (Fitzgerald & Bottini 1881) – **Reggio Emilia**: Vertice delle Alpi di Soraggio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b) – **Modena**: Lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1926)

*ALTITUDINE*: 1800 m (Fitzgerald & Bottini 1881)

*NOTE*: Le segnalazioni presenti nelle pubblicazioni di Fiori (1886) e di Casali (1899b), citazioni di quelle di Fitzgerald & Bottini, sono lì riportate sotto il binomio *D. pellucidum*

***Dichodontium palustre*** (Dicks.) M. Stech

*SINONIMI*: *Bryum paluste* Sw.; *Dicranella palustris* (Dicks.) Crundw.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Modena**: Lago Baccio (Raffaelli et al. 1997)

*ECOLOGIA*: Nei luoghi paludosi dei boschi (Bracciforti 1877)

***Dichodontium pellucidum*** (Hedw.) Schimp.

*SINONIMI*: *Dichodontium pellucidum* (Hedw.) Schimp. var. *fagimontanum* (Brid.) Schimp.

**Reggio Emilia**: Montevecchio alle sorgenti dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Le Forbici (Bottini 1913); Monte Prado, Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena**: Cimone (Fiori 1886); Lago Baccio (Provasi 1926) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Pineta di Classe (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito)

*ECOLOGIA*: Nei pascoli umidi dell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b); Tra lo sfaticcio del macigno ombreggiato (Bottini 1913); Sui gessi (Zangheri 1959); Terreno calcareo, rocce gessifere (Zangheri 1966b); Suolo lungo ruscellamenti e arenaria in un faggeto e lungo le sponde detritiche di un lago (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1600 m (Bottini 1913); 1420 m, 1750 m, 1770 m (Velluti 1993)

*NOTE*: Si vedano anche le note di *D. flavescens*

***Dicranella*** (Müll. Hal.) Schimp. (Dicranaceae)

***Dicranella grevilleana*** (Brid.) Schimp.

**Modena**: San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sulla terra (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Dicranella heteromalla*** (Hedw.) Schimp.

**Parma**: Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Bologna**: Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000)

*ECOLOGIA*: Su terreno fangoso lungo un fosso (Aleffi & Silenzi 2000)

***Dicranella howei*** Renauld & Cardot

*SINONIMI*: *Anisothecium rubrum* (Huds.) Lindb. *nom. illeg. incl. spec. prior* var. *tenuifolium* (Bruch & Schimp.) Braithw.

**Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Cappuccinini (Forlì) (Zangheri 1966b)

*DATI D'ERBARIO*: **Modena**: Bosco di Campogalliano, Fiori 1881 [S] (Crundwell & Nyholm 1977)

*NOTE*: Il campione a cui fanno riferimento Crundwell & Nyholm molto probabilmente corrisponde a quello utilizzato da Fiori (1886) per la segnalazione di *D. varia* al Bosco di Campogalliano

***Dicranella humilis*** R. Ruthe

*SINONIMI*: *Dicranella varia* (Hedw.) Schimp. var. *tenella* Schimp.

**Forlì-Cesena**: Forlì (Zodda 1921)

*ECOLOGIA*: Su suolo calcareo (Zodda 1921)

***Dicranella subulata*** (Hedw.) Schimp.

**Reggio Emilia**: Le Forbici (Bottini 1913); Monte Prado (Tomaselli 1991; Rossi & Ferrari 1994) – **Emilia**: Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991)

*ECOLOGIA*: Tra lo sfaticcio del macigno ombreggiato (Bottini 1913)

*ALTITUDINE*: 1600 m (Bottini 1913)

***Dicranella varia*** (Hedw.) Schimp.

*SINONIMI*: *Anisothecium rubrum* (Huds.) Lindb. *nom. illeg. incl. spec. prior.*; *Dicranella rubra* Lindb.

**Parma**: Collecchio, La Cisa (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Dintorni di Reggio, Pecorile, Vezzano,

Codemondo, Roncocesi (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena**: Orto Botanico di Modena, Casinalbo, Colli di Sassuolo (Fiori 1886) – **Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-4 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Pineta di Classe, Pineta di San Vitale, Pineta di Cervia, Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Colli fra Cesena e Roversano (Del Testa 1903); Casticciano (Zodda 1921); San Savino (Zangheri 1966b) presso Casa Trove (Zodda 1921); Monte Casale, Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Pianta, San Varano, San Martino in Strada, Selbagnone, Colmano (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a) *ECOLOGIA*: Nella stoppia, in terra (Avetta 1897); Sul terreno umido, lungo i corsi d'acqua ecc. (Casali 1899a); Nella terra argillosa umida, nei campi, lungo i fossati ed i fiumi, ecc. (Casali 1899b); Sulle pendici nude (Del Testa 1903); Sul suolo calcareo (Zodda 1921); Sul calcare, sui gessi (Zangheri 1959); Terreno, sfaticcio roccia gessosa (Zangheri 1966b); Al suolo (Fariselli 2015)

*NOTE*: In letteratura esiste una segnalazione per il modenese di Fiori (1886) al Bosco di Campogalliano qui non riportata il cui campione è probabile corrisponda a quello revisionato da Crundwell & Nyholm (1977) e dagli autori determinato come *D. howei*

***Dicranodontium*** Bruch & Schimp. (Leucobryaceae)

***Dicranodontium denudatum*** (Brid.) Britt.

*SINONIMI*: *Dicranodontium longirostre* (F. Weber & D. Mohr) Bruch & Schimp.

**Reggio Emilia**: Lago del Barone (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)

*ECOLOGIA*: Sopra i faggi putridi (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)

***Dicranoweisia*** Milde (Rhabdoweisiaceae)

***Dicranoweisia cirrata*** (Hedw.) Lindb.

**Bologna**: Mongardino (Farneti 1889 citato in Fiori 1892b) – **Forlì-Cesena**: Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA*: Sulle sabbie gialle (Farneti 1889)

***Dicranum*** Hedw. (Dicranaceae)

***Dicranum bonjeani*** De Not.

**Piacenza**: Pratogrande di Granere (Razzara 1981) – **Modena**: Prati di San Geminiano (Tomaselli & Gerdol 1983)

*DATI D'ERBARIO*: **Modena**: Piandelagotti, Lunardi 1914 [FI] (Tomaselli & Gerdol 1983)

*ALTITUDINE*: 1450 m (Tomaselli & Gerdol 1983); 1400 m (Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Lunardi 1914)

***Dicranum fuscescens*** Sm.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881); Monte Molinatico (Avetta 1897); Lago dell'Olmo di Monte Molinatico (Provasi 1938) – **Reggio Emilia**: Le Forbici alle sorgenti del Dolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Monte Cusna, Monte Prado, Passo della Cisa (Velluti 1993) – **Modena**: San Pellegrino, Sopra il Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Forlì-Cesena**: Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA*: In luoghi uliginosi (Avetta 1897); Suolo in un vaccinieto e in una prateria discontinua di crinale, scorza di faggio in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1400 m (Fitzgerald & Bottini 1881); 1750 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1590 m, 1770 m, 1910 m, 2050 m (Velluti 1993)

***Dicranum majus*** Sm.

**Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)



***Dicranum scoparium*** Hedw.

*SINONIMI*: *Dicranum scoparium* Hedw. var. *orthophyllum* Brid.; *Dicranum scoparium* Hedw. var. *paludosum* Schimp.; *Dicranum scoparium* Hedw. var. *recurvatum* (Schultz) Brid.

**Parma**: Monte Cajo, La Cisa (Avetta 1897); Passo del Fugicchio (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia**: Montebabbio, Civago (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Cervarezza, Toano (Casali 1899b); Le Forbici (Bottini 1913); Paduletta di Sillano (Gerdol & Tomaselli 1993); Pian Vallese, Abetina Reale, Passo della Cisa, Monte Cusna, Monte Prado, Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881); Montegibbio, Rocca Malatina, Montefiorino (Fiori 1886) – **Bologna**: Monte porrettano (Bertoloni 1865); Bologna a Ronzano (Bertoloni 1859; Cocconi 1881); Campi di Lustrola (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Monte della Croce, Corno alle Scale (Cocconi 1881); Monte Granaglione (Fiori 1886); Nei colli e nei monti di tutta la provincia fino al Corno alle Scale (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Pineta di Cervia, Castelraniero (Zangheri 1966b) – **Forlì-Cesena**: In prossimità di Poggio Scali (Pichi & Bottini 1888); Comero, Colli di Cesena (Del Testa 1903); Campigna a La Mandria (Sanesi 1962); Scardavilla (Zodda 1921; Zangheri 1966b); San Savino (Zangheri 1966b) presso Casa Trove (Zodda 1921); Predappio (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Polenta, Civitella di Romagna, Piancancelli, Campigna, Poggio Martino, Burraia di Campigna, Passo dei Mandrioli, Monte Castelvecchio, Monte Fumaiolo, Balze località Scalette (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: In alto sopra i monti alla base degli alberi (Bertoloni 1865); Sul macigno (Fitzgerald & Bottini 1881); Nei boschi, specialmente castagneti, dai colli sino all'Appennino (Fiori 1886); Sul terreno ed alla base degli alberi, nei colli e nei monti (Farneti 1889); Boschi di faggio (Avetta 1897); Nei castagneti del colle e del monte (Casali 1899b); In un bosco di castagni (Zodda 1921); Terreno, legni fradici, cortecce, terreno castagneti, abetine, terreno di querceto, rocce calcaree (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto, in un vacciniato e in una prateria discontinua di crinale, tronco di faggio marcescente in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881); 1550 m (Bottini 1913); 1650 m, 1660 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1284 m, 1460 m, 1590 m, 1600 m, 1720 m, 1750 m, 1780 m, 1800 m, 1820 m, 1870 m, 1910 m, 1920 m, 1960 m, 1970 m, 1980 m, 1990 m, 2050 m (Velluti 1993); Al colle e al monte (Fiori 1886; Farneti 1889; Casali 1899b)

***Dicranum tauricum*** Sapjegin

*SINONIMI*: *Dicranum strictum* Schleich. ex D. Mohr *hom. illeg.*; *Orthodicranum strictum* Broth.

**Reggio Emilia**: Le Forbici alle sorgenti del Dolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b) – **Bologna**: Vallata del Dardagna sopra Ca' de' Gabrielli (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena**: Poggio Martino (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO*: Provincia di Reggio Emilia, Serie II Fascicolo XXV 1222, Bottini 1882

*ECOLOGIA*: Sui ciocchi putridi di castagno (Farneti 1889); Legno fradicio (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881)

***Didymodon*** Hedw. (Pottiaceae)

***Didymodon acutus*** (Brid.) K. Saito

*SINONIMI*: *Barbula acuta* (Brid.) Brid.; *Barbula acuta* (Brid.) Brid. f. *rufescens* Podp.; *Barbula acuta* (Brid.) Brid. var. *rufescens* (Schimp. ex Limpr.) Casares-Gil.; *Barbula gracilis* Schwägr. *hom. illeg.*

**Parma**: Berceto, Vigheffio, lungo l'argine della Baganza (Avetta 1897) – **Modena**: Fiume Secchia a Marzaglia, Fiume Secchia a Sassuolo (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Bologna**: Gessi bolognesi (Cobau 1932); Croara/Miserazzano (Ferrari 1974); Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Pineta di Classe, Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Borgo Rivola e a Sasso (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Monte

dei Cappuccini (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Forlì, San Martino in Strada, Selbagnone, Scardavilla, Seguno, Cabelli, Balze località Scalette (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA**: Sabbie del fiume (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Sul calcare, sulle rocce gessifere, sui gessi (Zangheri 1959); Terra, rocce calcaree e gessifere (Zangheri 1966b); Lungo il fosso su terreno fangoso (Aleffi & Silenzi 2000); Al suolo (Fariselli 2015)

***Didymodon asperifolius*** (Mitt.) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson

**Reggio Emilia**: SIC Ca` del Vento, Ca` del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) ai contrafforti del Castello di Borzano (Aleffi 2016) – **Bologna**: SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014)

***Didymodon cordatus*** Jur.

**SINONIMI**: *Barbula cordata* (Jur.) Loeske

**Forlì-Cesena**: San Varano (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA**: Terra (Zangheri 1966b)

***Didymodon fallax*** (Hedw.) R.H. Zander

**SINONIMI**: *Barbula fallax* Hedw.; *Barbula fallax* Hedw. subsp. *adriatica* (Baumg.) Giac.

**Reggio Emilia**: Montebabbio, Dinazzano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Prado, Monte Ravino, Abetina Reale, Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena**: Fiumalbo (Fiori 1886); Lungo la Secchia a Sassuolo (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Bologna**: Rio Bolsenda (Fiori 1886); Gessi bolognesi a Siberia e a Miserazzano (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello, Pineta di Classe (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena**: Castrocaro località Cozzi, Bertinoro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Forlì, San Martino in Strada, Scardavilla, Bagnolo di Castrocaro, Meldola, Passo dei Mandrioli (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA**: Sul terreno e sui muri (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul terriccio calcareo, sul calcare, sullo sfaticcio gessoso, sui gessi (Zangheri 1959); Terra, muri, rocce calcaree e gessifere (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto, in una prateria discontinua di crinale e lungo le sponde di un torrente, argillite in un faggeto (Velluti 1993); Ex cava su roccia, su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

**ALTITUDINE**: 1500 m, 1550 m, 1800 m, 1850 m, 1950 m, 1980 m, 2000 m (Velluti 1993)

**NOTE**: La segnalazione di Fiori "Lungo la Secchia a Sassuolo" non è ben chiaro se sia da attribuirsi alla parte modenese o reggiana; Casali la cita per il Reggiano

***Didymodon ferrugineus*** (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill

**Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015)

**ECOLOGIA**: Al suolo (Fariselli 2015)

***Didymodon insulanus*** (De Not.) M.O. Hill

**Forlì-Cesena**: Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959)

***Didymodon luridus*** Hornsch.

**SINONIMI**: *Barbula lurida* (Hornsch.) Lindb. *hom. illeg.*

**Reggio Emilia**: SIC Ca` del Vento, Ca` del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Bologna**: Gessi bolognesi a Miserazzano, a Palestrina, a Siberia, al Buco della Gaibola, sulla via della Gaibola, al Buco del Budriolo e a Monte Castello (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi

e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) all'ex cava a Filo (Aleffi 2016); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11633-4, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Monte Mauro, a Ca' di Sasso, a Monte della Volpe e a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena**: Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Forlì, Seguno, Balze (Zangheri 1966b) – **Rimini**: SIC Onferno (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
*ECOLOGIA*: Sul calcare, sui gessi (Zangheri 1959); Terreno, rocce calcaree e gessose (Zangheri 1966b); Ex cava su roccia, al margine di una dolina su gesso, su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

***Didymodon rigidulus*** Hedw.

*SINONIMI*: *Barbula rigidula* (Hedw.) Mitt.

**Forlì-Cesena**: Casticciano (Zodda 1921); Monte Casale (Zangheri 1959; Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Su suolo calcareo (Zodda 1921); Sul calcare (Zangheri 1959); Suolo calcareo, fessure rocce (Zangheri 1966b)

***Didymodon sinuosus*** (Mitt.) Delogne

*SINONIMI*: *Barbula cylindrica* (Taylor) Schimp. var. *sinuosa* (Mitt.) Lindb.

**Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Campigna località La Lama (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Terreno (Zangheri 1966b)

*NOTE*: Zangheri indica come dubbia la determinazione

***Didymodon spadiceus*** (Mitt.) Limpr.

*SINONIMI*: *Barbula spadicea* (Mitt.) Braithw.

**Reggio Emilia**: Monte Prado (Velluti 1993) – **Forlì-Cesena**: Forlì (Zangheri 1966b) ai Romiti (Zodda 1921)

*ECOLOGIA*: Terreno (Zangheri 1966b); Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1950 m (Velluti 1993)

***Didymodon tophaceus*** (Brid.) Lisa

*SINONIMI*: *Barbula tophacea* (Brid.) Mitt.; *Trichostomum tophaceum* Brid.

**Parma**: Monte Prinzera, Salso, Parma (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Rio della Rocca (Fiori 1886); Albinea al Castello, Roncoesi (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena**: Lungo Vallurbana, Sant'Agnese, Colli di Sassuolo (Fiori 1886) – **Bologna**: Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) a Gaibola e Spipola (Aleffi 2016); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Colli di Cesena a Santa Lucia (Del Testa 1903); Rio Samoggia alle falde del Monte della Pietra a Bagnolo (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); Predappio (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Colmano, Polenta, San Ruffillo di Dovadola, Sant'Antonio in Gualdo, Portico di Romagna, San Benedetto in Alpe, Balze località Scalette (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Su terreno argilloso (Fiori 1886); Sulle rupi, stillicidi (Avetta 1897); Sui sassi nei luoghi umidi e presso le fonti (Casali 1899a); Sui muri e le rupi bagnate lungo i torrenti e presso le fonti (Fiori 1886; Casali 1889b); Nei manufatti dei fossati (Casali 1899a; Casali 1899b); Sulle marne mioceniche bagnate da uno stillicidio (Del Testa 1903); Stillicidi sul conglomerato calcareo (Zangheri 1959); Terreno e rocce calcaree, stillicidi (Zangheri 1966b); Lungo un fosso su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

***Didymodon vinealis*** (Brid.) R.H. Zander

*SINONIMI*: *Barbula vinealis* Brid.; *Tortula vinealis* (Brid.) Spruce

**Reggio Emilia**: Monte Ravino (Velluti 1993); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Bologna**: Gessi bolognesi al Buco del Budriolo e a Miserazzano (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) all'ex

cava a Filo (Aleffi 2016); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11633-4, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Marina Romea (Brullo et al. 1991); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Ca' di Sasso e a Borgo Rivola (inedito); Pineta di Milano Marttima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** Colle Garampo presso Cesena (Del Testa 1903); Bertinoro (Zodda 1921); Selbagnone, Dovia, Monte dei Cappuccini, Querciolano (Zangheri 1966b) – **Rimini:** SIC Onferno (Aleffi et al. 2014) alla base del Castello (Aleffi 2016) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
**ECOLOGIA:** Sulle pendici erbose (Del Testa 1903); Terra calcarea, rocce calcaree, cortecce, mattoni (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto (Velluti 1993); Su terreno, su gesso (Aleffi & Silenzi 2000); Su *Pinus pinaster* e al suolo (Fariselli 2015)  
**ALTITUDINE:** 1400 m, 1550 m (Velluti 1993)

***Diphyscium*** D. Mohr (Diphysciaceae)

***Diphyscium foliosum*** (L. ex Hedw.) D. Mohr

**SINONIMI:** *Diphyscium sessile* Lindb.

**Parma:** Sopra il Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Valle di Riarbero, Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena:** San Pellegrino (Fiori 1886) – **Bologna:** Santuario dell'Acero (Fiori 1886) – **Ravenna:** Castelraniero (Bertoloni 1859; Del Testa 1903) – **Forlì-Cesena:** Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
**ECOLOGIA:** Sulla terra umida nei boschi e nei pascoli (Casali 1899b); Terreno (Zangheri 1966b)  
**ALTITUDINE:** Specialmente nell'alto monte (Casali 1899b)

***Distichium*** Bruch & Schimp. (Ditrichaceae)

***Distichium capillaceum*** (Hedw.) Bruch & Schimp.

**SINONIMI:** *Cynodontium capillaceum* Hedw.; *Didymodon capillaceus* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr

**Parma:** Roccamurata (Razzara 1981) – **Reggio Emilia:** Montevecchio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** Lago Scaffajolo (Pollini 1824); Cimone, Lago Santo (Fiori 1886) – **Bologna:** Corno alle Scale (Bertoloni 1844; Cocconi 1881; Fiori 1886); Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) – **Forlì-Cesena:** Monte Gemelli (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
**ECOLOGIA:** Fessure delle rupi e pascoli (Fiori 1886; Casali 1899b); Arenarie (Zangheri 1966b); Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993); Su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)  
**ALTITUDINE:** 2050 m (Velluti 1993); Alto Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Distichium inclinatum*** (Hedw.) Bruch & Schimp.

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Velluti 1993); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016)

**ECOLOGIA:** Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1950 m (Velluti 1993)

***Ditrichum*** Hampe (Ditrichaceae)

***Ditrichum flexicaule*** (Schwaegr.) Hampe

**SINONIMI:** *Leptotrichum flexicaule* (Schwägr.) Hampe

**Reggio Emilia:** Montebabbio, Monte Vallestro, Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Alpe di Mommio, Monte Casarola, Canossa (Casali 1899b); Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** Sopra il Lago Santo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Colli di Montegibbio, Montefiorino, Lago Santo (Fiori 1886) – **Bologna:** Santuario dell'Acero (Fiori 1886) – **Forlì-Cesena:** Balze, Monte Fumaiolo, Monte Falco (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
**ECOLOGIA:** Sulla terra nei boschi e nelle fessure delle rupi (Fiori 1886; Casali 1899b); Rocce calcaree,

terreno, ceppi di *Fagus sylvatica* (Zangheri 1966b); Suolo in una prateria discontinua su detriti marnosi (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1850 m (Velluti 1993); Tanto in collina che nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Ditrichum heteromallum*** (Hedw.) E. Britton

**SINONIMI:** *Ditrichum homomallum* (Hedw.) Hampe; *Leptotrichum homomallum* (Hedw.) Hampe

**Reggio Emilia:** Praderena sopra Ospitaletto di Ligonchio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Le Forbici (Bottini 1913) – **Modena:** San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Bologna:** Gessi bolognesi sulla via della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000)

**ECOLOGIA:** Su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1550 m (Bottini 1913)

***Ditrichum pallidum*** (Hedw.) Hampe

**SINONIMI:** *Leptotrichum pallidum* (Hedw.) Hampe

**Parma:** Noceto, Sala Baganza (Avetta 1897) – **Emilia:** Subappennino emiliano orientale (Bologna-Modena) (Giacomini 1950) – **Forlì-Cesena:** Scardavilla (Zangheri 1966b)

**ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO:** Provincia di Parma, Serie I Fascicolo XXI 19 (1019), Passerini 1863

**ECOLOGIA:** Terreno di querceto (Zangheri 1966b)

***Ditrichum pusillum*** (Hedw.) Hampe

**SINONIMI:** *Ditrichum tortile* (Schrad.) Brockm.

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Bottini 1913) – **Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)

**ECOLOGIA:** Sulla terra fra i faggi (Bottini 1913)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Bottini 1913)

***Ditrichum subulatum*** Hampe

**Reggio Emilia:** Monte Prado, Abetina Reale (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Suolo in un vaccinieto e in una praterie discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1820 m, 1950 m (Velluti 1993)

***Ditrichum zonatum*** (Brid.) Kindb.

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1980 m (Velluti 1993)

### ***Drepanocladus*** (Müll. Hal.) G. Roth (Amblystegiaceae)

***Drepanocladus aduncus*** (Hedw.) Warnst.

**SINONIMI:** *Amblystegium kneiffii* Schimp.; *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst. var. *kneiffii* (Schimp.) Mönk.; *Drepanocladus kneiffii* (Schimp.) Warnst.; *Hypnum aduncum* Hedw. var. *kneiffii* (Schimp.) Schimp.; *Hypnum kneiffii* (Schimp.) Wilson

**Parma:** Monte Molinatico (Avetta 1897); Lago Ballano (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1938); Passo della Cisa (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Villa Seta, Roncocesi, San Prospero degli Strinati (Casali 1899a; Casali 1899b); Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** Fra il Rondinajo e il Lago Baccio, Lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Fontanazzi di San Faustino, Fontanazzi di Sant'Agnesse presso Modena, San Cataldo presso Modena, Risaie di Nonantola, Campo di Lolio, Paduli di Pavullo (Fiori 1886) – **Ravenna:** Ravenna (Del Testa 1903) – **Forlì-Cesena:** Forlì (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Ladino (Zangheri 1966b)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO*: Provincia di Ravenna, Serie I Fascicolo XXV 204 (1204), Caldesi 1864

*ECOLOGIA*: Prati torbosi (Avetta 1897); Nei fossati e nei luoghi umidi, nei paduli (Casali 1899a); Nei fossi e nei luoghi acquitrinosi (Fiori 1886; Casali 1899b); Nei fossi (Del Testa 1903); Nelle pozze di acqua (Zodda 1921); Acquittrini, terra (Zangheri 1966b); Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1800 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1107 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 2000 m (Velluti 1993); Dal piano fino all'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*NOTE*: Non è da escludere che la segnalazione di Del Testa (Ravenna fuori porta Garibaldi) e quella dell'Erbario Crittogamico Italiano coincidano: entrambi i campioni sono stati raccolti da Caldesi

*Encalypta* Hedw. (Encalyptaceae)

*Encalypta alpina* Sm.

*SINONIMI*: *Encalypta commutata* Nees & Hornsch.

**Reggio Emilia**: Montevercchio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: Cimone (Fiori 1886) – **Bologna**: Corno alle Scale (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Nei pascoli e nelle fessure dei sassi (Fiori 1886; Casali 1899b)

*ALTITUDINE*: Nella regione nuda dell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Encalypta ciliata* Hedw.

**Reggio Emilia**: Cerreto dell'Alpi (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b) – **Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881); Da Fiumalbo salendo il Cimone (Fiori 1886) – **Bologna**: Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Bologna al monte della Guardia, Vallata del Dardagna alla Chiesina, al Monte Grande e a Rio Piano (Farneti 1889) – **Ravenna**: Castelraniero (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sul terreno e nelle fessure delle rupi e dei muri (Fiori 1886; Casali 1899b); Fra le rupi di macigno (Farneti 1889); Terreno di boschi (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Encalypta rhaptocarpa* Schwägr. var. *rhaptocarpa*

*SINONIMI*: *Encalypta rhabdocarpa* Schwägr. *nom. inval. err. orthogr.*

**Modena**: San Pellegrino (Fiori 1886) – **Bologna**: Gessi bolognesi al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014)

*ECOLOGIA*: Sui sassi nei pascoli (Fiori 1886); Su gesso nel fondo della dolina (Aleffi & Silenzi 2000)

*Encalypta streptocarpa* Hedw.

*SINONIMI*: *Encalypta contorta* Hoppe ex Lindb. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Reggio Emilia**: Scandiano, Borzano, Pietra di Bismantova (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Vezzano (Casali 1899b); Monte Prado, Abetina Reale (Velluti 1993); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) alla Tana della Mussina (Aleffi 2016) – **Modena**: Vallurbana, Monte Cantiere di Barigazzo (Fiori 1886) – **Bologna**: Bologna a Gaibola (Farneti 1889); Gessi bolognesi a Siberia, al Buco dei Buoi, al Buco dei Vinchi, sulla via della Gaibola, al Buco della Gaibola, al Buco del Budriolo, alla Grotta della Spipola e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-3, 11633-4, 11733-1 Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Monte Mauro (Aleffi 2016) –

**Forlì-Cesena**: Roversano, Colli di Cesena (Del Testa 1903); Bertinoro (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Monte Fumaiolo (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sui gessi (Fiori 1886; Farneti 1889); Nelle fessure delle rupi o dei sassi, più raramente sul terreno (Fiori 1886; Casali 1899b); Calcare e terreno calcareo (Zangheri 1966b); Suolo in una prateria

discontinua di crinale e argillite in un vacciniato (Velluti 1993); Su gesso, su roccia e su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1500 m, 1980 m (Velluti 1993)

***Encalypta vulgaris*** Hedw.

*SINONIMI*: *Encalypta vulgaris* Hedw. var. *obtusifolia* (Funck) Husn.

**Parma**: Monte Prinzerà (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Colli di Scandiano, Colli di Borzano, Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Cavazzone, Monte del Gesso a Vezzano (Casali 1899b) – **Modena**: Montegibbio, San Michele al Pescaro, Dintorni di Fiumalbo, Montese (Fiori 1886); Vallata del Dardagna alla Riva (Farneti 1889) – **Bologna**: Vallata del Dardagna alla Chiesina e alla Riva (Farneti 1889); Gessi bolognesi (Cobau 1932); Croara/Miserazzano (Ferrari 1974); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena**: Bertinoro al Monte dei Cappuccini (Del Testa 1903; Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Monte Casale, Bertinoro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Balze (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sulle rupi, al piede di un castagno (Farneti 1889); Sulle rupi ed il terreno (Fiori 1886; Casali 1899b); Sui gessi (Casali 1899b); Sulle rupi calcaree (plioceniche) (Del Testa 1903); Terreno, su calcare, gessi, cortecce, rocce gessifere (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: In collina e in montagna (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Entodon*** Müll. Hal. (Entodontaceae)

***Entodon cladorrhizans*** (Hedw.) Müll. Hal.

*SINONIMI*: *Cylindrothecium cladorrhizans* (Hedw.) Schimp.

**Modena**: Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sopra *Populus alba* (Fiori 1886)

***Entodon concinnus*** (De Not.) Paris

*SINONIMI*: *Cylindrothecium concinnum* (De Not.) Schimp.

**Parma**: Monte Orsajo, Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b) – **Modena**: Lungo la Cerca a Casinalbo, Torre della Maina a Gorzano (Fiori 1886)

*ALTITUDINE*: 1400 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Entosthodon*** Schwägr. (Funariaceae)

***Entosthodon fascicularis*** (Hedw.) Müll. Hal.

**Forlì-Cesena**: Vecchiazano (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Terra (Zangheri 1966b)

***Entosthodon mühlenbergii*** (Turner) Fife

*SINONIMI*: *Funaria calcarea* Wahlenb.; *Funaria dentata* Crome var. *hibernica* (Hook.) Loeske; *Funaria mühlenbergii* Turner

**Parma**: Vaestano (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Castello di Borzano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Cavazzone, Vezzano (Casali 1899b) – **Modena**: Montegibbio, Varana, Montese (Fiori 1886) – **Bologna**: Crovara presso Bologna (Fiori 1886) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1966b) – **Forlì-Cesena**: Cappuccinini (Forlì) (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950)

*DATI D'ERBARIO*: **Modena**: Montegibbio, Mori 1886 [S] (Crundwell & Nyholm 1974)

*ECOLOGIA*: Sui gessi, sui muri (Fiori 1886); Sui muri e le rupi, sui gessi (Casali 1899b); Terreno, gessi (Zangheri 1966b)

***Entostodon obtusus*** (Hedw.) Lindb.

**SINONIMI** *Entosthodon ericetorum* (De Not.) Müll. Hal.

**Parma:** Collecchio, Noceto (Avetta 1897) – **Emilia:** Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950)

**ECOLOGIA:** Nei boschi sulla terra argillosa (Avetta 1897)

***Eucladium*** Bruch & Schimp. (Pottiaceae)

***Eucladium verticillatum*** (With.) Bruch & Schimp.

**Parma:** Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Fragno, Golotta-Varsi (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Acquabona, Cerè Marabino (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena:** Tra Montefiorino e Casola (Fiori 1886) – **Bologna:** Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola, al Buco del Budriolo e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) a Acquafredda (Aleffi 2016); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano alla Grotta M. Gortani (Aleffi 2016); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Monte della Volpe (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Rivola (Zangheri 1959) alla Tana del Re Tiberio (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) al Monte della Volpe e a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena:** Roversano, Cesena (Del Testa 1903); Castrocaro (Zangheri 1959) località Cozzi (Zangheri 1966b); Meldola, Ladino, Sant'Antonio in Gualdo, Civitella di Romagna, Collina di Civitella, Voltre, San Benedetto località Caduta (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sopra una rupe bagnata da uno stillicidio, nei castagneti (Fiori 1886); In una cascata, in un rio sulle rupi (Avetta 1897); Presso una fonte (Casali 1899a; Casali 1899b); Sulle rupi bagnate da uno stillicidio, sui muri interni dei poggi (Del Testa 1903); Sui gessi, sulle rocce gessose umide (Zangheri 1959); Vecchi muri, terreno calcareo, gessi, ruscelli, stillicidi, roccia gessoso-calcareo (Zangheri 1966b); Su roccia, su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

***Eurhynchiastrum*** Ignatov & Huttunen (Brachytheciaceae)

***Eurhynchiastrum pulchellum*** (Hedw.) Ignatov & Huttunen var. ***pulchellum***

**SINONIMI:** *Eurhynchium pulchellum* (Hedw.) Jenn.; *Eurhynchium strigosum* (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Bologna:** Gessi bolognesi al Buco dei Buoi, al Buco del Budriolo, a Acquafredda, alla Grotta della Spipola, a Siberia e al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Castrocaro località Cozzi, Bertinoro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009)

**ECOLOGIA:** Sullo sfaticcio calcareo (Zangheri 1959); Terreno, roccia calcarea (Zangheri 1966b); Su terreno, su roccia, su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

***Eurhynchium*** Bruch & Schimp. (Brachytheciaceae)

***Eurhynchium striatum*** (Hedw.) Schimp.

**SINONIMI:** *Rhynchostegium striatum* (Hedw.) De Not.

**Parma:** Collecchio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Colli di Dinazzano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014); SIC Ca` del Vento, Ca` del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) – **Modena:** Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena (Fiori 1886) – **Bologna:** Meloncello (Bertoloni 1859; Cocconi 1881); Buca della Spipola (Fiori 1886) – **Ravenna:** Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** Roversano (Del Testa 1903); Predappio (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Polenta, San Savino, Civitella di Romagna, Collina di Civitella, Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Nei boschi (Avetta 1897); Sul terreno e al piede degli alberi (Del Testa 1903); Terreno, ceppi (Zangheri 1966b); Al suolo e su *Pinus pinaster* (Fariselli 2015)



*Exsertotheca* S. Olsson, Enroth & D. Quandt (Neckeraceae)

*Exsertotheca crispa* (Hedw.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt

*SINONIMI*: *Neckera crispa* Hedw.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Tabiano, Varano dei Marchesi (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Alpe di Camporaghena (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Valle di Riarbero (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Regnano (Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Modena**: Montese (Cocconi 1881); Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Montegibbio, Rocca Santa Maria (Fiori 1886) – **Bologna**: Bologna ai gessi di Montecastello (Bertoloni 1859); Rio Maggiore (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Miserazzano (Cocconi 1881); Provincia di Bologna (Farneti 1889); Gessi bolognesi (Cobau 1932) a Miserazzano, alla Grotta della Spipola, al Buco dei Vinchi e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) a Acquafredda (Aleffi 2016); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-4, 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Comero, Colli sopra Roversano (Del Testa 1903); Poggio Appennino presso Civitella (Zodda 1921); San Savino (Zangheri 1966b) presso Casa Trove (Zodda 1921); Ricò, Monte Castelvecchio, Campigna località La Lama (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Su gesso (Bertoloni 1859); Predilige il bosco di faggio il più folto (Bertoloni 1865); Nei boschi, appiè degli alberi, sulle rocce e sulle pietre umide (Bracciforti 1877); Alveo e boschi lungo un rio (Cocconi 1881); Appiè degli alberi (Avetta 1897); Al piede degl'alberi nei boschi, dai colli fino all'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b); Sui faggi, sulle querci (Del Testa 1903); In un bosco di castagno (Zodda 1921); Ceppi, cortecce (Zangheri 1966b); Sulla parete dell'inghiottitoio, su gesso, su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: Dal colle all'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Fabronia* Raddi (Fabroniaceae)

*Fabronia pusilla* Raddi

**Romagna**: Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950)

*Fissidens* Hedw. (Fissidentaceae)

*Fissidens adiantboides* Hedw.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980); Colla Val di Tacca (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia**: Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Valle dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Montemiscoso (Casali 1899b) – **Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Bologna**: Bologna a Gaibola (Farneti 1889); Buca della Spipola presso Bologna (Fiori 1892b); Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) – **Ravenna**: Pineta di Classe (Zangheri 1966b) – **Forlì-Cesena**: Castrocaro località Cozzi (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Sulle sabbie gialle (Farneti 1889); Sul calcare (Zangheri 1959); Terreno, roccia calcarea (Zangheri 1966b); Su gesso, su terreno e su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); 1370 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

*Fissidens bryoides* Hedw. var. *bryoides*

**Bologna**: Bologna al Ravone (Farneti 1889)

*ECOLOGIA*: Sulle sabbie gialle (Farneti 1889)

***Fissidens crassipes*** Wilson ex Bruch & Schimp. subsp. ***crassipes***

**Modena:** Dintorni di Modena, Colli Modenesi (Venturi 1886); Mulino di Casinalbo (Fiori 1886); Modena (Fiori 1892b) – **Bologna:** Gessi bolognesi a Siberia (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014)

**ECOLOGIA:** Sulle travi presso le ruote di un mulino (Fiori 1886); Sui mattoni bagnati di una fontana (Fiori 1892b); Su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

***Fissidens dubius*** P. Beauv.

SINONIMI *Fissidens cristatus* Wilson ex Mitt.; *Fissidens decipiens* De Not.

**Reggio Emilia:** La Veggia presso Sassuolo, Colli tra Scandiano e Borzano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Albinea, Vezzano, Montecavolo (Casali 1899b) – **Modena:** Montegibbio, Monteciccio (Fiori 1886) – **Bologna:** Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola, al Buco dei Vinchi, al Buco del Budriolo, a Acquafredda, al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) nella Valle dell'Acquafredda (Aleffi 2016); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano alla Grotta M. Gortani (Aleffi 2016); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-3, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ferrara:** Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Ravenna:** Rivola, Rontana (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Pineta di Classe (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Monte Mauro (Aleffi 2016) a Ca' di Sasso, a Borgo Rivola e a Rontana (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** Colli di Cesena, Roversano, lungo il Rubicone (Pisciarello) (Del Testa 1903); San Savino (Predappio) (Zangheri 1966b) presso Casa Trove (Zodda 1921); Castrocaro località Cozzi, Monte Casale, Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Scardavilla, Bertinoro, San Savino (Predappio), Civitella di Romagna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Nei boschetti (Fiori 1886); Sul terreno scoperto nei luoghi ombrosi di collina (Casali 1899b); Luoghi freschi e ombreggiati (Del Testa 1903); In un bosco di querce (Zodda 1921); Sui gessi (Zangheri 1959); Terreno, sfaticci e rocce calcaree e gessose, cortecce (Zangheri 1966b); Su gesso, su terreno, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000); Al suolo (Fariselli 2015)

**ALTITUDINE:** In collina (Fiori 1886)

***Fissidens exilis*** Hedw.

**Bologna:** Gessi bolognesi al Buco dei Vinchi (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014) alla Grotta M. Gortani (Aleffi 2016)

**ECOLOGIA:** Su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

***Fissidens gracilifolius*** Brugg.-Nann. & Nyholm

**Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017)

***Fissidens osmundoides*** Hedw.

**Bologna:** Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano alla Grotta M. Gortani (Aleffi 2016) – **Forlì-Cesena:** Ladino (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Terreno di querceto (Zangheri 1966b); Su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

***Fissidens pusillus*** (Wilson) Milde

**Parma:** Collecchio (Avetta 1897)

**ECOLOGIA:** Nei boschi presso una fontana, su un sasso marcio (Avetta 1897)

***Fissidens serrulatus*** Brid.

**Reggio Emilia:** SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Bologna:** Gessi bolognesi al Buco dei Vinchi e al Buco dei Quercioli (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al.

2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014) alla Grotta M. Gortani (Aleffi 2016) – **Ravenna**: SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Monte Mauro, a Monte della Volpe e a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena**: Sasso Fratino (Bonini 2009)  
*ECOLOGIA*: Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

***Fissidens taxifolius*** Hedw. subsp. ***taxifolius***

**Parma**: Collecchio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Vetto, Villa San Pellegrino lungo il Crostolo, Roncocesi (Casali 1899a; Casali 1899b); Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena**: Casinalbo, Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena, Bosco di Campogalliano lungo la Secchia, Montegibbio (Fiori 1886) – **Bologna**: Gessi bolognesi lungo via della Gaibola, al Buco della Gaibola e al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3, 11633-4, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: San Martino in Strada, Vecchiazzano, San Savino (Predappio), Colmano (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO*: Provincia di Parma, Serie I Fascicolo XXIX 407 (1407), Passerini 1860

*ECOLOGIA*: Sulla terra lungo le rive e nei boschetti (Fiori 1886); Sulla terra nei boschi (Avetta 1897); Sul terreno nei luoghi ombreggiati e lungo le rive al piano (Casali 1899a; Casali 1899b); Terreno, ceppi (Zangheri 1966b); Suolo lungo un sentiero di un faggeto (Velluti 1993); Su terreno, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1470 m (Velluti 1993); In pianura e in montagna (Fiori 1886); Al colle e al monte (Casali 1899a; Casali 1899b)

***Fissidens viridulus*** (Sw. ex anon.) Wahlenb. var. ***viridulus***

*SINONIMI*: *Fissidens bambergeri* Schimp. ex Milde

**Reggio Emilia**: Lungo la via da Scandiano a Borzano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Emilia**: Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950)

***Fissidens viridulus*** (Sw. ex anon.) var. ***incurvus*** (Starke ex Röhl.) Waldh.

*SINONIMI*: *Fissidens incurvus* Starke ex Röhl.

**Parma**: Monte Ferloso (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: La Veggia presso Sassuolo (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: Rocca di Spezzano, Orto Botanico di Modena (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sulla terra nei boschetti (Fiori 1886); Nei boschi d'abeti sulla terra (Avetta 1897)

*NOTE*: La localizzazione del toponimo Monte Ferloso non è chiara

***Fontinalis*** Hedw. (Fontinalaceae)

***Fontinalis antipyretica*** Hedw. subsp. ***antipyretica***

*SINONIMI*: *Fontinalis antipyretica* Hedw. f. *alpestris* Milde; *Fontinalis antipyretica* Hedw. var. *montana* H. Müll.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Padule di Badignana, Lago Ballano, Lago dell'Olmo di Monte Molinatico (Provasi 1938) – **Reggio Emilia**: Castello di Albinea, Roncocesi, San Prospero degli Strinati (Casali 1899a; Casali 1899b); Lago Cerretano (Provasi 1938) – **Modena**: Jola di Montese (Bertoloni 1859 citato in Farneti 1889; Cocconi 1881); Fontanazzi di San Faustino presso Modena, Padule di Pavullo, Guiglia (Fiori 1886); Sotto il Lago Santo nel Rio delle Tagliole (Bottini 1913); Lago di Pratignano (Cocconi 1881; Provasi 1926); Lago Baccio (Provasi 1926; Raffaelli et al. 1997) – **Bologna**: Gaibola (Cocconi 1881); Monte Paderno, Vallata del Dardagna (Farneti 1889) – **Ravenna**: Punte Alberete (Merloni & Piccoli 2001); Punte Alberete-Valle Mandriole (Lazzari et al. 2007) – **Forlì-Cesena**: Laghetto sulla strada da Verghereto al passo del Monte Fumaiolo un km oltre Ripa della Moia (Raffaelli 1971)

*ECOLOGIA*: Nelle acque delle fontane e dei ruscelli, attaccata ai sassi che ne ricoprono il fondo (Bracciforti 1877); In una fonte (Fiori 1886); Nei pozzi, nelle acque correnti (Farneti 1889); Nei fossati e nei luoghi acquitrinosi al piano al colle e al monte (Casali 1899a); Nei fossi, fontane e paludi, dal piano alle alte

montagne (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul macigno (Bottini 1913)

*ALTITUDINE*: 1420 m (Bottini 1913); Dal piano alle alte montagne (Fiori 1886); Dal colle all'alto monte (Casali 1899a; Casali 1899b)

*Fontinalis antipyretica* Hedw. subsp. *gracilis* (Lindb.) Schimp.

**Parma**: Lago Ballano (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Modena**: Pian Cavallaro sul Cimone (Fiori 1886); Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1926); Vallata del Dardagna al Lago Pratignana (Farneti 1889; Provasi 1926)

*ALTITUDINE*: 1620 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*Fontinalis hypnoides* C. Hartm. var. *duriaei* (Schimp.) Kindb.

*SINONIMI*: *Fontinalis duriaei* Schimp.

**Modena**: Guiglia (Venturi 1899) – **Emilia**: Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950) – **Romagna**: Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950)

*ECOLOGIA*: In una fontana (Venturi 1899)

*Fontinalis squamosa* Hedw.

**Reggio Emilia**: Molino di Casalgrande (Fiori 1892b citato in Casali 1899b)

*ECOLOGIA*: Presso le ruote dei mulini e le cascate d'acqua (Fiori 1892b; Casali 1899b)

#### *Funaria* Hedw. (Funariaceae)

*Funaria hygrometrica* Hedw.

*SINONIMI*: *Mnium hygrometricum* (Hedw.) With.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Provincia di Parma (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Monte Ventasso alla selva del Pizzetto (Re 1798 citato in Casali 1899b); Pietra di Bismantova (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Dintorni di Reggio, Albinea, Quattro Castella (Casali 1899b); Lago Cerretano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b; Provasi 1938); SIC Ca` del Vento, Ca` del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) – **Modena**: Orto Botanico di Modena, San Cesario, Colli di Sassuolo (Fiori 1886) – **Bologna**: Provincia di Bologna (Farneti 1889) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Pineta di San Vitale, Pineta di Cervia (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Cesena (Del Testa 1903); Forlì, Pianta, Scardavilla, Pian delle Fontanelle, Campigna, Passo della Calla (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Cresce ovunque sopra la terra, nonché lungo le strade nelle fessure dei muri, nei luoghi di pastura, nei margini delle fontane chiare, nei luoghi umidi, ove si fanno depositi di carbone ecc. (Bracciforti 1877); Sui muri, nel terreno (Avetta 1897); Lungo le vie, sui muri o presso le carbonaie nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sui muri (Del Testa 1903); Sulla roccia gessifera (Zangheri 1959); Terreno, carbonaie, gessi (Zangheri 1966b); Al suolo (Fariselli 2015)

*ALTITUDINE*: Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Funaria microstoma* Bruch ex Schimp.

**Ravenna**: Faenza (Del Testa 1903)

*ECOLOGIA*: Sui ruderi del vecchio ponte (Del Testa 1903)

#### *Grimmia* Hedw. (Grimmiaceae)

*Grimmia alpestris* (F. Weber & D. Mohr) Schleich.

**Modena**: Cimone (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sui massi scoperti di macigno nel versante mezzogiorno dei pascoli (Fiori 1886)

***Grimmia decipiens*** (Schultz.) Lindb.

*SINONIMI*: *Grimmia schultzei* (Brid.) Huebener *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Parma**: Sopra il Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Vertice del Giovarello (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Bologna**: Corno alle Scale (Fiori 1886); Valle del Dardagna a Chiesina (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena**: Ladino (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Monte Casale (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sul macigno (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Farneti 1889); Terreno, rocce calcaree, ceppi di *Fagus sylvatica* (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Grimmia doniana*** Sm.

**Reggio Emilia**: Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b) –

**Modena**: Lago Santo (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sul macigno (Fiori 1886)

***Grimmia funalis*** (Schwägr.) Bruch & Schimp.

**Parma**: Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Vertice del Giovarello (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Modena**: Vertice del Libro Aperto (Fitzgerald & Bottini 1881; Fiori 1886); Sopra il Lago Santo, Rondinajo (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sul macigno delle cime Appenniniche (Fiori 1886)

*ALTITUDINE*: 1931 m (Fitzgerald & Bottini 1881); 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Grimmia hartmanii*** Schimp.

**Reggio Emilia**: Le Forbici alle sorgenti del Dolo (Fitzgerald & Bottini 1881); Civago, Montevicchio alle sorgenti dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Lago del Barone (Cerretano) (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1938); Monte Ravino, Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena**: San Pellegrino, Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sui sassi e le rupi (Fiori 1886); Suolo, arenaria e microconglomerato in un faggeto, arenaria in un vaccinieto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1300 m (Fitzgerald & Bottini 1881); 1250 m, 1390 m, 1400 m, 1460 m, 1470 m, 2020 m (Velluti 1993); Nei boschi e nella regione nuda dell'Appennino (Fiori 1886); Parte scoperta dell'Appennino (Casali 1899b)

***Grimmia incurva*** Schwägr.

**Reggio Emilia**: Pian Vallese, Monte Prado (Velluti 1993)

*ECOLOGIA*: Arenaria in un faggeto e in un vaccinieto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1284 m, 1750 m (Velluti 1993)

***Grimmia laevigata*** (Brid.) Brid.

*SINONIMI*: *Grimmia leucophaea* Grev.

**Reggio Emilia**: Vertice delle Alpi di Sillano (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b) – **Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*ALTITUDINE*: 1850 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Grimmia longirostris*** Hook.

*SINONIMI*: *Grimmia affinis* Hornsch.

**Reggio Emilia**: Monte Cusna, Monte Prado (Velluti 1993)

*ECOLOGIA*: Arenaria in un vaccinieto e suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 2020 m (Velluti 1993)

***Grimmia orbicularis*** Bruch *ex* Wilson

**Forli-Cesena:** Vecchiazzano (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Arenarie (Zangheri 1966b)

**NOTE:** Zangheri segnala che la determinazione del campione è dubbia

***Grimmia ovalis*** (Hedw.) Lindb.

**SINONIMI:** *Grimmia commutata* Huebener *nom. illeg. incl. spec. prior.*; *Grimmia ovata* F. Weber & D. Mohr

**Parma:** Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Vertice del Giovarello (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b) – **Modena:** Vertice del Libro Aperto, Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Varana (Fiori 1886) – **Bologna:** Corno alle Scale (Fiori 1892b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sul macigno (Fiori 1892b)

**ALTITUDINE:** 1931 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1800 m (Fiori 1892b)

***Grimmia pulvinata*** (Hedw.) Sm.

**SINONIMI:** *Grimmia pulvinata* (Hedw.) Sm. var. *obtusa* (Brid.) Huebener

**Parma:** Berceto, Orto Botanico di Parma (Avetta 1897); Ottagono della Villetta (Bouvet 2008) – **Reggio Emilia:** Scandiano (Casali 1899a); Castello di Albinea, Reggio e dintorni, Bagnolo in Piano (Casali 1899a; Casali 1899b); Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** Orto Botanico di Modena, Sant'Agnesa presso Modena, Colli di Sassuolo, Montefiorino, Lama Mecogno (Fiori 1886) – **Bologna:** Bologna (Bertoloni 1859); Vallata del Setta a Monte Mariano (Cocconi 1881); Dintorni di Bologna (Fiori 1886); Provincia di Bologna (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Forli-Cesena:** Bertinoro (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); Castrocaro località Cozzi, Caminate, Monte dei Cappuccini, Bagnolo di Castrocaro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Colmano, San Benedetto in Alpe, Selvapiana, Monte Comero, Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sui muri (Bertoloni 1859); Sui muri e le rocce (Farneti 1889); Sui sassi (Avetta 1897); Sui sassi al piano e al monte (Casali 1899a); Sui muri ed i sassi tanto in pianura, che in montagna (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul terriccio calcareo, sul calcare, sulle pietre (Zangheri 1959); Rocce calcaree, fessure muri, tegole, terreno, roccia calcarea (Zangheri 1966b); Suolo su detriti (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 2000 m (Velluti 1993); In pianura e in montagna (Fiori 1886; Casali 1899a; Casali 1899b)

***Grimmia ramondii*** (Lam. & DC.) Margad.

**SINONIMI:** *Dryptodon patens* (Hedw.) Brid.; *Racomitrium patens* Schimp.

**Parma:** Monte Orsajo, Lago Merdarolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Vertice del Giovarello (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Montevecchio alle sorgenti dell'Ozola, Santa Maria sul Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Cerreto dell'Alpi (Fiori 1886; Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Lago del Barone (Cerretano) (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b; Provasi 1938); Monte Cusna, Monte Prado (Velluti 1993) – **Modena:** Libro Aperto (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881; Fiori 1886); Lago Santo (Fiori 1886)

**ECOLOGIA:** Sui sassi e sulle rupi (Casali 1899b); Arenaria in un vaccinieto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 2020 m (Velluti 1993); Nei boschi e nella parte scoperta dell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Grimmia tergestina*** Tamm. *ex* Bruch & Schimp.

**Modena:** Rocca Santa Maria (Fiori 1892b) – **Emilia:** Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950)

**DATI D'ERBARIO:** **Modena:** Rocca Santa Maria, Fiori 1887 [H-POELT] (Nowak & Poelt 1979)

**ECOLOGIA:** Sopra una rupe calcarea esposta a mezzogiorno (Fiori 1892b)

**NOTE:** Si riconduce a questa specie la segnalazione di Fiori (1886) di *G. crinita*

***Gymnostomum*** Nees & Hornsch. (Pottiaceae)

***Gymnostomum aeruginosum*** Sm. var. *aeruginosum*

*SINONIMI*: *Gymnostomum rupestre* Scheich. ex Schwägr.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881; Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Le Forbici (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b) – **Modena**: Lago Santo (Fiori 1892b)

*ECOLOGIA*: Sul macigno (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Rupi (Fiori 1892b)

***Gymnostomum calcareum*** Nees & Hornsch.

**Reggio Emilia**: SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Bologna**: Gessi bolognesi a Acquafredda, al Buco della Gaibola e al Buco dei Buoi (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) a Gaibola e Spipola e alla Valle dell'Acquafredda (Aleffi 2016); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano alla Grotta M. Gortani (Aleffi 2016) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena**: Casticciano (Zodda 1921); Castrocaro località Cozzi, Monte Casale (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Sfaticcio calcareo, sui gessi (Zangheri 1959); Rocce e sfaticci calcarei (Zangheri 1966b); Su terreno, su roccia, su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 200 m (Zodda 1921)

***Gymnostomum viridulum*** Brid.

**Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-3 (Fariselli et al. 2017)

***Gyroweisia*** Schimp. (Pottiaceae)

***Gyroweisia tenuis*** (Schrad. ex Hedw.) Schimp.

*SINONIMI*: *Gymnostomum tenue* Schrad. ex Hedw.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Reggio Emilia**: Abetina Reale, Monte Prado (Velluti 1993) – **Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Monte Colombo (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Cresce in terra nei luoghi sabbiosi (Bracciforti 1877); Arenaria (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto, in un vaccinieto e in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1600 m, 1750 m, 1820 m, 1950 m (Velluti 1993)

***Hamatocaulis*** Hedenäs (Calliergonaceae)

***Hamatocaulis vernicosus*** (Mitt.) Hedenäs

*SINONIMI*: *Drepanocladus vernicosus* (Mitt.) Warnst.

**Parma**: Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980)

***Hedwigia*** P. Beauv. (Hedwigiaceae)

***Hedwigia ciliata*** (Hedw.) P. Beauv. var. *ciliata*

**Parma**: Bosco di Corniglio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Montevecchio alle sorgenti dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena**: San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Varana, Monte del Calvario presso Frassinoro, Dintorni di Fiumalbo (Fiori 1886) – **Bologna**: Vallata del Dardagna alla Chiesina e sotto il Farneto (Farneti 1889)

*ECOLOGIA*: Nel terreno del macigno (Farneti 1889); Sui sassi (Avetta 1897); Suolo in una prateria al limite del bosco (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1750 m (Velluti 1993)

*Herzogiella* Broth. (Hypnaceae)

*Herzogiella seligeri* (Brid.) Z. Iwats.

*SINONIMI*: *Dolichotheca repens* Lindb. ex Par. nom. inval. in synon.; *Plagiothecium silesiacum* (P. Beauv.) Br. eur. nom. illeg. incl. spec. prior.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Alpi di Mommio, Le Forbici alle sorgenti del Dolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); La Sega sopra Civago (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Lago Cerretano (Casali 1899b); Pian Vallese (Velluti 1993) – **Bologna**: Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000) – **Forlì-Cesena**: Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Abetina (Fitzgerald & Bottini 1881); Faggete (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Sui tronchi putridi degli abeti e dei faggi all'Appennino (Casali 1899b); Legni fradici, cortecce (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto (Velluti 1993); Su roccia e su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881); 1600 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1284 m (Velluti 1993)

*Heterocladium* Bruch & Schimp. (Pterigynandraceae)

*Heterocladium dimorphum* (Brid.) Schimp.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881); Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Vertice del Giovarello (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Valle dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: Rondinajo, San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Cimone, Sopra il Lago Santo (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sulla terra e sui sassi (Fiori 1886; Casali 1899b)

*ALTITUDINE*: 1100 m, 1900 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Nei boschi e nella regione nuda dell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Heterocladium heteropterum* (Brid.) Schimp.

**Reggio Emilia**: Pian Vallese, Passo della Cisa, Monte Ravino, Abetina Reale, Monte Cusna, Monte Prado (Velluti 1993) – **Bologna**: Gessi bolognesi al Buco dei Buoi (Aleffi & Silenzi 2000)

*ECOLOGIA*: Scorza e radici di faggio in un faggeto, suolo in un faggeto, in un vaccinieto e in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1284 m, 1470 m, 1550 m, 1560 m, 1590 m, 1600 m, 1750 m, 1780 m, 1820 m, 1920 m, 2050 m (Velluti 1993)

*Homalia* Brid. (Neckeraceae)

*Homalia trichomanoides* (Hedw.) Brid.

**Reggio Emilia**: Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881) – **Modena**: Bosco di Campogalliano lungo la Secchia presso Modena (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Al piede degli alberi (Fiori 1886)

*ALTITUDINE*: 1300 m (Fitzgerald & Bottini 1881)

*Homalothecium* Schimp. (Brachytheciaceae)

*Homalothecium lutescens* (Hedw.) H. Rob. var. *lutescens*

*SINONIMI*: *Brachythecium lutescens* (Hedw.) De Not.; *Camptothecium lutescens* (Hedw.) Schimp.; *Hypnum lutescens* Hedw.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Monte Orsajo, Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Collecchio (Avetta 1897); Roccamurata (Razzara 1981) – **Reggio Emilia**: Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Colli di San Valentino (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014)



– **Modena:** Casinalbo, Montegibbio, Rocca Santa Maria (Fiori 1886) – **Bologna:** Grotte (Cocconi 1881); Bologna a Ronzana e a Monte Paderno, Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena:** Colli di Cesena (Del Testa 1903); Casa Trove presso San Savino (Zodda 1921); Castrocaro località Cozzi, Bagnolo, Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Carpinello, Ladino, Monte Casale, Monte Gemelli, Monte Aiola, Campigna, Monte Fumajolo (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO:* Provincia di Parma, Serie II Fascicolo I 2, Passerini e Sabbioni 1866

*ECOLOGIA:* Sui muri, sui sassi, nei boschi, a piè degli alberi ecc. (Bracciforti 1877); Nei boschi ombrosi sulla terra (Avetta 1897); Sul terreno nei boschi e lungo le rive (Fiori 1886; Casali 1899b); Nei luoghi aridi (Del Testa 1903); In un bosco di querce (Zodda 1921); Sul calcare, sui gessi (Zangheri 1959); Terreno faggete, terra, rocce calcaree e gessose, ceppi (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE:* Dal piano agli alti monti (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Homalothecium philippeanum*** (Spruce) Schimp.

**Reggio Emilia:** Passo della Cisa (Velluti 1993) – **Modena:** Vallata del Dardagna nella Riva (Farneti 1889) –

**Bologna:** Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Vallata del Dardagna alla Riva (Farneti 1889)

*ECOLOGIA:* Arenaria in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE:* 1500 m (Velluti 1993)

***Homalothecium sericeum*** (Hedw.) Schimp.

*SINONIMI:* *Homalothecium sericeum* (Hedw.) Schimp. var. *robustum* Warnst.; *Hypnum sericeum* L.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Rondebocco, Monte Prinzerà, Torrechiara (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Monte Ventasso alla selva del Pizzetto (Re 1798 citato in Casali 1899b); San Valentino (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Albinea al Castello, Bagnolo in Piano, Sesso (Casali 1899b); Passo della Cisa, Monte Ravino (Velluti 1993); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Modena:** Maranello, Modena, Dintorni di Fiumalbo (Fiori 1886) – **Bologna:** Lungo il Rio Maggiore (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Colle di San Luca presso Bologna (Fiori 1886); Vallata del Dardagna alla Chiesina e nei Monti della Riva (Farneti 1889); Gessi bolognesi (Cobau 1932); Croara/Miserazzano (Ferrari 1974); Gessi bolognesi lungo la via della Gaibola, al Buco della Gaibola, alla Grotta della Spipola, a Miserazzano e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-3, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Pineta di Ravenna (Del Testa 1903); Sasso (Zangheri 1959), Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Ca' di Sasso, a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena:** Comero, Colli di Cesena (Del Testa 1903); Bertinoro ai Cappuccini (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); San Savino (Zangheri 1966b) a Casa Trove (Zodda 1921); Ladino, Monda, Scardavilla, Casticciano, Carpena (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Monte Casale, Castrocaro località Cozzi (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); San Martino Villafranca, Monte Poggiolo, Selbagnone, San Mamante, San Martino in Avello, Colmano, Monte Trabbio, Monte Ajola, Campigna località La Lama, Balze località Scalette, Monte Fumaiolo (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Rimini:** SIC Onferno (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO:* Provincia di Parma, Serie II Fascicolo XI 504, Passerini 1868

*ECOLOGIA:* Cresce sulla base de' tronchi e sulle foglie decomposte (Bertoloni 1865); Nei boschi erbosi, sui pedali delle querce e d'altre piante d'alto fusto (Bracciforti 1877); Alveo e boschi lungo un rio (Cocconi 1881); Sulle quercie ed in generale assai comune sugli alberi (Avetta 1897); Sopra gli alberi, i muri e le rupi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sui tronchi di querce, al piede delle querce, sui pioppi (Zodda 1921); Sul calcare, sullo sfaticcio gessoso, sui gessi, sul terriccio di roccia gessosa (Zangheri 1959); Terra, muri, rocce calcaree

e gessifere, ceppi, cortecce, terra umida, gessi (Zangheri 1966b); Arenaria in un faggeto (Velluti 1993); Su terreno, su terreno misto a gesso, su gesso, su roccia calcarea (Aleffi & Silenzi 2000)  
*ALTITUDINE*: 1250 m, 1500 m (Velluti 1993); Dal piano agli alti monti (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Homomallium* (Schimp.) Loeske (Hypnaceae)

*Homomallium incurvatum* (Schrad. ex Brid.) Loeske  
*SINONIMI*: *Hypnum incurvatum* Schrad. ex Brid.  
**Modena**: Sotto il Monte Modino di Frassinoro (Fiori 1886)  
*ECOLOGIA*: Sui sassi (Fiori 1886)

*Hygroamblystegium* Loeske (Amblystegiaceae)

*Hygroamblystegium tenax* (Hedw.) Jenn.  
*SINONIMI*: *Amblystegium tenax* (Hedw.) C.E.O. Jens.; *Hygroamblystegium irriguum* (Hook. & Wilson) Loeske  
**Reggio Emilia**: Monte Cusna (Velluti 1993) – **Bologna**: Gessi bolognesi a Siberia e al Buco dei Buoi (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Civitella di Romagna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
*ECOLOGIA*: Stillicidi (Zangheri 1966b); Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993); Su gesso, su *Sambucus nigra* (Aleffi & Silenzi 2000)  
*ALTITUDINE*: 1850 m (Velluti 1993)

*Hygroamblystegium varium* (Hedw.) Mönk.  
*SINONIMI*: *Amblystegium varium* (Hedw.) Lindb.  
**Reggio Emilia**: Monte Cusna (Velluti 1993)  
*ECOLOGIA*: Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)  
*ALTITUDINE*: 2000 m (Velluti 1993)

*Hygrohypnum* Lindb. (Amblystegiaceae)

*Hygrohypnum duriusculum* (De Not.) D.W. Jamieson  
*SINONIMI*: *Hypnum dilatatum* Wilson in Schimp.  
**Reggio Emilia**: Sotto il vertice del Monte Prado (Bottini 1913) – **Modena**: Alpe di San Pellegrino presso la strada mulattiera Vandelli (Bottini 1913); Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1926)  
*ECOLOGIA*: Sul macigno dei ruscelletti (Fitzgerald & Bottini 1881; Bottini 1913); nei rigagnoli tra i faggi e gli abeti (Bottini 1913)  
*ALTITUDINE*: 1620 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1500 m, 1550 m (Bottini 1913)

*Hygrohypnum luridum* (Hedw.) Jenn.  
*SINONIMI*: *Hygrohypnum palustre* Loeske *nom. illeg.*; *Hypnum palustre* Huds. *ex Brid. nom. illeg. incl. spec. prior.*  
**Pama**: Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Monte Cajo (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Mulino di Casalgrande (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: Mulino di San Marone a Saliceta San Giuliano, Sotto Guiglia (Fiori 1886) – **Bologna**: Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola e al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
*ECOLOGIA*: In un prato uliginoso (Avetta 1897); Sui sassi lungo i ruscelli e presso le ruote dei mulini sulle travi (Fiori 1886; Casali 1899b); Terra (Zangheri 1966b); Base della dolina, alla base di *Quercus pubescens* al margine della dolina (Aleffi & Silenzi 2000)  
*ALTITUDINE*: Dal piano all'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Hylocomiastrum*** Broth. (Hylocomiaceae)

***Hylocomiastrum pyrenaicum*** (Spruce) M. Fleisch.

**SINONIMI:** *Hylocomium pyrenaicum* (Spruce) Lindb.; *Hylocomium oakesii* (Sull.) Schimp.

**Reggio Emilia:** Alpe di Mommio (Fiori 1892b citato in Casali 1899b); Sotto il vertice del Monte Prado (Bottini 1913)

**ECOLOGIA:** Sul macigno all'ombra dei piccoli faggi (Bottini 1913)

**ALTITUDINE:** 1800 m (Fiori 1892b citato in Casali 1899b; Bottini 1913)

***Hylocomium*** Bruch & Schimp. (Hylocomiaceae)

***Hylocomium splendens*** (Hedw.) Schimp.

**SINONIMI:** *Hypnum splendens* Hedw.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Reggio Emilia:** Mora presso Toano, Cerè Marabino (Casali 1899a; Casali 1899b); Monte Prado, Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** Fajè nella catena di Serramazzone, Montefiorino, Monte Cantiere di Barigazzo, Montese (Fiori 1886) – **Bologna:** Monte Granaglione, Rio Maggiore (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Sasso a Mongardino, Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena:** Monte Gemelli (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009)

**ECOLOGIA:** Estremità superiore de' castagneti (Bertoloni 1865); Nei boschi e luoghi ombrosi (Bracciforti 1877); Alveo e boschi lungo un rio (Cocconi 1881); Nella regione del castagno e del faggio (Farneti 1889); Sul terreno ed i sassi nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899a; Casali 1899b); Terreno faggete, cortecce (Zangheri 1966b); Suolo in un vaccinieto e in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1750 m, 1770 m, 1870 m, 1960 m, 1990 m (Velluti 1993); Nella regione del castagno e del faggio (Farneti 1889); Nella regione montana ed appenninica (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Hymenoloma*** Dusén (Rhabdoweisiaceae)

***Hymenoloma crispulum*** (Hedw.) Ochyra

**SINONIMI:** *Dicranoweisia crispula* (Hedw.) Milde

**Parma:** Monte Orsajo, Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Vertice del Giovarello (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Alpi di Mommio, Vertice delle Alpi di Soraggio, Le Forbici (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Civago (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Cerreto dell'Alpi (Fiori 1886; Casali 1899b); Monte Casarola, Praderena (Casali 1899b); Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** San Pellegrino, Rondinajo, Libro Aperto (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Cimone (Fiori 1886) – **Bologna:** Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Vallata del Dardagna a Rio Piano e al Cavone del Corno alle Scale (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena:** Piancancelli (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sulle rupi di macigno (Farneti 1889); Sul macigno (Fiori 1886; Casali 1899b); Terreno (Zangheri 1966b); Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 2030 m (Velluti 1993); Nella parte elevata dell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Hymenostylium*** Brid. (Pottiaceae)

***Hymenostylium recurvirostrum*** (Hedw.) Dixon var. *recurvirostrum*

**SINONIMI:** *Hymenostylium curvirostre* Mitt. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Forlì-Cesena:** Bocconi (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Stillicidi (Zangheri 1966b)

*Hypnum* Hedw. (Hypnaceae)*Hypnum andoi* A.J.E. Sm.

*SINONIMI*: *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *mamillatum* Brid.

**Modena**: Sant'Anna Pelago sotto il vertice del Saltello (Bottini 1913) – **Bologna**: Gessi bolognesi (Cobau 1932) – **Forlì-Cesena**: Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sulle foglie morte delle faggete (Bottini 1913); Abetina (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 1580 m (Bottini 1913)

*Hypnum callicrboum* Brid.

**Parma**: Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Vertice delle Alpi di Soraggio, Le Forbici alle sorgenti del Dolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Praderena sopra Ospitaletto di Ligonchio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: Passo del Piastrino (Bottini 1913)

*ECOLOGIA*: Sullo schisto argilloso, sul macigno umido (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Sullo sfaticcio del macigno nelle faggete (Bottini 1913)

*ALTITUDINE*: 1300 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1750 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); 1580 m (Bottini 1913)

*Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *cupressiforme*

*SINONIMI*: *Drepanium cupressiforme* (Hedw.) G. Roth.; *Drepanium cupressiforme* (Hedw.) G. Roth. var. *uncinatum* (Schimp.) G. Roth.; *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *cuspidatum* Jur.; *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *longirostre* Schimp.; *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *uncinatum* Boulay

**Parma**: Collecchio, Sala Baganza, Noceto, Villa Sanvitale (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Monte Ventasso alla selva del Pizzetto (Re 1798 citato in Casali 1899b); Colli di San Valentino (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Cerè Marabino (Casali 1899b); Pian Vallese, Abetina Reale, Monte Ravino (Velluti 1993); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Modena**: Montegibbio, Montefiorino (Fiori 1886) – **Bologna**: Bologna a Montecastello (Bertoloni 1859); Madonna dell'Acero (Bertoloni 1844; Cocconi 1881); Più in alto dei Campi di Lustròla (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Croara (Cocconi 1881); Colle di San Luca presso Bologna (Fiori 1886); Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889); Gessi bolognesi (Cobau 1932); Gessi bolognesi al Buco dei Vinchi, alla Grotta della Spipola, a Siberia, al Buco dei Quercioli, a Acquafredda, al Buco della Gaibola, a Monte Castello (Aleffi & Silenzi 2000); San Lazzaro di Savena nell'altipiano di Miserazzano (Aleffi & Silenzi 2000; Pellis et al. 2014); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) all'ex cava a Filo (Aleffi 2016); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-3, 11633-3, 11633-4, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ferrara**: Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Ravenna**: Monte della Bicocca presso Brisighella, Pineta di Ravenna (Del Testa 1903); Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Pineta di Classe, Castelraniero, Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Monte Mauro, a Ca' di Sasso, a Borgo Rivola e a Sasso (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Comune ovunque nella zona casentinese (Pichi & Bottini 1888); Comero, Colli di Cesena (Del Testa 1903); Bertinoro ai Cappuccini (Del Testa 1903; Zangheri 1959); Poggio Appennino presso Civitella, Casticciano (Zodda 1921); Selbagnone, Ladino, Scardavilla (Zodda 1921; Zangheri 1966b); San Savino (Zangheri 1966b) a Casa Trove (Zodda 1921); Predappio, Monte Casale (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Colmano, Civitella di Romagna, Monte Ajola, Campigna, Balze località Scalette, Ricò, Campigna località Burraia (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sulla terra alla base dei tronchi (Bertoloni 1865); Sulle quercie (Avetta 1897); Sul terreno alla base degli alberi e sui sassi nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sugli abeti in un parco, in un bosco di querce, sul suolo calcareo, in un bosco di castagno (Zodda 1921); Sul calcare, sui gessi, sullo sfaticcio (Zangheri 1959); Terreno specialmente di boschi, ceppi, rocce calcaree e gessose, stillicidi, rocce gessifere

(Zangheri 1966b); Suolo, scorza di faggio e arenaria in un faggeto (Velluti 1993); Su ceppaia di *Fraxinus ornus*, su terreno, su gesso, su roccia, su *Quercus cerris*, su tronco marcescente, su roccia calcarea, alla base di *Quercus pubescens* (Aleffi & Silenzi 2000); Su *Pinus pinaster* (Fariselli 2015)

**ALTITUDINE:** 1250 m, 1284 m, 1400 m, 1600 m (Velluti 1993); Dai colli fino all'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Hypnum cupressiforme*** Hedw. var. ***filiforme*** Brid.

**SINONIMI:** *Drepanium cupressiforme* (Hedw.) G. Roth. var. *filiforme* (Brid.) G. Roth.

**Modena:** San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Montegibbio, Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena (Fiori 1886) – **Bologna:** Gessi bolognesi a Miserazzano, al Buco dei Buoi, al Buco dei Vinchi e al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Colli di Cesena all'Eremo (Del Testa 1903); San Savino (Zangheri 1966b) a Casa Trove (Zodda 1921); Scardavilla, Campigna località La Lama, Campigna località Burraia (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sopra gli alberi (Fiori 1886); Sulle querci (Del Testa 1903); In un bosco (Zodda 1921); Ceppi e cortecce (Zangheri 1966b); Su gesso, su terreno, su roccia, su *Quercus pubescens* (Aleffi & Silenzi 2000)

***Hypnum cupressiforme*** Hedw. var. ***lacunosum*** Brid.

**SINONIMI:** *Drepanium cupressiforme* (Hedw.) G. Roth. var. *tectorum* (Brid.) G. Roth.; *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *elatum* Schimp.; *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *tectorum* Brid.

**Parma:** Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980); Roccamurata (Razzara 1981) – **Reggio Emilia:** SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014); **Bologna:** Gessi bolognesi (Cobau 1932); Croara/Miserazzano (Ferrari 1974); Gessi bolognesi al Buco del Budriolo e al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Castelraniero (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** Scardavilla (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Ladino, Campigna località La Lama (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Rimini:** SIC Onferno (Aleffi et al. 2014) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sui gessi (Zangheri 1959); Terreno, ceppi, cortecce, rocce gessifere (Zangheri 1966b); Su tronco di *Fraxinus ornus* e su roccia, su gesso (Aleffi & Silenzi 2000); Su legno marcescente, su *Pinus pinaster* e *Quercus pubescens* (Fariselli 2015)

***Hypnum cupressiforme*** Hedw. var. ***resupinatum*** (Taylor) Schimp.

**SINONIMI:** *Hypnum resupinatum* Taylor

**Bologna:** Gessi bolognesi a Miserazzano, al Buco della Gaibola e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** San Varano, Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Terreno, cortecce (Zangheri 1966b); Su roccia calcarea, su terreno, su *Quercus cerris* (Aleffi & Silenzi 2000); Su *Quercus ilex*, *Q. pubescens*, *Populus nigra* e *Pinus pinaster* (Fariselli 2015)

***Hypnum cupressiforme*** Hedw. var. ***subjulaceum*** Molendo

**Bologna:** Gessi bolognesi (Cobau 1932) – **Forlì-Cesena:** San Varano, Ladino (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Terreno, ceppi (Zangheri 1966b)

***Hypnum imponens*** Hedw.

**SINONIMI:** *Hypnum cupressiforme* Hedw. subsp. *impones* (Hedw.) Boulay

**Ravenna:** Rivola (Zangheri 1959)

**ECOLOGIA:** Sui gessi (Zangheri 1959)

***Hypnum procerrimum*** Molendo

**Parma:** Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

**ECOLOGIA:** Sulle rupi (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Hypnum vaucheri*** Lesq.

**SINONIMI:** *Hypnum vaucheri* Lesq. var. *julaceum* (Brid.) Husn.

**Ravenna:** Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b);

SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola e a Sasso (inedito)

**ECOLOGIA:** Sui gessi (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

***Imbribryum*** N. Pedersen (Bryaceae)

***Imbribryum alpinum*** (Huds. ex With.) N. Pedersen

**SINONIMI:** *Bryum alpinum* Huds. ex With.

**Reggio Emilia:** Colli tra la Veggia e San Valentino, Sant'Antonino presso Sassuolo, Valle dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena:** Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

**ECOLOGIA:** Sul macigno (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Nei luoghi umidi (Fiori 1886; Casali 1899b)

**ALTITUDINE:** 1600 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Tanto in basso che all'Appennino (Fiori 1886); Al colle e al monte (Casali 1899b)

***Imbribryum mildeanum*** (Jur.) J.R. Spence

**SINONIMI:** *Bryum mildeanum* Jur.

**Reggio Emilia:** Monte Cusna/Monte Prado (Tomaselli 1991); Monte Cusna (Velluti 1993) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Arenaria in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 2030 m (Velluti 1993)

***Isopterygiopsis*** Z. Iwats. (Hypnaceae)

***Isopterygiopsis pulchella*** (Hedw.) Z. Iwats.

**Reggio Emilia:** Abetina Reale, Monte Ravino (Velluti 1993) – **Bologna:** Gessi bolognesi al Buco del Budriolo, a Siberia, al Buco dei Vinchi, a Acquafredda e al Buco dei Buoi (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

**ECOLOGIA:** Tronco di faggio marcescente e arenaria in un faggeto (Velluti 1993); Su *Sambucus nigra* e su roccia, su gesso, su terreno e alla base di *Fraxinus ornus* (Aleffi & Silenzi 2000)

**ALTITUDINE:** 1250 m, 1600 m (Velluti 1993)

***Isothecium*** Brid. (Lembophyllaceae)

***Isothecium alopecuroides*** (Lam. ex Dubois) Isov.

**SINONIMI:** *Hypnum myurum* Brid. nom. illeg.; *Isothecium myurum* Brid.; *Isothecium myurum* Brid. var. *robustum* Schimp.; *Isothecium viviparum* Lindb.; *Isothecium viviparum* Lindb. var. *scabridum* Limpr.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Orto Botanico di Parma, Collecchio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Albinea al Castello (Casali 1899b); Monte Prado (Bottini 1913); Pian Vallese, Abetina Reale, Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena:** Montegibbio, Monte Modino di Frassinoro (Fiori 1886) – **Bologna:** Campi di Lustrola (Bertoloni 1865) sotto il Granaglione (Cocconi 1881); Colle di San Luca presso Bologna (Fiori 1886); Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889); Gessi bolognesi al Buco dei Buoi (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Castelraniero (Zangheri 1966b) – **Forlì-Cesena:** Comero (Del Testa 1903);

Polenta, Riofreddo, Campigna, Campigna località La Lama, Balze località Scalette (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
*ECOLOGIA*: Cresce in terra e sui tronchi degli alberi (Bracciforti 1877); Su di un marciapiede di mattoni, nei boschi (Avetta 1897); Sul terreno e sui sassi nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Ai faggi (Del Testa 1903); Nei boschi di faggi ed abeti (Bottini 1913); Cortecce, tronchi, ceppi, roccia calcarea (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto (Velluti 1993); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)  
*ALTITUDINE*: 1500 m (Bottini 1913); 1284 m, 1460 m, 1600 m (Velluti 1993); Dai colli all'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Isothecium myosuroides*** Brid.

*SINONIMI*: *Eurhynchium myosuroides* (Brid.) Schimp.

**Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Forlì-Cesena**: Sasso Fratino (Bonini 2009)

### ***Kiaeria*** I. Hagen (Rhabdoweisiaceae)

***Kiaeria starkei*** (F. Weber & D. Mohr) I. Hagen

*SINONIMI*: *Dicranum starkei* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr

**Reggio Emilia**: Alpi di Mommio, Vertice delle Alpi di Soraggio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Montevecchio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Prado (Tomaselli 1991; Rossi & Ferrari 1994) – **Modena**: Passetto del Rondinajo, Libro Aperto (Fitzgerald & Bottini 1881); Cimone, Lago Scaffajolo, Rondinajo (Fiori 1886); Alto Appennino modenese (Tomaselli et al. 1994); Monte Giovo (Bassi 2007) – **Bologna**: Parco Regionale del Corno alle Scale (Tomaselli et al. 2002) – **Emilia**: Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991)

*ECOLOGIA*: Nei pascoli e sulle rupi (Fiori 1886; Casali 1899b)

*ALTITUDINE*: 1900 m (Fitzgerald & Bottini 1881); Alto Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

### ***Kindbergia*** Ochyra (Brachytheciaceae)

***Kindbergia praelonga*** (Hedw.) Ochyra

*SINONIMI*: *Eurhynchium praelongum* (Hedw.) Schimp.; *Eurhynchium stokesii* (Turner) Schimp.; *Hypnum praelongum* Hedw.; *Rhynchostegium stokesii* (Turner) De Not.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Parma (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Roncocesi, Villa Canali (Casali 1899a; Casali 1899b); Monte Prado (Velluti 1993) – **Modena**: San Faustino presso Modena, Bosco di Campogalliano lungo la Secchia, Casinalbo, Colli di Sassuolo (Fiori 1886) – **Bologna**: Gessi bolognesi al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-2, 11633-3, 11633-4, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Monte Mauro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Castelraniero (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) alla Tana del Re Tiberio (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Valle della Cesnola presso Cesena nella località detta l'Eremo (Del Testa 1903); Casa Trove presso San Savino (Zodda 1921); Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA*: Nei boschi a piè degli alberi e nei luoghi umidi (Bracciforti 1877); In un orticello umido ombroso (Avetta 1897); Lungo le sponde dei fossi, le siepi ecc. (Fiori 1886; Casali 1899a; Casali 1899b); Sul terreno in un bosco (Del Testa 1903); In un bosco (Zodda 1921); Sulle rocce gessifere (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Suolo in un vaccinieto (Velluti 1993); Su terreno e su gesso (Aleffi & Silenzi 2000); Al suolo e su *Quercus pubescens* (Fariselli 2015)

*ALTITUDINE*: 1870 m (Velluti 1993); In pianura e in collina (Fiori 1886; Casali 1899a; Casali 1899b)

### ***Leptobarbula*** Schimp. (Pottiaceae)

***Leptobarbula berica*** (De Not.) Schimp.

**Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

*Leptobryum* (Bruch & Schimp.) Wilson (Meesiaceae)

*Leptobryum pyriforme* (Hedw.) Wilson

*SINONIMI*: *Bryum pyriforme* Sw.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Modena**: Modena (Fiori 1892b)

*ECOLOGIA*: Sui vasi e sulle casse dei fiori (Bracciforti 1877); Presso una fonte (Fiori 1892b)

*Leptodictyum* (Schimp.) Warnst. (Amblystegiaceae)

*Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst.

*SINONIMI*: *Amblystegium riparium* (Hedw.) Schimp.; *Amblystegium riparium* (Hedw.) Schimp. var. *inundatum* Schimp.; *Hypnum ambiguum* (De Not.) A. Jaeger; *Hypnum riparium* Hedw.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Lungo un canale presso Langhirano (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Colli di Dinazzano, Mulino di Casalgrande (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Chiozza lungo il canale di Tresinaro, Roncolo, Roncocesi (Casali 1899b) – **Modena**: Casinalbo, Tagliati d'Albareto presso Modena (Fiori 1886) – **Bologna**: Grotte ai Gessi (Cocconi 1881); Bologna lungo il Ravone e a Gaibola (Farneti 1889); Valle La Comune 2 km a Sud-Est di Malalbergo (Piccoli & Gerdol 1979) – **Ferrara**: Presso Ferrara (Limpricht 1904) – **Ravenna**: Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Colli di Cesena (Del Testa 1903); Torrente Bevano a Pievequinta (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Cresce in riva ai canali, ai ruscelli ecc. ed aderisce alle pietre, ai pali, alle chiglia dei battelli, alle ruote dei mulini ecc. (Bracciforti 1877); Sui gessi (Farneti 1889); Lungo un canale (Avetta 1897); Sui sassi e sui muri lungo i canali ed i ruscelli (Fiori 1886; Casali 1899b); Nei maceri sui muri e pali, sulle pietre lungo i ruscelli (Del Testa 1903); Su *Pinus pinaster* (Fariselli 2015)

*Leptodon* D. Mohr (Leptodontaceae)

*Leptodon smithii* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr

*SINONIMI*: *Pterigynandrum smithii* (Hedw.) Lam. & DC.

**Piacenza**: Presso Bobbio (Pollini 1824) – **Bologna**: Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889 citato in Fiori 1892b); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA*: Sulle rupi calcaree (Pollini 1824); Sulle rupi (Farneti 1889 citato in Fiori 1892b)

*Lescuraea* Schimp. (Leskeaceae)

*Lescuraea incurvata* (Hedw.) E. Lawton

*SINONIMI*: *Hypnum incurvatum* (Hedw.) P. Beauv. *hom. illeg.*; *Pseudoleskea atrovirens* (Dicks. ex Brid.) Schimp.; *Pseudoleskea incurvata* (Hedw.) Loeske

**Reggio Emilia**: Ospitaletto di Ligonchio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Passo della Cisa, Abetina Reale, Monte Ravino, Monte Cusna, Monte Prado (Velluti 1993) – **Modena**: Da Fiumalbo salendo il Cimone, Rondinajo (Fiori 1886); Vallata del Dardagna Monte Capelbuso (Farneti 1889) – **Bologna**: Madonna dell'Acero (Bertoloni 1844; Cocconi 1881; Fiori 1886; Farneti 1889); Vallata del Dardagna al Monte Grande, a Rio Piano, al Monte Capelbuso e al Cavone del Corno alle Scale (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena**: Giogana dell'Appennino fra Poggio Scali e l'Eremo di Camaldoli (Pichi & Bottini 1888); Campigna, Campigna località Burraia (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO*: Provincia di Reggio Emilia, Serie II Fascicolo XXV 1214, Bottini 1882

*ECOLOGIA*: Sotto i faggi (Pichi & Bottini 1888); Sul macigno e al piede degli alberi (Farneti 1889); Al piede degli alberi e sui sassi nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Terra, ceppi di *Fagus sylvatica* (Zangheri 1966b); Suolo, scorza e radici di faggio, tronco di faggio morto, arenaria e microconglomerato in un faggeto, arenaria in un vaccinieto, suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)



*ALTITUDINE*: 1390 m, 1400 m, 1420 m, 1460 m, 1470 m, 1500 m, 1550 m, 1560 m, 1600 m, 1720 m, 1820 m, 1990 m, 2020 m (Velluti 1993); Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Lescuraea mutabilis* (Brid.) Lindb. ex I. Hagen

*SINONIMI*: *Lescuraea striata* (Schwägr.) Schimp. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Parma**: Monte Gotro (Bertoloni 1859 citato in Fitzgerald & Bottini 1881) – **Reggio Emilia**: Praderena (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Valle di Riarbero (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Ravenna**: Sasso (Zangheri 1959); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Sasso (inedito)

*ECOLOGIA*: Sui rami dei piccoli faggi (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Sul terriccio e le rocce gessifere (Zangheri 1959); Terreno su gesso (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)

*Lescuraea patens* Lindb.

*SINONIMI*: *Pseudoleskea patens* (Lindb.) Kindb.

**Reggio Emilia**: Sotto il vertice del Monte Prado (Bottini 1913) – **Modena**: Tra le Radici ed il Santuario di San Pellegrino all'imboccatura di Via Vandelli (Bottini 1913)

*ECOLOGIA*: Sul macigno (Bottini 1913); Sul macigno asciutto (Bottini 1913)

*ALTITUDINE*: 1600 m, 1900 m (Bottini 1913)

*Lescuraea plicata* (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Broth.

*SINONIMI*: *Ptychodium plicatum* (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.

**Modena**: Lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*ALTITUDINE*: 1800 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*Lescuraea saxicola* (Schimp.) Molendo

*SINONIMI*: *Lescuraea striata* (Schwägr.) Schimp. *nom. illeg. incl. spec. prior. var. saxicola* Schimp

**Reggio Emilia**: Vertice della Alpi di Soraggio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)

*ECOLOGIA*: Sulle rupi (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)

*ALTITUDINE*: 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)

### *Leskea* Hedw. (Leskeaceae)

*Leskea polycarpa* Hedw.

**Reggio Emilia**: Villa Liberati a Coviolo, Traghettino, Sesso (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena**: San Faustino presso Modena, Orto Botanico di Modena, Navicello, Bosco di Campogalliano, Serpentine di Varana (Fiori 1886) – **Bologna**: SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014)

*ECOLOGIA*: Al piede degli alberi (Fiori 1886; Casali 1899b)

*ALTITUDINE*: In pianura ed in collina (Fiori 1886; Casali 1899b)

*NOTE*: In letteratura esiste anche una segnalazione per l'Appennino tosco-emiliano (Ferrarini 1982) con l'indicazione stazionale generica di "Lagheti e acquitrini dal Passo della Cisa al Passo delle Radici"

### *Leucobryum* Hampe (Leucobryaceae)

*Leucobryum glaucum* (Hedw.) Ångstr.

*SINONIMI*: *Oncophorus glaucus* (Hedw.) Bruch & Schimp.

**Modena**: Castelvetro (Fiori 1886); Tra Campo di Sallo ed il Fajè nei monti Modenesi (Fiori 1892b) –

**Bologna**: Rio Maggiore (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Vallata del Dardagna a Rocca Corneta in luogo detto Val Piana (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena**: Colli di Cesena (Del Testa 1903); Polenta (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Sulle rive umide ed ombrosissime di un rio (Bertoloni 1865); Alveo e boschi lungo un rio

(Cocconi 1881); Boschetti (Fiori 1886); Nei castagneti umidi (Farneti 1889); Castagneti (Fiori 1892b); Sulle ceppaie dei castagni (Del Testa 1903); Ceppi castagno (Zangheri 1966b)

*Leucodon* Schwägr. (Leucodontaceae)

*Leucodon sciuroides* (Hedw.) Schwägr.

*SINONIMI*: *Leucodon sciuroides* (Hedw.) Schwägr. var. *morensis* (Schwägr.) Kindb.

**Piacenza**: Castellarquato (Avetta 1897) – **Parma**: Berceto (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Montebabbio (Fiori 1886; Casali 1899b); Villa San Pellegrino, Rivalta, Leguigno (Casali 1899b) – **Modena**: Casinalbo, Montegibbio (Fiori 1886) – **Bologna**: Monte Granaglione, Rio Maggiore (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Vallata del Dardagna (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Pineta di Ravenna (Del Testa 1903) – **Forlì-Cesena**: Comero, Colli di Cesena (Del Testa 1903); Scardavilla (Zodda 1921; Zangheri 1966b); San Savino (Zangheri 1966b) a Casa Trove (Zodda 1921); Casticciano (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Ladino, Colmano, San Martino in Avello, Monte Trebbio, Civitella di Romagna, Campigna, Monte Fumajolo, Colle del Caranio (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Alla base terrosa del pedale de' castagni, rupi terrose, terra umida de' boschi (Bertoloni 1865); Alveo e boschi lungo un rio (Cocconi 1881); Sui castagni (Farneti 1889); Appiè degli alberi, sui castagni (Avetta 1897); Sopra gli alberi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sui faggi, sugli alberi, sui pini (Del Testa 1903); Sulle querce, in un bosco (Zodda 1921)

*ALTITUDINE*: Dal piano agl'alti monti (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Meesia* Hedw. (Meesiaceae)

*Meesia triquetra* (L. ex Jolycl.) Ångstr.

*SINONIMI*: *Mnium triquetrum* L. ex Jolycl.

**Reggio Emilia**: Lago Cerretano (Bottini 1913) – **Ferrara**: Paludi ferraresi (Zangheri 1925)

*ECOLOGIA*: Rive paludose di un lago in bellissimi cesti in gran parte sommersi nei rigagnoli scorrenti sulla torba (Bottini 1913)

*ALTITUDINE*: 1360 m (Bottini 1913)

*Microbryum* Schimp. (Pottiaceae)

*Microbryum davallianum* (Sm.) R.H. Zander

*SINONIMI*: *Gymnostomum conicum* Schleich. ex Schwägr.; *Pottia minutula* (Schwägr.) Hampe; *Pottia rufescens* (Schultz) Warnst. var. *conica* (Schleich. ex Schwägr.) Giacom.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Monte Ferloso (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Tra le Veggia e Cadiroggio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: Nel Modenese (Venturi 1885a; Venturi 1886); Casinalbo, Ubersetto tra Formigine e Maranello, Orto Botanico di Modena (Fiori 1886) – **Ravenna**: Sasso (Zangheri 1959); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Sasso (inedito)

*ECOLOGIA*: Sulla terra nei luoghi umidi (Bracciforti 1877); Sul terreno nei campi argillosi, nelle ajuole, sulla sponda di un viottolo (Fiori 1886); Sopra un sasso nei boschi d'abete (Avetta 1897); Sullo sfaticcio e sulla roccia gessifera (Zangheri 1959); Sfaticcio gessoso (Zangheri 1966b)

*NOTE*: La localizzazione del toponimo Monte Ferloso non è chiara

*Microeurhynchium* Ignatov & Vanderp. (Brachytheciaceae)

*Microeurhynchium pumilum* (Wilson) Ignatov & Vanderp.

*SINONIMI*: *Eurhynchium pumilum* (Wilson) Schimp.; *Rhynchostegiella pallidirostris* (Brid.) Loeske *nom. illeg. incl. spec. prior.*; *Rhynchostegium pumilum* (Wilson) De Not.

**Reggio Emilia:** Mulino della Veggia a Sant'Antonino presso Sassuolo, Tana della Muscina (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); SIC Ca` del Vento, Ca` del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) – **Bologna:** Gessi bolognesi al Buco dei Buoi, alla Grotta della Spipola, a Siberia, al Buco dei Vinchi, al Buco del Budriolo, al Buco della Gaibola e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Emilia:** Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950) – **Ravenna:** Rivola (Zangheri 1959) alla Tana del Re Tiberio (Zangheri 1966b); Castelraniero (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena:** Colli di Cesena, Rio Marano, San Demetrio (Del Testa 1903); San Martino in Strada, Polenta (Zangheri 1966b)  
**ECOLOGIA:** Sul terreno nel boschetto, che trovasi presso un mulino (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul terreno nei luoghi selvatici (Del Testa 1903); Sulle rocce gessose umide (Zangheri 1959); Terreno, roccia umida (Zangheri 1966b); Su roccia, su gesso, su terreno, su *Ulmus minor* (Aleffi & Silenzi 2000)

*Mielichhoferia* Nees & Hornsch. (Mniaceae)

*Mielichhoferia mielichhoferiana* (Funck) Loeske

**SINONIMI:** *Mielichhoferia nitida* Nees & Hornsch. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Reggio Emilia:** Vertice del Giovarello (Fitzgerald e Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

**ECOLOGIA:** Fra il macigno (Fitzgerald e Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

**ALTITUDINE:** 1760 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*Mnium* Hedw. (Mniaceae)

*Mnium hornum* Hedw.

**Parma:** Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Bologna:** SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014)

*Mnium lycopodioides* Schwägr.

**SINONIMI:** *Mnium orthorrhynchium* Bruch et Schimp.

**Reggio Emilia:** Cerreto dell'Alpi presso la Sega (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

**ECOLOGIA:** Nei luoghi umidi lungo i ruscelli e nei boschi (Casali 1899b)

**ALTITUDINE:** Nell'Appennino (Casali 1899b)

*Mnium marginatum* (Dicks. ex With.) P. Beauv. var. *marginatum*

**SINONIMI:** *Mnium serratum* Brid.

**Reggio Emilia:** Cerreto dell'Alpi presso la Sega (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Pian Vallese, Passo della Cisa, Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena:** Tra San Pellegrino ed il Lago Santo (Fiori 1886) – **Bologna:** Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole (inedito)

**ECOLOGIA:** Nei luoghi buii e sotto i massi sporgenti nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Suolo e scorza di faggio in un faggeto (Velluti 1993); Su terreno e su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

**ALTITUDINE:** 1284 m, 1550 m, 1590 m, 1600 m (Velluti 1993); Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Mnium spinosum* (Voit) Schwägr.

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Suolo in un vaccinieto e in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1750 m, 1910 m (Velluti 1993)

*Mnium spinulosum* Bruch & Schimp.

**Reggio Emilia:** SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014)

*Mnium stellare* Hedw.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Reggio Emilia:** Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena:** Rocca Malatina, Rocca Santa Maria (Fiori 1886) – **Bologna:** Gessi bolognesi a Acquafredda e a Siberia (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Rontana (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Rontana (inedito) – **Forlì-Cesena:** Roversano (Del Testa 1903); Predappio (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); San Martino in Strada, Polenta (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Nei boschi ombrosi ed umidi (Bracciforti 1877); Castagneti, boschetti (Fiori 1886); In un bosco (Del Testa 1903); Sulla roccia gessifera (Zangheri 1959); Terra, rocce gessifere (Zangheri 1966b); Tronco di faggio morto in un faggeto (Velluti 1993); Su roccia e su terreno, su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)  
**ALTITUDINE:** 1400 m (Velluti 1993)

*Myurella* Bruch & Schimp. (Pterigynandraceae)

*Myurella julacea* (Schwägr.) Schimp.

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Suolo in un vacciniato (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1970 m (Velluti 1993)

*Myurella tenerrima* (Brid.) Lindb.

**Emilia:** Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991)

*Neckera* Hedw. (Neckeraceae)

*Neckera pennata* Hedw.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877)

**ECOLOGIA:** Incontrasi nei boschi appiè di vecchi alberi e quasi ovunque sulla terra (Bracciforti 1877)

*Neckera pumila* Hedw.

**Forlì-Cesena:** Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*Nogopterium* Crosby & W.R. Buck (Leucodontaceae)

*Nogopterium gracile* (Hedw.) Crosby & W.R. Buck

**SINONIMI:** *Leptohymenium gracile* (Hedw.) Huebener; *Pterogonium gracile* (Hedw.) Sm.; *Pterogonium ornithopodioides* (Huds.) Lindb.

**Parma:** Monte Cajo, Montagnana (Avetta 1897) – **Bologna:** Madonna dell'Acero (Bertoloni 1844; Cocconi 1881) – **Forlì-Cesena:** Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Appiè dei faggi (Avetta 1897); Ceppi (Zangheri 1966b)

*Nyholmiella* Holmen & Warncke (Orthotrichaceae)

*Nyholmiella obtusifolia* (Brid.) Holmen & Warncke

**SINONIMI:** *Orthotrichum obtusifolium* Brid.

**Reggio Emilia:** Colli di Dinazzano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Albinea, Rivalta, Sesso (Casali 1899b) – **Modena:** Casinalbo, Saliceta San Giuliano (Fiori 1886)

**ECOLOGIA:** Sui tronchi dei pioppi (Fiori 1886; Casali 1899b)

**ALTITUDINE:** In pianura e in collina (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Oligotrichum* Lam. & DC. (Polytrichaceae)

***Oligotrichum hercynicum*** (Hedw.) Lam. & DC.

**Reggio Emilia:** Monte Cusna/Monte Prado (Tomaselli 1991); Monte Prado (Velluti 1993; Rossi & Ferrari 1994; Ferrari 2002a) – **Modena:** Alto Appennino modenese (Tomaselli et al. 1994) – **Bologna:** Parco Regionale del Corno alle Scale (Tomaselli et al. 2002) – **Emilia:** Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991)

**ECOLOGIA:** Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1980 m (Velluti 1993)

***Oncophorus*** (Brid.) Brid. (Rhabdoweisiaceae)

***Oncophorus virens*** (Hedw.) Brid.

**SINONIMI:** *Cynodontium virens* (Hedw.) Schimp.

**Reggio Emilia:** Vertice delle Alpi di Soraggio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Montevecchio (Fiori 1892b citato in Casali 1899b) – **Modena:** Lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886, in Farneti 1889 e in Provasi 1926; Fiori 1892b) – **Bologna:** Vallata del Dardagna a Rio Piano (Farneti 1889)

**ECOLOGIA:** Sullo schisto calcareo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Sullo schisto argilloso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Sulle rupi di macigno (Farneti 1889)

**ALTITUDINE:** 1800 m (Fiori 1892b citato in Casali 1899b)

***Orthothecium*** Bruch & Schimp. (Hypnaceae)

***Orthothecium intricatum*** (Hartm.) Schimp.

**Bologna:** Buca della Spipola presso Bologna (Fiori 1886)

**ECOLOGIA:** Sulla terra umida (Fiori 1886)

***Orthotrichum*** Hedw. (Orthotrichaceae)

***Orthotrichum affine*** Schrad. ex Brid.

**SINONIMI:** *Orthotrichum affine* Schrad. ex Brid. var. *neglectum* (Venturi) Venturi in Husn.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Reggio Emilia:** Monte del Gesso a Scandiano, Sant'Antonino presso Sassuolo, Civago (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Borzano, Quattro Castella, Montecavolo (Casali 1899b) – **Modena:** Montegibbio (Fiori 1886); Casinalbo (Fiori 1886; Fiori 1892b); Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena, Serramazzone (Fiori 1892b) – **Bologna:** Bologna (Farneti 1889); Gessi bolognesi al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11632-2, 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Dintorni di Faenza (Del Testa 1903) – **Forlì-Cesena:** Dintorni di Forlì (Del Testa 1903); Forlì, Monte Gemelli, Campigna località Burraia (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sugli alberi (Farneti 1889); Sopra gli alberi e sui muri (Fiori 1886; Casali 1899b) Terra, arenaria calcaree (Zangheri 1966b); Su tronco di *Fraxinus ornus* (Aleffi & Silenzi 2000)

**ALTITUDINE:** In pianura e collina (Fiori 1892b)

***Orthotrichum alpestre*** Bruch & Schimp.

**Modena:** Pian Cavallaro sul Cimone (Fiori 1886)

***Orthotrichum anomalum*** Hedw.

**SINONIMI:** *Orthotrichum anomalum* Hedw. var. *defluens* Venturi; *Orthotrichum anomalum* Hedw. var. *saxatile* Milde

**Parma:** Berceto (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Colli di Pujanello (Fiori 1886); Casalgrande, Civago, Ventasso, Monte del Gesso a Scandiano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Stiano presso Toano (Casali 1899b) – **Modena:** Serpentini di Varana (Fiori 1886) – **Bologna:** Dintorni di Bologna a Praderno, Crovara (Fiori 1886); Vallata del Dardagna a Rocca Corneta (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante

11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Castrocaro (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); Monte Gemelli, San Benedetto in Alpe (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sui gessi (Fiori 1886); Sugli alberi (Farneti 1889); Sui muri a secco (Avetta 1897); Sui sassi e sui muri (Fiori 1886; Casali 1899b); Sulle rocce (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); Arenarie calcaree, roccia calcarea (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: Dai colli all'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Orthotrichum cupulatum*** Hoffm. ex Brid. var. *cupulatum*

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Monte Cajo (Avetta 1897) – **Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

*ECOLOGIA*: Cresce sulle pietre e più di rado sul tronco degli alberi (Bracciforti 1877); Sui sassi (Avetta 1897)

*NOTE*: In letteratura esistono due segnalazioni per il reggiano di Fiori (1886), citate anche da Casali (1899b), che però sulla base di una successiva pubblicazione dello stesso Fiori (1892b) vengono da noi interpretate come da riferirsi alla varietà *riparium* (Fiori 1892b)

***Orthotrichum cupulatum*** Hoffm. ex Brid. var. *riparium* Huebener

**Reggio Emilia**: Cerreto dell'Alpi presso la Sega, Rupi di Bismantova (Fiori 1892b; citato in Casali 1899b)

*ECOLOGIA*: Sulle rocce umide (Fiori 1892b; Casali 1899b)

***Orthotrichum diaphanum*** Schrad. ex Brid.

**Parma**: Orto Botanico di Parma (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Dintorni di Reggio, Roncocesi, Sesso, Quattro Castella (Casali 1899a; Casali 1899b); Abetina Reale (Velluti 1993) – **Modena**: Casinalbo, Dintorni di Modena, Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena, Monteciccio (Fiori 1886) – **Bologna**: Orto Botanico di Bologna (Brizi 1892-1894); Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Persolino (Del Testa 1903); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Ladino (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Forlì, San Martino in Strada, San Lorenzo in Noceto, San Varano, Villagrappa, San Martino in Avello, Campigna località La Lama (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO*: Provincia di Parma, Serie I Fascicolo XXI 16 (1016), Passerini 1863

*ECOLOGIA*: Sopra gli alberi (Fiori 1886); Sui tronchi degli alberi (Brizi 1892-1894); Sugli alberi e più di rado sulle pietre (Avetta 1897); Sopra gli alberi e più di rado sulle pietre al piano e al colle (Casali 1899b); Sulle querce in un bosco (Zodda 1921); Terra, roccia calcarea, cortecce (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto (Velluti 1993); Su *Quercus cerris* (Aleffi & Silenzi 2000); Su *Fraxinus ornus* (Fariselli 2015)

*ALTITUDINE*: 1600 m (Velluti 1993); In pianura e collina (Fiori 1886; Casali 1899a; Casali 1899b)

***Orthotrichum lyellii*** Hook. & Taylor

**Reggio Emilia**: Lago Cerretano (Fiori 1892b citato in Casali 1899b) – **Bologna**: Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000) – **Forlì-Cesena**: Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA*: Sui vecchi faggi (Fiori 1892b citato in Casali 1899b); Su *Quercus cerris* (Aleffi & Silenzi 2000)

***Orthotrichum pallens*** Bruch ex Brid.

**Modena**: Montegibbio (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sulle querce ed aceri nelle siepi (Fiori 1886)

***Orthotrichum philibertii*** Venturi

**Romagna**: Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950)

***Orthotrichum pumilum*** Sw. ex anon.

**Bologna**: Orto Botanico di Bologna (Brizi 1892-1894); Gessi bolognesi al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000) – **Ravenna**: Fagnano e Persolino presso Faenza (Del Testa 1903) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sui tronchi degli alberi (Brizi 1892-1894); Sugli alberi (Del Testa 1903); Su *Quercus pubescens* sul fondo di una dolina (Aleffi & Silenzi 2000)

***Orthotrichum rupestre*** Schleich. ex Schwaegr.

*SINONIMI*: *Orthotrichum sturmii* Hoppe & Hornsch.

**Parma**: Collecchio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Civago, Valle di Riarbero (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena**: San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Varana (Fiori 1886) – **Bologna**: Santuario dell'Acero (Fiori 1886) – **Forlì-Cesena**: Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Rimini**: SIC Onferno (Aleffi et al. 2014)

*ECOLOGIA*: Sui castagni (Avetta 1897); Sui sassi, i muri e le rupi nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Arenaria in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1250 m (Velluti 1993); Specialmente all'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Orthotrichum schimperi*** Hammar

*SINONIMI*: *Orthotrichum fallax* Bruch ex Brid.

**Reggio Emilia**: Villa Canali, Coviolo, Rivalta (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena**: Casinalbo, Montegibbio (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sui pioppi (Fiori 1886; Casali 1899a; Casali 1899b)

***Orthotrichum shawii*** Wilson

**Forlì-Cesena**: Dintorni di Meldola (Dismier 1929); Scardavilla (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Ceppi (Zangheri 1966b)

*NOTE*: La segnalazione di Zangheri fa certamente riferimento a quella di Dismier in quanto quest'ultimo cita espressamente di aver ricevuto i campioni da parte di Zangheri

***Orthotrichum speciosum*** Nees

**Modena**: Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena (Fiori 1892b)

*ECOLOGIA*: Sugli alberi (Fiori 1892b)

***Orthotrichum stramineum*** Hornsch. ex Brid.

**Reggio Emilia**: Cerreto dell'Alpi presso la Sega (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Lago del Cerreto (Casali 1899b); Abetina Reale (Velluti 1993) – **Bologna**: Vallata del Dardagna all'Acero (Farneti 1889)

*ECOLOGIA*: Sui faggi (Farneti 1889); Sopra gli alberi specialmente sui faggi (Casali 1899b); Scorza di faggio in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1600 m (Velluti 1993); Nell'Appennino (Casali 1899b)

***Orthotrichum striatum*** Hedw.

*SINONIMI*: *Orthotrichum leiocarpum* Bruch & Schimp. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Reggio Emilia**: Valle di Riarbero (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Sant'Antonino presso Sassuolo (Fiori 1886; Casali 1899b) – **Modena**: Cimone, Belvedere presso Sassuolo (Fiori 1886) – **Bologna**: Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Fagnano e Persolino presso Faenza (Del Testa 1903) – **Forlì-Cesena**: Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Nei boschi di faggi (Fiori 1886); Sopra gli alberi (Fiori 1886; Casali 1899b; Del Testa 1903); Cortecce, ceppi (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: Più abbondante negli alti monti che in basso (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Orthotrichum tenellum*** Bruch ex Brid.

**Parma**: Parma (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Sant'Antonino presso Sassuolo (Fiori 1886 citato in Casali 1899b e in Dia & Raimondo 1986); Villa Canali, Coviolo (Casali 1899b citato in Dia & Raimondo 1986)

– **Modena:** Casinalbo, Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena, lungo la Fossa a Nirano (Fiori 1886 citato in Dia & Raimondo 1986) – **Bologna:** Bologna (Farneti 1889 citato in Dia & Raimondo 1986); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Persolino presso Faenza (Del Testa 1903)

*DATI D'ERBARIO:* **Modena:** Casinalbo, Fiori 1885 [FI] (Dia & Raimondo 1986)

*ECOLOGIA:* Sugli alberi (Farneti 1889 citato in Dia & Raimondo 1986); Sopra gli alberi specialmente pioppi e salici (Fiori 1886 citato in Dia & Raimondo 1986; Casali 1899b); Sugli alberi (Avetta 1897; Del Testa 1903)

*ALTITUDINE:* In pianura e in collina (Fiori 1886 citato in Dia & Raimondo 1986; Casali 1899b)

### *Oxyrrhynchium* (Schimp.) Warnst. (Brachytheciaceae)

*Oxyrrhynchium hians* (Hedw.) Loeske

*SINONIMI:* *Eurhynchium praelongum* (Hedw.) Schimp. subsp. *swartzii* (Turn.) Kindb.; *Eurhynchium swartzii* (Turner) Curnow; *Rhynchostegium praelongum* (Hedw.) De Not. var. *swartzii* (Turner) Venturi & Bott.

**Bologna:** SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-2, 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Castelraniero (Zangheri 1966b); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** Colli a Bertinoro, Colli a Cesena (Del Testa 1903); Monte dei Cappuccini (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); San Savino (Zangheri 1966b) presso Casa Trove (Zodda 1921); Castrocaro località Cozzi, Predappio (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Carpena, Ladino, Scardavilla, Pettrignone, Civitella di Romagna, Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA:* Sulle sponde dei fossi e sulle ripe erbose dei colli (Del Testa 1903); In un bosco di querce (Zodda 1921); Sul calcare, sul terriccio calcareo (Zangheri 1959); Terreno di bosco ecc., calcinacci, roccia calcarea (Zangheri 1966b); Al suolo (Fariselli 2015)

*Oxyrrhynchium schleicheri* (R. Hedw.) Röhl.

*SINONIMI:* *Eurhynchium abbreviatum* (Turner) Brockm.; *Eurhynchium praelongum* (Hedw.) Schimp. subsp. *schleicheri* (R. Hedw.) Kindb.; *Eurhynchium schleicheri* (R. Hedw.) Milde

**Modena:** Belvedere sopra Sassuolo (Fiori 1886) – **Bologna:** Gessi bolognesi lungo la via della Gaibola, al Buco della Gaibola, a Acquafredda, alla Grotta della Spipola e al Buco dei Buoi (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Pineta di San Vitale (Zangheri 1966b); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** Predappio (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Forlì, Pianta, Romiti, Ladino, Scardavilla, Polenta, Colmano, San Savino, Portico di Romagna, Civitella di Romagna, Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA:* Sul terreno in un boschetto (Fiori 1886); Terreno di bosco ecc., cortecce (Zangheri 1966b); Su ceppaia, su gesso e su *Ulmus minor*, su *Fraxinus ornus*, su *Sambucus nigra*, alla base e sul tronco di *Alnus glutinosa*, alla base di *Quercus pubescens*, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000); Su *Quercus pubescens* (Fariselli 2015)

*Oxyrrhynchium speciosum* (Brid.) Warnst.

*SINONIMI:* *Eurhynchium speciosum* (Brid.) Jur.; *Rhynchostegium speciosum* (Brid.) Venturi & Bott.

**Reggio Emilia:** Villa Cavazzoli, al Fontanello, a San Giulio, Roncocesi (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena:** Fontanazzi modenesi di San Faustino e Cogmento (Bertolani Marchetti 1959) – **Bologna:** Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola, a Acquafredda e al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Castelraniero presso Faenza (Del Testa 1903); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** Cesena (Del Testa 1903)

*ECOLOGIA:* Nei fossi (Casali 1899a; Casali 1899b); Sui muri dei pozzi e dei maceri, sugli alberi (Del Testa 1903); Su gesso, su tronco di *Acer campestre*, su terreno, su tronco marcescente (Aleffi & Silenzi 2000); Al suolo e su *Pinus pinea* (Fariselli 2015)



***Oxystegus*** (Broth.) Hilp. (Pottiaceae)

***Oxystegus tenuirostris*** (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm.

**SINONIMI:** *Didymodon cylindricus* (Bruch ex Brid.) Bruch & Schimp. *hom. illeg.*; *Oxystegus cylindricus* (Bruch ex Brid.) Hilp.

**Parma:** Lago Palo, Torrente della Spilla (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito)

**ECOLOGIA:** Sulle rupi (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Sulla roccia gessifera (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

***Palustriella*** Ochyra (Amblystegiaceae)

***Palustriella commutata*** (Hedw.) Ochyra

**SINONIMI:** *Cratoneuron commutatum* (Hedw.) G. Roth; *Cratoneuron commutatum* (Hedw.) G. Roth var. *eucommutatum* Mönk. *nom. illeg.*; *Cratoneuron commutatum* (Hedw.) G. Roth var. *fluctuans* (Schimp.) Wijk & Margad.; *Cratoneuron commutatum* (Hedw.) G. Roth var. *irrigatum* (J.E. Zetterst.) Mönk.; *Hypnum commutatum* Hedw.; *Hypnum commutatum* Hedw. subsp. *irrigatum* (Zetterst.) Boulay; *Hypnum sulcatum* Schimp. *hom. illeg.* var. *subsulcatum* Schimp.; *Hypnum virescens* Boulay

**Piacenza:** Pratogrande di Granere (Razzara 1981) – **Parma:** Berceto (Avetta 1897); Monte Orsaro tra il Lago Santo ed il vertice (Bottini 1914); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980); Monte Bocco (Gerdol & Tomaselli 1988); Tra I Lagoni e il Lago Scuro (Gerdol & Tomaselli 1993); Alta Val Parma e Cedra (Ferrari 2002b) – **Reggio Emilia:** Le Forbici (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); La Sega sopra Civago, Cerreto dell'Alpi (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Cerè Marabino, Mora presso Toano, Roncoesi (Casali 1899b); Lago Cerretano (Bottini 1913); Abetina Reale (Velluti 1993); Alto Appennino reggiano (Ferrari 2002a) – **Modena:** San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881; Fiori 1886); Pian Cavallaro sul Cimone, Montefiorino, Montegibbio, Fontanazzi di San Faustino e di Sant'Agnese presso Modena (Fiori 1886); Sotto il Lago Santo nel Rio delle Tagliole (Bottini 1913); Alta Valle delle Tagliole (Gerdol & Tomaselli 1988) – **Bologna:** Sasso (Cocconi 1881); Alta valle del Dardagna (Credaro et al. 1980); Corno alle Scale (Gerdol & Tomaselli 1988) – **Forlì-Cesena:** Roversano (Del Testa 1903); Casticciano (Zodda 1921); Collina di Civitella (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Monte Casale (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Meldola, Sant'Antonio in Gualdo, Civitella di Romagna, Buggiana, Portico di Romagna, San Benedetto in Alpe, Cabelli, Campigna, Pian delle Fontanelle, Monte Fumaiolo (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sul macigno dei ruscelli (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Nei prati torbosi (Avetta 1897); Lungo i fossi, i rigagnoli e presso le fonti (Casali 1899b); Sulle sponde di un torrente presso una sorgente d'acqua contenente carbonato di calce (Del Testa 1903); Sul macigno, sulle rive torboso di un lago (Bottini 1913); Sul macigno irrigato (Bottini 1914); Sul suolo calcareo, negli acquitrini (Zodda 1921); Terra, lugno ruscelli, acquitrini e stillicidi calcarei (Zangheri 1966b); Calcare sulle sponde di un torrente (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); 1360 m, 1420 m (Bottini 1913); 1600 m (Bottini 1914); 1580-1700m (Credaro et al. 1980); 1480 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1450 m (Velluti 1993); Dal piano ai più alti monti (Casali 1899b)

***Palustriella decipiens*** (De Not.) Ochyra

**SINONIMI:** *Cratoneuron decipiens* (De Not.) Loeske; *Thuidium decipiens* De Not.

**Parma:** Monte Bocco (Gerdol & Tomaselli 1988) – **Reggio Emilia:** Sotto il vertice del Monte Prado (Bottini 1913); Bargetana (Monte Prado) (Gerdol & Tomaselli 1988); Abetina Reale (Velluti 1993); Monte Prado (Velluti 1993; Rossi & Ferrari 1994) – **Modena:** Monte Rondinaio (circo Est) (Gerdol & Tomaselli 1988) – **Bologna:** Corno alle Scale (Gerdol & Tomaselli 1988)

**ECOLOGIA:** Sul macigno bagnato dagli stillicidi (Bottini 1913); Scorza di faggio in un faggeto e suolo lungo

ruscellamenti (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1900 m (Bottini 1913); 1600 m, 1770 m (Velluti 1993)

***Palustriella falcata*** (Brid.) Hedenäs

*SINONIMI*: *Amblystegium falcatum* (Brid.) De Not.; *Cratoneuron commutatum* (Hedw.) G. Roth var. *falcatum* (Brid.) Mönk.; *Cratoneuron commutatum* (Hedw.) G. Roth subsp. *falcatum* (Brid.) Giac.; *Cratoneuron falcatum* Brid.; *Hypnum falcatum* Brid.

**Parma**: Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881); Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Capanna Biancani (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia**: Vertice delle Alpi di Sillano, Vertice delle Alpi di Soraggio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Montevecchio alle sorgenti dell'Ozola, Prati di Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Lago Calamone (Provisi 1938); Bargetana (Monte Prado) (Gerdol & Tomaselli 1988); Monte Prado (Rossi & Ferrari 1994) – **Modena**: Libro Aperto, Monte Spigolino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Pian Cavallaro sul Cimone (Fiori 1886); Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1926) – **Bologna**: Corno alle Scale (Gerdol & Tomaselli 1988) – **Forlì-Cesena**: Monte Fumaiolo (Del Testa 1903) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Negli acquitrini e nei luoghi uliginosi (Fiori 1886; Casali 1899b); Presso le sorgenti sul terreno (Del Testa 1903)

*ALTITUDINE*: A più di 1200 m (Del Testa 1903); 1570 m (Gerdol & Tomaselli 1993); Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b; Del Testa 1903)

*NOTE*: In letteratura esiste anche una segnalazione per l'Appennino tosco-emiliano (Ferrarini 1982) con l'indicazione stazionale generica di "Lagheti e acquitrini dal Passo della Cisa al Passo delle Radici"

***Paraleucobryum*** (Limpr.) Loeske (Dicranaceae)

***Paraleucobryum longifolium*** (Ehrh. ex Hedw.) Loeske

*SINONIMI*: *Dicranum longifolium* Ehrh. ex Hedw.

**Parma**: Lago Verde (Fitzgerald & Bottini 1881); Monte Orsajo, Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Vertice del Giovarello (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Praderena sopra Ospitaletto di Ligonchio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Passo della Cisa (Velluti 1993) – **Modena**: Fra il Rondinajo e il Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Forlì-Cesena**: Giogana dell'Appennino sotto Poggio Scali (Pichi & Bottini 1888)

*ECOLOGIA*: Fra i faggi (Pichi & Bottini 1888); Scorza e radici di faggio in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1560 m, 1590 m (Velluti 1993); Nei boschi ed anche nella regione nuda dell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Philonotis*** Brid. (Bartramiaceae)

***Philonotis caespitosa*** Jur.

**Reggio Emilia**: Monte Prado, Passo della Cisa (Velluti 1993) – **Forlì-Cesena**: Campigna località Burraia (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Lungo un rio (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto e lungo ruscellamenti e arenaria lungo le sponde detritiche di un lago (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1600 m, 1750 m, 1770 m (Velluti 1993)

***Philonotis calcarea*** (Bruch & Schimp.) Schimp.

*SINONIMI*: *Philonotis falcata* Hook.; *Philonotis fontana* (Hedw.) Brid. var. *falcata* (Hook.) Brid.

**Parma**: Rusino (Avetta 1897); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980; Razzara 1981); Monte Bocco (Gerdol & Tomaselli 1988) – **Reggio Emilia**: La Sega sopra Civago, Prati di Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Lago Cerretano (Bottini 1913) – **Modena**: Lago presso Frassinoro, Monte Cantiere di Barigazzo (Fiori 1886); Lago Scaffajolo (Lange 1875; Fitzgerald

& Bottini 1881; Fiori 1886; Farneti 1889 citato in Provasi 1926); Monte Rondinaio (circo Est) (Gerdol & Tomaselli 1988) – **Bologna**: Vallata del Dardagna presso Ca' d'Julio (Farneti 1889); Corno alle Scale (Gerdol & Tomaselli 1988)

*ECOLOGIA*: Sul muro del canale di un mulino (Farneti 1889); Presso uno stillicidio (Avetta 1897); Lungo i ruscelli e presso le sorgenti (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul margine paludoso-torboso di un lago (Bottini 1913)

*ALTITUDINE*: 1800 m (Fiori 1886); 1360 m (Bottini 1913); Dalla regione montana dell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Philonotis fontana*** (Hedw.) Brid.

**Parma**: Monte Orsato, Monte Cajo (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Montevecchio alle sorgenti dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Lago Cerretano (del Barone) (Bertoloni 1859; Fiori 1886; Casali 1899b; Provasi 1938); Bargetana (Monte Prado) (Gerdol & Tomaselli 1988); Monte Prado (Rossi & Ferrari 1994) – **Modena**: Pian Cavallaro sul Cimone, Monte Cantiere di Barigazzo (Fiori 1886); Vallata del Dardagna alla Riva (Farneti 1889); Lago Baccio (Provasi 1926; Raffaelli et al. 1997) – **Bologna**: Cavone del Corno alle Scale (Bertoloni 1844); Corno alle Scale a Baggioledo (Bertoloni 1844; Cocconi 1881); Vallata del Dardagna al Fossone della Nuda e a Rio Piano e alla Riva (Farneti 1889); Corno alle Scale (Gerdol & Tomaselli 1988) – **Forlì-Cesena**: Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Presso le sorgenti ed ai margini dei rii (Bertoloni 1844); Nei ruscelli (Avetta 1897); Lungo i ruscelli e nei luoghi uliginosi (Fiori 1886; Casali 1899b); Roccia calcarea, legno fradicio (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b);

***Philonotis marchica*** (Hedw.) Brid.

**Modena**: Monte Modino di Frassinoro (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: In uno stillicidio (Fiori 1886)

***Philonotis seriata*** Mitt.

*SINONIMI*: *Philonotis seriata* Mitt. var. *falcata* Loeske

**Parma**: Monte Orsaro tra il Lago Santo ed il vertice (Bottini 1914); Prato Spilla (Gerdol & Tomaselli 1988); Circo glaciale di Monte Bocco, Capanna Biancani (Gerdol & Tomaselli 1993); Alta Val Parma e Cedra (Ferrari 2002b) – **Reggio Emilia**: Sotto il vertice del Monte Prado (Bottini 1913); Bargetana (Monte Prado) (Gerdol & Tomaselli 1988); Le Porraie (Gerdol & Tomaselli 1993); Monte Prado (Rossi & Ferrari 1994); Alto Appennino reggiano (Ferrari 2002a) – **Modena**: Sant'Anna Pelago al Fontanone (Bottini 1913); Alta Valle delle Tagliole, Monte Rondinaio (circo Est) (Gerdol & Tomaselli 1988); Prati di San Geminiano (Gerdol & Tomaselli 1993)

*ECOLOGIA*: Negli acquitrini, presso gli stillicidi (Bottini 1913); Sui margini di uno stagno (Bottini 1914)

*ALTITUDINE*: 1550 m, 1600 m, 1900 m (Bottini 1913); 1470 m, 1570 m, 1720 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

***Physcomitrium*** (Brid.) Brid. (Funariaceae)

***Physcomitrium pyriforme*** (Hedw.) Bruch & Schimp.

*SINONIMI*: *Gymnostomum pyriforme* Hedw.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Parma (Avetta 1897)

*ECOLOGIA*: Cresce sopra la terra grassa, nei giardini, nelle ortaglie, nei prati e nei campi umidi (Bracciforti 1877); In un orto (Avetta 1897)

***Plagiomnium*** T.J. Kop. (Mniaceae)

***Plagiomnium affine*** (Blandow ex Funck) T.J. Kop.

*SINONIMI*: *Mnium affine* Blandow ex Funck; *Mnium cuspidatum* Neck. ex Lindb. *hom. illeg.*

**Parma**: Collecchio (Avetta 1897); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980) – **Reggio**

**Emilia:** Prati di Ventasso, Cerreto dell'Alpi (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Pian Vallese (Velluti 1993) – **Bologna:** Vallata del Dardagna a Rio Piano (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Ferrara:** Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Ravenna:** Pineta di San Vitale, Castelraniero (Zangheri 1966b); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** Comero, Cesena alla Villa Almerici (Del Testa 1903); San Savino (Zangheri 1966b) presso Casa Trove (Zodda 1921); Predappio (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Polenta, Campigna, Monte Fumajolo (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
**ECOLOGIA:** Lungo i rigagnoli all'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b); Nei boschi, sugli alberi (Del Testa 1903); In un bosco di castagno (Zodda 1921); Terra, rocce calcaree, ceppi (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto (Velluti 1993); Al suolo (Fariselli 2015)  
**ALTITUDINE:** 1284 m (Velluti 1993)

***Plagiomnium cuspidatum*** (Hedw.) T.J. Kop.

**SINONIMI:** *Mnium cuspidatum* Hedw.

**Reggio Emilia:** Figno presso Scandiano, Valle di Riarbero (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena:** Rio Vallurbana, Dintorni di Fiumalbo (Fiori 1886) – **Bologna:** Bologna a Castiglione (Bertoloni 1859); Madonna dell'Acerò (Bertoloni 1844; Cocconi 1881; Fiori 1886); Barbiano, Monte della Croce, Rio Maggiore (Cocconi 1881); Dintorni di Bologna, Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)  
**ECOLOGIA:** Alveo e boschi lungo un rio (Cocconi 1881); Boschetti lungo un rio (Fiori 1886); Sul terreno nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b)  
**ALTITUDINE:** In collina e montagna (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Plagiomnium elatum*** (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.

**SINONIMI:** *Mnium affine* Blandow ex Funck var. *elatum* Bruch & Schimp.; *Mnium seligeri* Jur.

**Parma:** Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980); Capanne di Badignana, Colla Val di Tacca, fra Passo Paitino e Lago Rocca Pianaccia, Lago Verde (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Prati di Pranda (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena:** Piandelagotti presso il Prato del Morto (Bottini 1914); Lago Baccio, Passo Cento Croci (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Bologna:** Corno alle Scale (Gerdol & Tomaselli 1988); Gessi bolognesi al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)  
**ECOLOGIA:** Sommerso in uno stagno (Bottini 1914); Alla base del tronco di *Quercus pubescens* e su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)  
**ALTITUDINE:** 1300 m (Bottini 1914); 1270 m, 1290 m, 1370 m, 1460 m, 1480 m, 1554 m, 1700 m (Gerdol & Tomaselli 1993)  
**NOTE:** Sulla base della revisione dei campioni d'erbario la segnalazione di Fariselli (2015) è da ritenersi erronea in quanto il campione esaminato corrisponde in realtà a *P. undulatum*

***Plagiomnium ellipticum*** (Brid.) T.J. Kop.

**SINONIMI:** *Mnium rugicum* Laur.

**Reggio Emilia:** Lago Cerretano (Bottini 1913); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) – **Bologna:** Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017)  
**ECOLOGIA:** Sulle rive paludose di un lago (Bottini 1913); Su terreno alla base della dolina (Aleffi & Silenzi 2000)  
**ALTITUDINE:** 1360 m (Bottini 1913)

***Plagiomnium medium*** (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.

**Bologna:** Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017)  
**ECOLOGIA:** Su terreno fangoso lungo il fosso (Aleffi & Silenzi 2000)

***Plagiomnium rostratum*** (Schrad.) T.J. Kop.

*SINONIMI*: *Mnium rostratum* Schrad.

**Reggio Emilia**: Tana della Mussina a Borzano, Monte Vallestro (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) –

**Modena**: Casinalbo, Montese (Fiori 1886) – **Bologna**: Barbiano (Bertoloni 1859 citato in Farneti 1859; Cocconi 1881); Buca della Spipola presso Bologna (Fiori 1886); Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889); Gessi bolognesi a Miserazzano, a Acquafredda, a Siberia, alla Grotta della Spipola, al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Monte della Bicocca a Brisighella (Del Testa 1903) – **Forlì-Cesena**: San Savino (Zangheri 1966b) presso Casa Trove (Zodda 1921); Monte dei Cappuccini, Bertinoro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Rocca San Casciano (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Nei boschi e nei luoghi ombrosi (Fiori 1886; Casali 1899b); In un bosco (Zodda 1921); Sullo sfaticcio della roccia calcarea (Zangheri 1959); Sulla parete di un inghiottitoio, su roccia lungo un fosso, su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: In pianura e in montagna (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Plagiomnium undulatum*** (Hedw.) T.J. Kop. var. *undulatum*

*SINONIMI*: *Mnium undulatum* Hedw.

**Parma**: Collecchio (Avetta 1897); Lago di Monte Caio (Provasi 1938) – **Reggio Emilia**: Mulino della Veggia a Sassuolo, Valle di Riarbero (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: Casinalbo (Fiori 1886) – **Bologna**: Madonna dell'Acero (Bertoloni 1844; Cocconi 1881); Provincia di Bologna (Farneti 1889); Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ferrara**: Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Ravenna**: Pineta di Milano Marittima (inedito) – **Forlì-Cesena**: Colli di Cesena (Del Testa 1903); Santa Sofia (Zodda 1921); Monte Casale (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Seggio (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Predappio, Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Polenta, Colmano, San Giacomo in Meleto, Monte Ajola, Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Nei boschi e lungo le rive (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul terreno nei luoghi ombreggiati (Del Testa 1903); Nei boschi (Zodda 1921) di abete (Zodda 1921); Terra (Zangheri 1966b); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: A circa 500 m (Zodda 1921); Fino alla regione del faggio (Farneti 1889); Dal piano agli alti monti (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Plagiopus*** Brid. (Bartramiaceae)

***Plagiopus oederianus*** (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson var. *oederianus*

*SINONIMI*: *Plagiopus oederi* (Brid.) Limpr.; *Bartramia oederi* Brid.

**Parma**: Sopra il Lago Palo, Lago Ballano (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Monte Vallestro (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b) – **Modena**: Sopra il Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Santo, Montese (Fiori 1886) – **Bologna**: Madonna dell'Acero (Bertoloni 1844; Cocconi 1881; Fiori 1886) – **Forlì-Cesena**: Pian delle Fontanelle (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Dirupi (Fiori 1886); Sulle rupi nelle fessure ombrose (Fiori 1886; Casali 1899b); Sponde ruscelli (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Plagiothecium*** Bruch & Schimp. (Plagiotheciaceae)

***Plagiothecium cavifolium*** (Brid.) Z. Iwats.

*SINONIMI*: *Plagiothecium roeseanum* Schimp.

**Reggio Emilia:** Pian Vallese, Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena:** Le Radici al principio della via per San Pellegrino (Bottini 1913) – **Forlì-Cesena:** Passo Incisa, Monte Fumaiolo (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA:* Sulla terra sotto i faggi (Bottini 1913); Terreno (Zangheri 1966b); Suolo e scorza di faggio in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE:* 1540 m (Bottini 1913); 1284 m, 1550 m (Velluti 1993)

***Plagiothecium denticulatum*** (Hedw.) Schimp. var. *denticulatum*

*SINONIMI:* *Hypnum denticulatum* L.; *Plagiothecium denticulatum* (Hedw.) Schimp. var. *densum* Schimp.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Lago Santo, Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Valle dell'Ozola, Lago Cerretano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Monte Ravino, Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Bologna:** Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889)

*ECOLOGIA:* Cresce nei boschi ombrosi, a piè degli alberi e sulle loro radici (Bracciforti 1877); Faggete sulla terra (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Sopra legno putrido nei castagneti (Farneti 1889); Sulla terra e sui tronchi putridi nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Suolo in un faggeto e in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE:* 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1400 m, 1460 m, 2050 m (Velluti 1993); Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Plagiothecium denticulatum*** (Hedw.) Schimp. var. *undulatum* R. Ruthe ex Geh.

**Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)

***Plagiothecium laetum*** Schimp.

**Reggio Emilia:** Passo della Cisa (Velluti 1993) – **Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA:* Suolo in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE:* 1600 m (Velluti 1993)

***Plagiothecium nemorale*** (Mitt.) A. Jaeger

*SINONIMI:* *Hypnum silvaticum* L.; *Plagiothecium sylvaticum* (Brid.) B.S.G.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Forlì-Cesena:** Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA:* Nei boschi (Bracciforti 1877); Arenaria calcarea (Zangheri 1966b)

***Plagiothecium platyphyllum*** Moenk.

**Reggio Emilia:** Monte Ravino (Velluti 1993)

*ECOLOGIA:* Tronco di faggio morto in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE:* 1400 m (Velluti 1993)

***Plagiothecium succulentum*** (Wilson) Lindb.

**Reggio Emilia:** Monte Cusna (Velluti 1993) – **Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA:* Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE:* 1990 m (Velluti 1993)

***Plagiothecium undulatum*** (Hedw.) Schimp.

*SINONIMI:* *Hypnum undulatum* Hedw.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877)

*ECOLOGIA:* A piè degli alberi dei boschi montuosi (Bracciforti 1877)

***Plasteurhynchium*** Broth. (Brachytheciaceae)

***Plasteurhynchium meridionale*** (Schimp.) M. Fleisch.

**SINONIMI:** *Eurhynchium meridionale* (Schimp.) De Not.; *Eurhynchium striatum* (Hedw.) Schimp. subsp. *meridionale* (Schimp.) J.J. Amann

**Parma:** Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Forlì-Cesena:** Poggio Appennino presso Civitella (Zodda 1921); San Savino (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**Ecologia:** Nei boschi di castagno e di querce (Zodda 1921); Terreno (Zangheri 1966b)

**ALTITUDINE:** 1000 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Plasteurhynchium striatulum*** (Spruce) M. Fleisch.

**SINONIMI:** *Eurhynchium striatulum* (Spruce) Schimp.; *Isothecium filescens* (Brid.) Moenk.; *Rhynchostegium striatulum* (Spruce) De Not.

**Reggio Emilia:** Monte del Gesso a Scandiano (Fiori 1892b citato in Casali 1899b) – **Modena:** Serpentini di Varana (Fiori 1892b) – **Bologna:** Gessi bolognesi a Acquafredda e al Buco dei Vinchi (Aleffi & Silenzi 2000) – **Ravenna:** Sasso (Zangheri 1959); Rivola, Monte Mauro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Ca' di Sasso, a Borgo Rivola e a Sasso (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Rimini:** Rimini (Del Testa 1903)

**ECOLOGIA:** Sulla roccia gessifera, sui gessi e lo sfaticcio (Zangheri 1959); Terreno e roccia gessosa (Zangheri 1966b); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000); Su *Pinus pinaster* e al suolo (Fariselli 2015)

**NOTE:** Vanno ricondotte a questa specie le segnalazioni di Fiori (1886) relative a *Eurhynchium* (= *Cirriphyllum*) *crassinervium* (Fiori 1892b)

***Platygyrium*** Bruch & Schimp. (Pylaisiadelphaceae)

***Platygyrium repens*** (Brid.) Schimp.

**Forlì-Cesena:** Campigna località Burraia (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Ceppi (Zangheri 1966b)

***Pleuridium*** Rabenh. (Ditrichaceae)

***Pleuridium subulatum*** (Hedw.) Rabenh.

**SINONIMI:** *Pleuridium alternifolium* auct.; *Pleuridium alternifolium* Dicks.

**Parma:** Collecchio, Noceto (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Forlì-Cesena:** Colli di Cesena (Del Testa 1903); San Varano, Scardavilla (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Arenarie (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); In terra nei boschi (Avetta 1897); Sul terreno sulla radura dei boschi (Del Testa 1903); Terreno (Zangheri 1966b) di querceto (Zangheri 1966b)

**NOTE:** La segnalazione di San Varano è dubbia

***Pleurozium*** Mitt. (Hylocomiaceae)

***Pleurozium schreberi*** (Willd. ex Brid.) Mitt.

**SINONIMI:** *Hylocomium schreberi* Willd. ex Brid.; *Hypnum parietinum* L. ex Wahlenb. *hom. illeg.*; *Hypnum schreberi* Willd. ex Brid.

**Parma:** Appennino di Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago di Monte Caio (Provasi 1938) – **Reggio Emilia:** Monte Ventasso sotto la cimetta di Santa Maria Maddalena (Re 1798 citato in Casali 1899b); Monte Prado, Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** Rondinajo, Lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Pian Cavallaro sul Cimone (Fiori 1886) – **Ravenna:** Castelraniero (Del Testa 1903)

**ECOLOGIA:** Suolo in un vaccinieto e in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1800 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1770 m, 1870 m, 1920 m, 1960 m, 1990 m (Velluti 1993)

*Pogonatum* P. Beauv. (Polytrichaceae)

*Pogonatum aloides* (Hedw.) P. Beauv.

**Parma**: Collecchio, La Cisa (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Appennino di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Civago (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Ravino, Abetina Reale, Monte Prado (Velluti 1993) – **Modena**: Da Fiumalbo salendo il Cimone (Fiori 1886) – **Bologna**: Ronzano (Bertoloni 1859 citato in Farneti 1859; Cocconi 1881); Vallata del Dardagna a Ca' de' Gabrielli (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena**: Giogana dell'Appennino passato Poggio Scali (Pichi & Bottini 1888); Comero (Del Testa 1903); Passo dei Mandrioli (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sulla terra (Pichi & Bottini 1888); Sulla terra nuda nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Nei boschi di faggi (Avetta 1897; Del Testa 1903); Terreno (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto e in una prateria discontinua di crinale, scorza di faggio in un faggeto, arenaria lungo le sponde di un torrente (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1300 m (Pichi & Bottini 1888); 1500 m, 1550 m, 1980 m, 2020 m (Velluti 1993); Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Pogonatum nanum* (Hedw.) P. Beauv.

**Parma**: Collecchio, Noceto (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Vetto, Ramiseto (Casali 1899a; Casali 1899b)  
*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO*: Provincia di Parma, Serie I Fascicolo XXIX 403 (1403), Passerini 1866

*ECOLOGIA*: In terra sui margini dei boschi (Avetta 1897); Sul terreno presso i boschi (Casali 1899a; Casali 1899b)

*Pogonatum urnigerum* (Hedw.) P. Beauv.

**Parma**: Monte Gotro (Bertoloni 1859 citato in Fitzgerald & Bottini 1881); Monte Orsajo, Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Santo, Rondebocco, Bosco di Corniglio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Foce delle Radici (Fiori 1886); Civago, Valle dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Praderena, Alpe di Mommio, Monte Casarola (Casali 1899b); Pian Vallese, Monte Cusna, Passo della Cisa, Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena**: San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Pian Cavallaro sul Cimone (Fiori 1886) – **Bologna**: Campi di Lustrola (Bertoloni 1865) sotto la vetta del Granaglione (Cocconi 1881); Monte della Croce (Cocconi 1881); Corno alle Scale (Cocconi 1881); Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Vallata del Dardagna alla Nuda di Vidicciattico (Farneti 1889) – **Ravenna**: Castelraniero (Del Testa 1903) – **Forlì-Cesena**: Giogana dell'Appennino passato Poggio Scali (Pichi & Bottini 1888); Collina di Civitella, Campigna, Passo della Calla (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Nei boschi alti, cresce sulla base de' tronchi e sulla terra che li attornia (Bertoloni 1865); Sulla terra (Pichi & Bottini 1888); Terreno del macigno (Farneti 1889); Nei pascoli e boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Terreno (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto, lungo le sponde di un torrente e in una prateria al limite del bosco (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1300 m (Pichi & Bottini 1888); 1284 m, 1470 m, 1590 m, 1750 m, 1800 m (Velluti 1993); Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Poblia* Hedw. (Mniaceae)

*Poblia annotina* (Hedw.) Lindb.

*SINONIMI*: *Webera annotina* (Hedw.) Bruch in Schwägr.

**Reggio Emilia**: Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena**: Lungo la fossa a Spezzano (Fiori 1892b); Lungo la Secchia a Sassuolo (Fiori 1892b citato in Casali 1899b) – **Bologna**: Bologna nel giardino Margherita (Fiori



1892b)

**ECOLOGIA:** Lungo un torrentello (Fiori 1892b); Sulle sabbie dei nostri fiumi (Fiori 1892b; Casali 1899b); Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 2000 m (Velluti 1993)

**NOTE:** La segnalazione di Fiori "Lungo la Secchia a Sassuolo" non è ben chiaro se sia da attribuirsi alla parte modenese o reggiana; Casali la cita per il Reggiano

***Poblia atropurpurea*** (Wahlenb.) Lindb.

**SINONIMI:** *Bryum atropurpureum* (Wahlenb.) Wahlenb.

**Bologna:** Gessi bolognesi (Cobau 1932) – **Ravenna:** Faenza (Del Testa 1903)

**ECOLOGIA:** Sui ruderi di un vecchio ponte e fra il selciato della stazione ferroviaria (Del Testa 1903)

***Poblia cruda*** (Hedw.) Lindb.

**SINONIMI:** *Webera cruda* (Hedw.) Fürnr.

**Parma:** Monte Cajo (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Ospitaletto di Ligonchio, Pietra di Bismantova (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Alpe di Mommio, Monte Casarola (Casali 1899b); Lago Cerretano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b; Provasi 1938); Passo della Cisa, Monte Prado, Monte Ravino, Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Monte Cantiere di Barigazzo, Cimone, Montese (Fiori 1886) – **Bologna:** Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Vallata del Dardagna al Monte Grande (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena:** Pian delle Fontanelle (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sui faggi abbattuti, nei pascoli (Casali 1899b); Lungo i ruscelli (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto, in una prateria discontinua di crinale e in una prateria al limite del bosco, scorza e radici di faggio in un faggeto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1550 m, 1560 m, 1590 m, 1750 m, 1950 m, 2000 m, 2050 m (Velluti 1993)

***Poblia drummondii*** (Müll. Hal.) A.L. Andrews

**SINONIMI:** *Webera commutata* Schimp.

**Reggio Emilia:** Vertice della Alpi di Soraggio, alla Lama della Lite (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Monte Prado (Tomaselli 1991; Rossi & Ferrari 1994); Alto Appennino reggiano (Ferrari 2002a) – **Modena:** Monte Giovo (Bassi 2007) – **Emilia:** Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991)

**ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO:** Provincia di Reggio Emilia, Serie II Fascicolo XXV 1218, Bottini 1882

**ECOLOGIA:** Sulla terra uliginosa (Fitzgerald & Bottini 1881)

**ALTITUDINE:** 1750 m (Fitzgerald & Bottini 1881)

**NOTE:** Le segnalazioni di Fitzgerald & Bottini di *Webera commutata* sono citate da Fiori (1886) e da Casali (1899b) in modo non corretto in quanto da questi ultimi la specie è indicata come *W. commutata* var. *gracilis* che corrisponde a *Poblia filum* e non a *P. drummondii*

***Poblia elongata*** Hedw. var. *elongata*

**Reggio Emilia:** Passo della Cisa, Monte Ravino, Monte Cusna, Monte Prado (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Suolo in un faggeto e in un vaccinieto, arenaria in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1470 m, 1500 m, 1780 m, 2030 m (Velluti 1993)

***Poblia elongata*** Hedw. var. *greeni* (Brid.) A.J. Shaw

**SINONIMI:** *Webera polymorpha* Hoppe & Hornsch.

**Parma:** Sopra il Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Modena:** Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881; Fiori 1886); Tra San Pellegrino ed il lago Santo (Fiori 1886)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Poblia filum*** (Schimp.) Martensson

*SINONIMI*: *Poblia gracilis* (Bruch & Schimp.) Lindb. *hom. illeg.*; *Webera commutata* Schimp. var. *gracilis* (Bruch & Schimp.) Schimp.; *Webera gracilis* (Bruch & Schimp.) De Not.

**Reggio Emilia**: Monte Cusna/Monte Prado (Tomaselli 1991) – **Modena**: Sopra il Lago Santo (Fiori 1886) – **Forlì-Cesena**: Ladino (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: In luogo da poco abbandonato dalla neve (Fiori 1886); Terra umida (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 1750 m (Fiori 1886; Casali 1899b)

*NOTE*: La segnalazione di Ladino è dubbia.

***Poblia ludwigii*** (Spreng. ex Schwägr.) Broth.

**Reggio Emilia**: Monte Cusna/Monte Prado (Tomaselli 1991); Monte Prado (Rossi & Ferrari 1994); Alto Appennino reggiano (Ferrari 2002a)

***Poblia melanodon*** (Brid.) A.J. Shaw

*SINONIMI*: *Mniobryum carneum* (F. Weber & D. Mohr) Limpr. *nom. illeg. incl. spec. prior.*; *Webera carnea* Schimp.

**Parma**: Monte Prinzera (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Tana della Muscina a Borzano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Acquabona, Roncocesi, Villa Ospizio (Casali 1899b) – **Modena**: Casinalbo, Fontanazzi di villa Cognento presso Modena, Fontanazzi di San Faustino presso Modena (Fiori 1886) – **Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Colli di Cesena (Del Testa 1903); Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Carpena (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Polenta (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Presso una fontana (Avetta 1897); Rive dei fossi e dei canali, sulla terra acquitrinosa (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul terreno umido e sul margine dei fossi (Del Testa 1903); Terra, suolo umido e stillicidi calcarei (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: In pianura e collina (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Poblia nutans*** (Hedw.) Lindb.

*SINONIMI*: *Webera nutans* Hedw.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Alpi di Soraggio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Lago di Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Alpe di Succiso (Avetta 1897 citato in Casali 1899b); Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Lago Calamone (Provasi 1938) – **Modena**: Monte San Pellegrino, Cantiere di Barigazzo, Lago Santo (Fiori 1886); Fiume Panaro a Sant'Anna presso Modena (Fiori 1892b) – **Bologna**: Corno alle Scale (Fiori 1886); Vallata del Dardagna al Cavone del Corno alle Scale (Farneti 1889)

*ECOLOGIA*: Sul terreno e sugli alberi putridi nei boschi e nei pascoli (Casali 1899b)

*ALTITUDINE*: 1750 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Nei boschi ed anche nella parte nuda dell'Appennino (Casali 1899b)

***Poblia wahlenbergii*** (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews var. *wahlenbergii*

*SINONIMI*: *Mniobryum albicans* (Wahlenb.) Limpr. *nom. illeg. incl. spec. prior.*; *Webera albicans* (Wahlenb.) Schimp.

**Reggio Emilia**: Sopra Ligonchio (Fiori 1892b citato in Casali 1899b) – **Modena**: Tra San Pellegrino ed il Lago Santo (Fiori 1886) – **Bologna**: Vallata del Dardagna a Rio Piano (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Romiti (Forlì), Scardavilla, Monte Aiola (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sui sassi lungo i rigagnoli nell'Appennino (Fiori 1886); Terra, incrostazioni calcaree (Zangheri 1966b)

***Poblia wahlenbergii*** (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews var. ***glacialis*** (Brid.) E.F. Warb.

**SINONIMI:** *Webera albicans* (Wahlenb.) Schimp. var. *glacialis* (Brid.) Schimp.

**Modena:** Monte Spigolino (Fitzgerald & Bottini 1881)

**ALTITUDINE:** 1750 m (Fitzgerald & Bottini 1881)

***Polytrichastrum*** G.L. Sm. (Polytrichaceae)

***Polytrichastrum alpinum*** (Hedw.) G.L. Sm.

**SINONIMI:** *Polytrichum alpinum* Hedw.; *Pogonatum alpinum* (Hedw.) Röhl.

**Reggio Emilia:** Monte Ventasso alla selva del Pizzetto (Re 1798 citato in Casali 1899b); Alpi di Mommio, Montevecchio alle sorgenti dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Ravino, Monte Prado, Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** Lago Scaffajolo (Bertoloni 1859 citato in Fitzgerald & Bottini 1881 in Fiori 1886 e in Farneti 1889); Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); San Pellegrino, Libro Aperto (Fiori 1886); Lago di Pratignano (Ferrari et al. 1981) – **Bologna:** Corno alle Scale (Bertoloni 1859 citato in Fitzgerald & Bottini 1881 in Fiori 1886 e in Farneti 1889; Cocconi 1881); Madonna dell'Acero (Fiori 1886); Vallata del Dardagna al monte Fabuino e al Cavone del Corno alle Scale (Farneti 1889) – **Emilia:** Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991) – **Forlì-Cesena:** Giogana dell'Appennino passato Poggio Scali (Pichi & Bottini 1888); Fumaiolo (Del Testa 1903); Poggio Martino (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Nei pascoli dell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b); Nei boschi (Del Testa 1903); Sulla terra (Pichi & Bottini 1888; Zangheri 1966b); Scorza di faggio in un faggeto, suolo in un vaccinieto, in una prateria discontinua di crinale e lungo ruscellamenti (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1300 m (Pichi & Bottini 1888; Del Testa 1903); 1550 m, 1770 m, 1870 m, 1920 m, 1990 m (Velluti 1993); Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Polytrichastrum sexangulare*** (Brid.) G.L. Sm.

**SINONIMI:** *Polytrichum sexangulare* Flörke ex Brid.

**Reggio Emilia:** Monte Cusna/Monte Prado (Tomaselli 1991) – **Modena:** Monte Giovo (Tomaselli et al. 1994; Bassi 2007) – **Emilia:** Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991)

***Polytrichum*** Hedw. (Polytrichaceae)

***Polytrichum commune*** Hedw.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Collecchio, Sala Baganza, Monte Molinatico (Avetta 1897); Capanne Badignana, Pozza di Badignana, tra I Lagoni e il Lago Scuro, Passo del Fugicchio, fra Passo Paitino e Lago Rocca Pianaccia, Sopra il Lago Verde (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Lago Gonella, Paduletta di Sillano, Le Porraie, Monte Vecchio versante Nord, Monte La Piella versante Nord (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena:** Vallata del Dardagna al Lago Pratignana (Farneti 1889 citato in Fiori 1892b e in Provasi 1926); Lagacci di Monte Albano, Lagacci della Porticciola, Circo glaciale di Monte (Lago) Turchino, Pian Cavallaro sul Cimone, Colle Acquamarzia, Monte Spigolino versante Nord (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Bologna:** Corno alle Scale (Bertoloni 1844); Alta valle del Dardagna (Credaro et al. 1980) – **Ravenna:** Castelraniero (Zangheri 1966b) – **Forlì-Cesena:** Campigna tra La Calla e le Cullacce e a La Mandria (Sanesi 1962); Campigna località Burraia (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Nei boschi, negli scopeti, nei luoghi umidi, torbosi (Bracciforti 1877); Nei boschi (Avetta 1897) di faggio (Avetta 1897); Terreno di bosco (Zangheri 1966b); Al suolo e su rocce umide nei boschi e nelle brughiere (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1500-1700 m (Credaro et al. 1980); 1480 m, 1489 m, 1510 m, 1550 m, 1560 m, 1584 m, 1600 m, 1630 m, 1650 m, 1600-1660 m, 1660 m, 1700 m, 1720 m, 1780 m, 1840 m, 1870 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

*Polytrichum formosum* Hedw.

**Parma:** Passo della Cisa, Passo del Fugicchio (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Cerreto dell'Alpi (Fiori 1886; Casali 1899b); Montemiscoso (Casali 1899b); Passo della Cisa, Abetina Reale, Monte Cusna, Monte Prado (Velluti 1993) – **Modena:** Rocca Malatina (Fiori 1886) – **Bologna:** Ronzano (Bertoloni 1859; Cocconi 1881); Sasso (Bertoloni 1859 citato in Farneti 1889; Cocconi 1881); Monte Granaglione sopra Porretta (Fiori 1886); Dintorni di Bologna, Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Castelraniero (Bertoloni 1859; Del Testa 1903) – **Forlì-Cesena:** Colline di Cesena (Del Testa 1903); Campigna, Piancancelli (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Nei boschi, castagneti (Fiori 1886); Al piede degli alberi nei boschi (Del Testa 1903); Terreno, ceppi (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto e in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1107 m, 1650 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1500 m, 1600 m, 1900 m, 1910 m, 1990 m, 2050 m (Velluti 1993); Dai colli sino agli Appennini (Fiori 1886)

*Polytrichum juniperinum* Hedw.

**Reggio Emilia:** Valle dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Abetina Reale, Monte Cusna, Monte Ravino, Passo della Cisa (Velluti 1993); Monte Prado (Tomaselli 1991; Velluti 1993; Rossi & Ferrari 1994) – **Modena:** Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Fignola a Barigazzo, Pian Cavallaro sul Cimone, Libro Aperto (Fiori 1886) – **Bologna:** Corno alle Scale (Bertoloni 1844; Bertoloni 1859 citato in Fitzgerald & Bottini 1881 in Fiori 1886 e in Farneti 1889; Cocconi 1881); Santuario dell'Acerò (Fiori 1886); Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889) – **Emilia:** Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991) – **Forlì-Cesena:** Comero (Bertoloni 1859; Lange 1875); Fumaiolo (Lange 1875); Passato Poggio Scali (Pichi & Bottini 1888); Scardavilla, Campigna località Burraia, Campigna, Poggio Martino, Monte Falco (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Terreno, margini faggete (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto, in un vacciniato, in una prateria al limite del bosco e in una prateria discontinua di crinale, arenaria lungo le sponde di un torrente (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1550 m, 1600 m, 1650 m, 1750 m, 1770 m, 1780 m, 1990 m, 2000 m (Velluti 1993)

*Polytrichum piliferum* Hedw.

**SINONIMI:** *Polytrichum piliferum* Hedw. var. *hoppei* (Hornsch.) Rabenh.

**Parma:** Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Civago, Valle di Riarbero (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Monte Ravino, Monte Cusna, Abetina Reale (Velluti 1993); Monte Prado (Tomaselli 1991; Velluti 1993; Rossi & Ferrari 1994) – **Modena:** Rondinajo, Lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); San Pellegrino, Cimone (Fiori 1886) – **Bologna:** Monte Granaglione (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Toccaciolo (Cocconi 1881); Santuario dell'Acerò (Fiori 1886) – **Emilia:** Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991) – **Forlì-Cesena:** Comero (Del Testa 1903); Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Castagneti, sulla terra alla base dei tronchi (Bertoloni 1865); Nei boschi e pascoli (Fiori 1886; Casali 1899b); Suolo in un faggeto, in un vacciniato e in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1550 m, 1820 m, 1950 m, 2020 m, 2050 m (Velluti 1993); In Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Polytrichum strictum* Menzies ex Brid.

**Parma:** Monte Orsajo, Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Passo della Cisa, Padule del Braiola (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Abetina Reale (Velluti 1993) – **Modena:** San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago di Pratignano (Gerdol & Tomaselli 1993; Tomaselli et al. 1994)

**ECOLOGIA:** Nei luoghi uliginosi (Fiori 1886; Casali 1899b); Suolo in un vacciniato (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1107 m, 1307 m, 1574 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1820 m (Velluti 1993)

***Pottiopsis*** Blockeel & A.J.E. Sm. (Pottiaceae)

***Pottiopsis caespitosa*** (Bruch ex Brid.) Blockeel & A.J.E. Sm.

**SINONIMI:** *Pottia caespitosa* (Bruch ex Brid.) Müll. Hal.; *Trichostomum triumphans* De Not.; *Trichostomum triumphans* De Not. var. *pallidisetum* (H. Müll.) Husn.

**Modena:** Montegibbio (Fiori 1886) – **Ravenna:** Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Borgo Rivola e a Sasso (inedito)

**ECOLOGIA:** Sul terreno nei boschetti di pini (Fiori 1886); Gessi (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

***Pseudephemerum*** (Lindb.) I. Hagen (Dicranaceae)

***Pseudephemerum nitidum*** (Hedw.) Loeske

**SINONIMI:** *Phascum nitidum* Hedw.; *Pleuridium nitidum* (Hedw.) Rabenh.

**Parma:** Berceto (Avetta 1897) – **Ravenna:** Pinete di Ravenna (Zangheri 1925)

**ECOLOGIA:** Sopra terreno argilloso (Avetta 1897)

***Pseudoamblystegium*** Vanderp. & Hedenäs (Amblystegiaceae)

***Pseudoamblystegium subtile*** (Hedw.) Vanderp. & Hedenäs

**SINONIMI:** *Amblystegiella subtilis* (Hedw.) Loeske; *Amblystegium subtile* (Hedw.) Schimp.

**Parma:** Monte Gotro (Fitzgerald & Bottini 1881); Orto Botanico di Parma (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e Casali 1899b) – **Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Ladino (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Sulla sponda di una vasca (Avetta 1897); Ceppi (Zangheri 1966b)

***Pseudocrossidium*** R.S. Williams (Pottiaceae)

***Pseudocrossidium hornschurchianum*** (Schultz) R.H. Zander

**Reggio Emilia:** Monte Prado (Velluti 1993) – **Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017)

**ECOLOGIA:** Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1950 (Velluti 1993)

***Pseudocrossidium revolutum*** (Brid.) R.H. Zander

**SINONIMI:** *Barbula revoluta* (Schrad.) Brid.

**Bologna:** Rocca di Babalo nel Bolognese (Fiori 1886); Bologna a Casaglia (Farneti 1889) – **Ravenna:** Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena:** Casticciano (Zodda 1921); Monte dei Cappuccini di Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Monte Casale (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Sui gessi (Farneti 1889); Sul calcare, sui gessi (Zangheri 1959)

**ALTITUDINE:** 200 m (Zodda 1921)

***Pseudoleskeella*** Kindb. (Leskeaceae)

***Pseudoleskeella catenulata*** (Brid. ex Schrad.) Kindb.

**Bologna:** Gessi bolognesi alla Grotta della Spipola (Aleffi & Silenzi 2000) – **Forlì-Cesena:** Campigna, Campigna località Burraia (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Legno fradicio, corteccia di *Fagus sylvatica* (Zangheri 1966b); Su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

***Pseudoleskeella nervosa*** (Brid.) Nyholm

*SINONIMI*: *Leskea nervosa* (Brid.) Myrin

**Reggio Emilia**: Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Abetina Reale (Velluti 1993) – **Modena**: San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Santo (Fiori 1886) – **Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Rimini**: SIC Onferno (Aleffi et al. 2014)

*ECOLOGIA*: Sui sassi (Fiori 1886); Scorza di faggio in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1600 m (Velluti 1993)

***Pseudoleskeella tectorum*** (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth.

**Forli-Cesena**: Monte Fumajolo (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Ceppi di *Fagus sylvatica* (Zangheri 1966b)

***Pseudoscleropodium*** (Limpr.) M. Fleisch. (Brachytheciaceae)

***Pseudoscleropodium purum*** (Hedw.) M. Fleisch.

*SINONIMI*: *Hylocomium purum* (Hedw.) De Not.; *Hypnum purum* L.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Collecchio (Avetta 1897); Passo della Cappelletta (Razzra 1980; Sburlino et al. 1980) – **Reggio Emilia**: Colli di San Valentino (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Modena**: Montegibbio, Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena, Castelvetro (Fiori 1886) – **Bologna**: Bologna a Beverara e a Gaibola (Farneti 1889); Gessi bolognesi a Acquafredda e al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) – **Ferrara**: Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Ravenna**: Pineta di Classe, Pineta di Cervia (Del Testa 1903; Zangheri 1966b); Sasso (Zangheri 1959); Sassatello, Pineta di San Vitale (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Sasso (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forli-Cesena**: Comero, Colli di Cesena, Cesena (Del Testa 1903); Poggio Appennino presso Civitella (Zodda 1921); Scardavilla (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959); Campigna a La Mandria (Sanesi 1962); Predappio, Ricò (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Ladino, Polenta; San Savino, Collina di Civitella (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO*: Provincia di Parma, Serie II Fascicolo XIV 651, Passerini s.d.

*ECOLOGIA*: Cresce in terra, nei boschi cedui, nei luoghi di pastura ecc. (Bracciforti 1877); Nei boschi (Farneti 1889); Nei boschi in terra (Avetta 1897); Sul terreno nei boschi e lungo le rive in pianura e in montagna (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul terreno nei luoghi ombreggiati, castagneti, argini della ferrovia (Del Testa 1903); In un bosco di querce, in un bosco di castagno (Zodda 1921); Sul terriccio calcareo, sullo sfaticcio gessoso (Zangheri 1959); Terreno boschi ecc., ceppi (Zangheri 1966b); Su terreno, su terreno fangoso lungo un fosso (Aleffi & Silenzi 2000); Al suolo (Fariselli 2015)

*ALTITUDINE*: In pianura e in montagna (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Pseudotaxiphyllum*** Z. Iwats. (Hypnaceae)

***Pseudotaxiphyllum elegans*** (Brid.) Z. Iwats.

**Bologna**: Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000)

*ECOLOGIA*: Su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

***Pterigynandrum*** Hedw. (Pterigynandraceae)

***Pterigynandrum filiforme*** Hedw. var. *filiforme*

**Parma**: Monte Orsajo, Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Civago (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Passo della Cisa, Pian Vallese, Abetina Reale, Monte Ravino

(Velluti 1993) – **Modena**: San Pellegrino, Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Provasi 1926); Monte Modino di Frassinoro (Fiori 1886); Vallata del Dardagna Monte Capelbuso (Farneti 1889) – **Bologna**: Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Vallata del Dardagna al Cason di Michelino nella Riva, al Monte Grande, al Monte Fabuino, al Monte Capelbuso e a Rio Piano (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena**: Campigna, Monte Fumaiolo (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO*: Provincia di Parma, Serie II Fascicolo V 207, Passerini 1867  
*ECOLOGIA*: Al piede dei castagni, sui faggi (Farneti 1889); Sopra gli alberi ed i sassi nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Terreno, ceppi, cortecce (Zangheri 1966b); Suolo, scorza e radici di faggio, tronco di faggio morto, arenaria e microconglomerato in un faggeto (Velluti 1993)  
*ALTITUDINE*: 600 m (Farneti 1889); 1250 m, 1284 m, 1390 m, 1400 m, 1420 m, 1460 m, 1500 m, 1550 m, 1560 m, 1600 m (Velluti 1993); Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Pterygoneurum* Jur. (Pottiaceae)

*Pterygoneurum lamellatum* (Lindb.) Jur.

*SINONIMI*: *Barbula lamellata* (Lindb.) Müll. Hal.

**Modena**: Via Giardini presso Modena (Venturi 1886); Colli modenese (Venturi 1899) – **Emilia**: Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950)

*ECOLOGIA*: Ne' colli sui muri (Venturi 1886)

*NOTE*: Per le due segnalazioni di Venturi si vedano le note della specie successiva

*Pterygoneurum ovatum* (Hedw.) Dixon

*SINONIMI*: *Barbula cavifolia* Schimp.; *Gymnostomum ovatum* Hedw.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Modena**: Lungo la via Giardini tra Formigine e Maranello (Fiori 1886) – **Emilia**: Modenese/Reggiano (Fiori 1884)

*ECOLOGIA*: Nei fossati e sui muri fatti a secco o con terra (Bracciforti 1877); Sui muri (Fiori 1886)

*NOTE*: La segnalazione di Fiori (1886) è relativa a *Barbula cavifolia* (= *Pterygoneurum ovatum*) ma l'autore nella pubblicazione indica come sinonimo della specie *Barbula lamellata* che invece corrisponde a *Pterygoneurum lamellatum*. È come *Barbula lamellata* che la segnalazione compare in Venturi (1886), pubblicazione tra l'altro citata in Fiori (1886), e a cui con tutta probabilità si riferisce anche la segnalazione sempre di Venturi del 1899. La confusione è forse dovuta al lavoro di Schimper (1876) che riporta questa sinonimia errata. Non è quindi chiaro a quale delle due specie si riferisca la segnalazione. La località della pubblicazione di Fiori del 1884 corrisponde quasi certamente a quella del 1886

*Ptychostomum* Hornsch. (Bryaceae)

*Ptychostomum boreale* (F. Weber & D. Mohr) Ochyra & Bednarek-Ochyra

*SINONIMI*: *Bryum pallescens* Schleich. ex Schwägr.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: La Sega sopra Civago, Lago di Ventasso, Cerreto dell'Alpi presso la Sega (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Montemiscoso, Nismozza (Casali 1899b) – **Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Nei boschi e nei pascoli (Fiori 1886; Casali 1899b); Sui gessi (Zangheri 1959); Roccia gessifera, ceppi (Zangheri 1966b); Al suolo (Fariselli 2015)

*ALTITUDINE*: 1500 m, 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); In Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b);

*NOTE*: In letteratura esistono due segnalazioni per *Bryum inclinatum* (Brid.) Turton (= *Ptychostomum*

*archangelicum* (Bruch & Schimp.) J.R. Spence), la prima ad opera di Fiori (1886) per il toponimo “Valle delle Pozze” che, come si è spiegato, è stato escluso da questo elenco, e la seconda da parte di Venturi (1886) per l’Appennino modenese ma che con tutta probabilità è la medesima citata da Fiori

***Ptychostomum capillare*** (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen

**SINONIMI:** *Bryum capillare* Hedw.; *Bryum capillare* Hedw. var. *macrocarpum* Huebener; *Bryum capillare* Hedw. var. *meridionale* Schimp.; *Bryum capillare* Hedw. subsp. *ovoideum* Podp.; *Bryum capillare* Hedw. var. *platyloma* (Schwägr.) Schimp.; *Bryum capillare* Hedw. var. *subobconicum* De Not.; *Bryum sydowii* Podp.; *Mnium capillare* (Hedw.) With.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Noceto, Collecchio, Berceto (Avetta 1897); Ottagono della Villetta (Bouvet 2008) – **Reggio Emilia:** Monte Ventasso alla selva del Pizzetto (Re 1798 citato in Casali 1899b); La Veggia presso Sassuolo, Cerreto dell’Alpi presso la Sega, Civago (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Cerè Marabino, Cervarezza, Salvarano, Villa San Pellegrino (Casali 1899b); Passo della Cisa, Monte Ravino (Velluti 1993); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Modena:** Casinalbo, Cimone, Montefiorino (Fiori 1886); Montese (Fiori 1886 citato in Podpera 1903); Sassuolo (Podpera 1903) – **Bologna:** Santuario dell’Acero (Fiori 1886); Vallata del Dardagna a Rocca Corneta, a Chiesina, a Rio Piano, presso Ca’ d’Julio (Farneti 1889); Gessi bolognesi (Cobau 1932); Croara/Miserazzano (Ferrari 1974); Gessi bolognesi a Siberia, a Miserazzano e a Monte Castello (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-3, 11633-4, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ferrara:** Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Ravenna:** Pineta di Ravenna (Del Testa 1903); Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); Dune di Marina Romea e Casalborsetti (Brullo et al. 1991); Bardello (Piccoli & Merloni 1989; Lazzari et al. 2008); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Monte Mauro, a Ca’ di Sasso, a Borgo Rivola e a Sasso (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** Comero, Monte Fumaiolo, Colli di Cesena (Del Testa 1903); Forlì (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Monte dei Cappuccini di Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Terra del Sole, Castrocara, Selbagnone, Campigna, Passo dei Mandrioli, Riofreddo, Premilcuore (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sui tronchi d’alberi fracidi (Bracciforti 1877); Nelle argille scagliose (Farneti 1889); Sulla terra, i muri ed al piede degli alberi (Fiori 1886; Casali 1899b); Boschi di faggi, sugli alberi e sul terreno (Del Testa 1903); Sui muri, boschi (Podpera 1903); Sui gessi e lo sfaticcio, sulla roccia gessifera (Zangheri 1959); Terra, sfaticcio calcareo, cortecce, roccia gessosa (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto (Velluti 1993); Su *Sambucus nigra*, su gesso e su roccia calcarea, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000); Su *Pinus pinaster*, *Pinus Pinea*, *Quercus robur* e al suolo (Fariselli 2015)

**ALTITUDINE:** 1420 m, 1500 m (Velluti 1993); Dal piano alle alte montagne (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Ptychostomum compactum*** Hornsch.

**SINONIMI:** *Bryum algovicum* Sendtn.; *Bryum pendulum* (Hornsch.) Schimp. *hom. illeg.*

**Reggio Emilia:** Monte Valestra (Fiori 1892b citato in Casali 1899b); Passo della Cisa (Velluti 1993)

**ECOLOGIA:** Boschi (Fiori 1892b citato in Casali 1899b); Suolo in un faggeto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1600 m (Velluti 1993)

***Ptychostomum creberrimum*** (Taylor) J.R. Spence & H.P. Ramsay

**SINONIMI:** *Bryum capillare* Hedw. var. *cuspidatum* Schimp.; *Bryum cuspidatum* (Bruch & Schimp.) Schimp. *hom. illeg.*

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Ravenna:** Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Nei boschi (Bracciforti 1877); Sui gessi (Zangheri 1959); Terra, roccia gessosa (Zangheri 1966b)



***Ptychostomum donianum*** (Grev.) Holyoak & N. Pedersen

*SINONIMI*: *Bryum donianum* Grev.

**Bologna**: Gessi bolognesi al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-3 (Fariselli et al. 2017)

*ECOLOGIA*: Su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

***Ptychostomum imbricatulum*** (Müll. Hal.) Holyoak & N. Pedersen

*SINONIMI*: *Bryum caespiticium* Hedw.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Monte Gottro (Bertoloni 1859); Langhirano in riva alla Parma (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Alpe di Succiso (Avetta 1897 citato in Casali 1899b); Abetina Reale (Velluti 1993); SIC Ca` del Vento, Ca` del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) – **Modena**: Spezzano (Fiori 1886); Lungo la Secchia a Sassuolo (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Bologna**: Corno alle Scale (Bertoloni 1844; Bertoloni 1859 citato in Fiori 1886; Cocconi 1881); Monte Paderno (Fiori 1886); Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889); Gessi bolognesi al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); San Lazzaro di Savena all'altipiano di Miserazzano (Pellis et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Sasso (Zangheri 1959); Sassatello (Zangheri 1966b); Pineta di San Vitale, Pineta di Classe (Zangheri 1966b); Duna di Marina Romea (Brullo et al. 1991); Bardello (Piccoli & Merloni 1989; Lazzari et al. 2008); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Monte Mauro, a Ca' di Sasso e a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena**: Forlì, San Varano, Carpena, Civitella di Romagna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Trovasi sui tetti, sui muri, in terra ecc. (Bracciforti 1877); Sui vecchi muri (Avetta 1897); Nelle sabbie dei fiumi e dei torrenti (Fiori 1886; Casali 1899b); Sullo sfaticcio della roccia gessifera (Zangheri 1959); Terra, muri, sfaticcio calcareo e gessoso (Zangheri 1966b); Suolo in un faggeto e in un vaccinieto (Velluti 1993); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1750 m, 1820 m (Velluti 1993)

*NOTE*: La segnalazione di Fiori "Lungo la Secchia a Sassuolo" non è ben chiaro se sia da attribuirsi alla parte modenese o reggiana; Casali la cita per il Reggiano

***Ptychostomum pallens*** (Sw.) J.R. Spence

*SINONIMI*: *Bryum capillare* Hedw. var. *flaccidum* B. S. G.; *Bryum pallens* Sw.; *Bryum pallens* Sw. var. *abbreviatum* Schimp.; *Bryum subelegans* Kindb.

**Parma**: Lago Santo, Lago Merdarolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Valle dell'Ozola, Vallestro, Lago di Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Collagna, da Vetto a Ramiseto lungo il Torrente Lonza (Casali 1899b); Lago del Barone (Cerretano) (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Casali 1899b; Bottini 1913); Lago Calamone (Provasi 1938); Passo della Cisa, Monte Ravino, Monte Cusna (Velluti 1993) – **Bologna**: Gessi bolognesi a Palestrina, a Miserazzano e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Sasso (Zangheri 1959); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena**: Monte Fumajolo (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sulle rive di un lago (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Sulle rupi e lungo i rigagnoli (Fiori 1886; Casali 1899b); Rive paludose di un lago (Bottini 1913); Ceppi (Zangheri 1966b); Radici di faggio e tronco di un faggio morto in un faggeto, suolo in una prateria discontinua su detriti marnosi (Velluti 1993); Su roccia, su gesso, su *Quercus cerris* e lungo un fosso su *Fraxinus ornus* (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1360 m (Bottini 1913); 1400 m, 1560 m, 1850 m (Velluti 1993); Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*NOTE*: La segnalazione di Zangheri per il Monte Fumaiolo è dubbia

***Ptychostomum pseudotriquetrum*** (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay var. ***pseudotriquetrum***

**SINONIMI:** *Bryum pseudotriquetrum* (Hedw.) P. Gaertn. et al.; *Bryum pseudotriquetrum* (Hedw.) P. Gaertn. et al. var. *gracilescens* Schimp.

**Parma:** Lago di Monte Caio (Provasi 1938); Monte Bocco (Gerdol & Tomaselli 1988); Fra Passo Paitino e Lago Rocca Pianaccia, Circo glaciale di Monte Bocco, Paduli di Cima (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Montevecchio alle sorgenti dell'Ozola, Cerreto dell'Alpi presso la Sega, Prati del Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Nismozza, Montemiscoso, Roncesesi (Casali 1899b); Lago Calamone (Provasi 1938); Bargetana (Monte Prado) (Gerdol & Tomaselli 1988); Le Porraie (Gerdol & Tomaselli 1993); Passo della Cisa (Velluti 1993); Monte Prado (Velluti 1993; Rossi & Ferrari 1994) – **Modena:** Forte Urbano a Castelfranco, Fontanazzi di Sant'Agnesa presso Modena, Cimone (Fiori 1886); Alta Valle delle Tagliole (Gerdol & Tomaselli 1988)

**ECOLOGIA:** Nei luoghi acquitrinosi e torbosi all'Appennino, più raro al piano (Fiori 1886; Casali 1899b); Suolo in un faggeto e lungo ruscellamenti, arenaria lungo le sponde detritiche di un lago (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1200 m, 1570 m, 1700 m, 1720 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1600 m, 1750 m, 1770 m (Velluti 1993); All'Appennino, più raro al piano (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Ptychostomum pseudotriquetrum*** (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay var. ***bimum*** (Schreb.) Holyoak & N. Pedersen

**SINONIMI:** *Bryum bimum* (Schreb.) Turner; *Bryum pseudotriquetrum* (Hedw.) P. Gaertn. et al. subsp. *bimum* (Schreb.) Hartm.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Lago Santo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Nei siti paludosi (Bracciforti 1877); Sulle rupi umide e nei prati uliginosi (Fiori 1886)

**ALTITUDINE:** 1600 m (Fitzgerald & Bottini 1881; Fiori 1886)

***Ptychostomum torquescens*** (Bruch & Schimp.) Ros & Mazimpaka

**SINONIMI:** *Bryum capillare* Hedw. subsp. *torquescens* (Bruch & Schimp.) Kindb.; *Bryum torquescens* Bruch et Schimp.

**Reggio Emilia:** La Veggia presso Sassuolo, Colli di Casalgrande (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Bologna:** Gessi bolognesi al Buco della Gaibola e al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Emilia:** Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950) – **Ravenna:** Rivola (Zangheri 1959); Pineta di San Vitale (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito) – **Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sulla terra ed i muri (Fiori 1886); Nelle argille scagliose (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Sulla terra sassosa ed i muri (Casali 1899b); Sulla roccia gessifera (Zangheri 1959); Terra (Zangheri 1966b); Alla base di *Quercus pubescens* e su gesso, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

***Ptychostomum zieri*** (Dicks. ex Hedw.) Holyoak & N. Pedersen

**SINONIMI:** *Zieria julacea* Schimp. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Parma:** Sopra il Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

**ECOLOGIA:** Fra le rupi (Fiori 1886)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Pylaisia*** Schimp. (Hypnaceae)

***Pylaisia polyantha*** (Hedw.) Schimp.

**Parma:** Sopra Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Monte Casarola, Campegine (Casali 1899b) – **Modena:** Bosco di Campogalliano lungo la Secchia presso Modena (Fiori 1886) – **Forlì-Cesena:** San Lorenzo in Noceto (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Sui faggi (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Casali 1899b); Sopra gli alberi (Fiori 1886; Casali 1899b); Cortecce (Zangheri 1966b)

***Racomitrium*** Brid. (Grimmiaceae)

***Racomitrium aciculare*** (Hedw.) Brid.

**Reggio Emilia**: Civago, Cerreto dell'Alpi, Valle di Riarbero, Praderena sopra Ospitaletto di Ligonchio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Alpe di Mommio, Monte Casarola (Casali 1899b) – **Bologna**: Santuario dell'Acero (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Sui sassi nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b)

*ALTITUDINE*: Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Racomitrium affine*** (F. Weber & D. Mohr) Lindb.

**Reggio Emilia**: Abetina Reale (Velluti 1993)

*ECOLOGIA*: Suolo sopra arenaria in un faggeto e arenaria in un vacciniato (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1600 m, 1700 m (Velluti 1993)

***Racomitrium canescens*** (Hedw.) Brid.

**Reggio Emilia**: Civago, Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Cusna/Monte Prado (Tomaselli 1991) – **Modena**: Varana (Fiori 1886) – **Bologna**: Vallata del Dardagna (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena**: Giogana dell'Appennino presso Poggio Scali (Pichi & Bottini 1888); Comero (Del Testa 1903); Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sul terreno e le rupi nei boschi (Fiori 1886); Nel terreno del macigno (Farneti 1889); Boschi di faggi (Del Testa 1903); Terreno (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: Dal colle all'alto monte (Fiori 1886)

***Racomitrium elongatum*** Ehrh. ex Frisvoll

**Reggio Emilia**: Passo della Cisa (Velluti 1993)

*ECOLOGIA*: Suolo in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1600 m (Velluti 1993)

***Racomitrium ericoides*** (Brid.) Brid.

*SINONIMI*: *Racomitrium canescens* (Hedw.) Brid. var. *ericoides* (Brid.) Hampe; *Racomitrium canescens* (Hedw.) Brid. var. *epilosum* H. Müll. ex Milde

**Reggio Emilia**: Montevecchio alle sorgenti dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Alpe di Succiso (Avetta 1897 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Le Forbici (Bottini 1913); Abetina Reale, Passo della Cisa, Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena**: Cimone (Fiori 1886) – **Bologna**: Rio Maggiore, Monte Granaglione (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Corno alle Scale (Fiori 1886) – **Forlì-Cesena**: Piancancelli (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Alla base dei tronchi e su la terra lungo le ripe di un rio (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Boschi di faggio (Avetta 1897 citato in Casali 1899b); Terra (Zangheri 1966b); Suolo e arenaria in un faggeto, arenaria in un vacciniato e in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1550 m (Bottini 1913); 1600 m, 1750 m, 1820 m, 2020 m, 2030 m (Velluti 1993)

***Racomitrium heterostichum*** (Hedw.) Brid.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Vertice del Giovarello (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Cerreto dell'Alpi presso la Sega, Valle di Riarbero (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Lago del Barone (Cerretano) (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b; Provasi 1938); Abetina Reale, Monte Prado (Velluti 1993) – **Modena**:

Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Bologna:** Santuario dell'Acero (Fiori 1886)  
**ECOLOGIA:** Microconglomerato in un faggeto e arenaria in un vaccinieto (Velluti 1993)  
**ALTITUDINE:** 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1450 m, 1820 m, 2020 m (Velluti 1993)

***Racomitrium lanuginosum*** (Hedw.) Brid.

**Parma:** Sopra il Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Santo (Bottini 1914) – **Modena:** Sopra il Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Bologna:** Vallata del Dardagna (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena:** Selvapiana (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**DATI D'ERBARIO:** **Reggio Emilia:** Vertice del Giovarello, Lunardi 1926 [FI] (Dia & Raimondo 1984)

**ECOLOGIA:** Nel terreno del macigno (Farneti 1889); Cortecce (Zangheri 1966b)

**ALTITUDINE:** 1750 (Fitzgerald & Bottini 1881); 1600 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1500 m (Bottini 1914); 1680 m (Dia & Raimondo 1984, dati d'erbario Lunardi 1926)

***Racomitrium sudeticum*** (Funck) Bruch & Schimp.

**Parma:** Monte Orsajo, Sopra il Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Vertice del Giovarello (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Praderena sopra Ospitaletto di Ligonchio, Montevecchio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Alpi di Mommio (Fiori 1886; Casali 1899b) – **Modena:** Vertice del Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881); Rondinajo, Lago Scaffajolo (Fiori 1886)

**ECOLOGIA:** Sui sassi (Casali 1899b)

**ALTITUDINE:** Nei boschi e nella parte scoperta dell'Appennino (Casali 1899b)

***Rhizomnium*** (Broth.) T.J. Kop. (Mniaceae)

***Rhizomnium magnifolium*** (Horik.) T.J. Kop.

**SINONIMI** *Mnium punctatum* Hedw. var. *elatum* Schimp.

**Reggio Emilia:** Bargetana (Monte Prado) (Gerdol & Tomaselli 1988); Monte Prado (Rossi & Ferrari 1994) – **Bologna:** Corno alle Scale (Gerdol & Tomaselli 1988)

***Rhizomnium punctatum*** (Hedw.) T.J. Kop.

**SINONIMI:** *Bryum punctatum* (Hedw.) Turner; *Mnium punctatum* Hedw.; *Mnium serpyllifolium* Neck. ex J. St. Hil. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Monte Gotro (Lange 1875; Fitzgerald & Bottini 1881); Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Monte Penna (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Monte Ventasso alla selva del Pizzetto (Re 1798 citato in Casali 1899b); Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); La Sega sopra Civago (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Pian Vallese, Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena:** Rondinajo, Sopra il Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Baccio-Monte Rondinaio (Credaro et al. 1980); Lago Baccio (Provasi 1926; Raffaelli et al. 1997) – **Bologna:** Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Vallata del Dardagna a Rio Piano (Farneti 1889); Alta valle del Dardagna (Credaro et al. 1980); Gessi bolognesi al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) – **Forlì-Cesena:** Comero, Fumaiolo, Cella di Sant'Alberico (Del Testa 1903); Campigna, Burraia di Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Nei boschi, nei prati e nelle paludi (Bracciforti 1877); Lungo i ruscelli e nei luoghi umidi dei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Terra, ceppi, legni fradici (Zangheri 1966b); Suolo e arenaria in un faggeto (Velluti 1993); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

**ALTITUDINE:** 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1500-1700 m (Credaro et al. 1980); 1284 m, 1460 m, 1550 m (Velluti 1993); Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Rhynchostegiella*** (Schimp.) Limpr. (Brachytheciaceae)

***Rhynchostegiella curviseta*** (Brid.) Limpr.

*SINONIMI*: *Rhynchostegium curvisetum* (Brid.) Schimp.

**Reggio Emilia**: La Veggia presso Sassuolo, Mulino di Casalgrande (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Chiozza lungo il canale di Tresinaro, Piazzola sotto Montefalcone, San Polo (Casali 1899b) – **Modena**: Mulino di San Marone a Saliceta San Giuliano, Mulino di Casinalbo (Fiori 1886) – **Bologna**: Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Emilia**: Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950) – **Forlì-Cesena**: Ladino, Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sui sassi, i muri e le tavole di legno lungo i ruscelli e presso le ruote dei mulini (Fiori 1886; Casali 1899b); Legno fradicio, cortecce (Zangheri 1966b)

***Rhynchostegiella tenella*** (Dicks.) Limpr.

*SINONIMI*: *Rhynchostegiella algeriana* (Brid. ex P. Beauv.) Warnst.; *Rhynchostegium tenellum* (Dicks.) Schimp.

**Parma**: Collecchio, Parma (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: La Veggia presso Sassuolo (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Bagnolo in Piano, San Martino presso Correggio, Roncocesi (Casali 1899b); SIC Ca` del Vento, Ca` del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) alla Tana della Mussina (Aleffi 2016) – **Modena**: San Faustino presso Modena, Carpi (Fiori 1886) – **Bologna**: SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3, 11633-4 (Fariselli et al. 2017) – **Emilia**: Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950) – **Forlì-Cesena**: Colli di Cesena a San Tommaso (Del Testa 1903); Romiti presso Forlì (Zodda 1921); Monte dei Cappuccini di Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Castrocaro località Cozzi (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Forlì, Ladino, Vecchiuzzano (Zangheri 1966b) – **Rimini**: SIC Onferno (Aleffi et al. 2014) – **Romagna**: Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950)

*ECOLOGIA*: Sulle pietre, sulle mura e sui mattoni sparsi (Avetta 1897); Sui sassi ed i muri (Fiori 1886; Casali 1899b); Luoghi ombreggiati (Del Testa 1903); Sulla roccia calcarea (Zangheri 1959); Muri, rocce calcaree, cortecce (Zangheri 1966b)

***Rhynchostegium*** Bruch & Schimp. (Brachytheciaceae)

***Rhynchostegium confertum*** (Dicks.) Schimp.

**Parma**: Monte Orsajo, Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Pratissolo presso Scandiano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: Casinalbo (Fiori 1886) – **Bologna**: Sotto la Madonna di San Luca a Bologna (Fiori 1886); Gessi bolognesi al Buco dei Buoi (Aleffi & Silenzi 2000) – **Ferrara**: Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Ravenna**: Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Dintorni di Cesena (Del Testa 1903); Romiti, Ladino, Colmano, Bracciano (Zangheri 1966b) *ECOLOGIA*: In un boschetto (Fiori 1886); Al piede degli alberi (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Sul terreno, al piede degli alberi (Del Testa 1903); Terreno, cortecce (Zangheri 1966b); Su roccia e su *Sambucus nigra* (Aleffi & Silenzi 2000); Su *Quercus robur* e al suolo (Fariselli 2015) *ALTITUDINE*: 1200 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Rhynchostegium megapolitanum*** (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.

**Reggio Emilia**: Casalgrande, Tana della Muscina a Borzano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); SIC Ca` del Vento, Ca` del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) nei contrafforti del Castello di Borzano (Aleffi 2016) – **Modena**: Orto Botanico di Modena, Casinalbo, Rocca di Spezzano, Montebaranzone (Fiori 1886) – **Bologna**: Gessi bolognesi al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Duna di Casalborsetti (Brullo et al. 1991); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Calisese (Del Testa 1903); Ladino, Carpena, Scardavilla (Zangheri 1966b) – **Rimini**: SIC Onferno (Aleffi et al. 2014)

**ECOLOGIA:** Lungo le siepi e le rive dei fossi nei luoghi erbosi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sugli alberi e sul terreno erboso (Del Testa 1903); Terreno, ceppi (Zangheri 1966b); Su terreno (Aleffi & Silenzi 2000); Al suolo (Fariselli 2015)

***Rhynchostegium murale*** (Hedw.) Schimp.

**SINONIMI:** *Hypnum murale* Dicks.; *Rhynchostegium murale* (Hedw.) Schimp. var. *julaceum* Schimp.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Sala Baganza, Vigheffio, Collecchio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Monte Vallestro, Cerreto dell'Alpi (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Montemiscoso (Casali 1899b) – **Modena:** Modena, Rocca Santa Maria (Fiori 1886); Le Radici al principio della via per San Pellegrino (Bottini 1913) – **Forlì-Cesena:** Scardavilla, Campigna località Poggio Ronchi (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sui tetti umidi, nei cortili, sulle muraglie, sulle pietre e sulle zolle di terra nei siti umidi (Bracciforti 1877); Sui mattoni (Fiori 1886); Sulle sponde dei fossi (Avetta 1897); Sugli schisti marnosi (Bottini 1913); Terreno (Zangheri 1966b)

**ALTITUDINE:** 1540 m (Bottini 1913)

***Rhynchostegium riparioides*** (Hedw.) Cardot

**SINONIMI:** *Platyhypnidium riparioides* (Hedw.) Dixon.; *Platyhypnidium rusciforme* M. Fleisch. *nom. illeg. incl. spec. prior.*; *Rhynchostegium rusciforme* (F.W. Weiss ex Brid.) Schimp. *nom. illeg.*; *Rhynchostegium rusciforme* (F.W. Weiss ex Brid.) Schimp. *nom. illeg.* var. *inundatum* (Brid.) Schimp.; *Rhynchostegium rusciforme* (F.W. Weiss ex Brid.) Schimp. *nom. illeg.* var. *lutescens* Schimp.; *Rhynchostegium rusciforme* (F.W. Weiss ex Brid.) Schimp. *nom. illeg.* var. *prolixum* (Dicks. ex Brid.) Schimp.

**Parma:** Parma (Avetta 1897); Passo della Cappelletta (Razzara 1980) – **Reggio Emilia:** Mulino di Casalgrande, Mulino della Veggia presso Sassuolo (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Alta valle del Dolo (Bottini 1913) – **Modena:** Mulino di Casinalbo, Mulino di San Marone a Saliceta San Giuliano, Fontanazzi modenesi di San Faustino e Cognento (Fiori 1886) – **Bologna:** Bologna ai gessi (Bertoloni 1859); Grotte del bolognese (Cocconi 1881); Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889); Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Castrocaro località Cozzi (Zangheri 1959)

**ECOLOGIA:** Sopra un muro (Fiori 1886); Nel fondo ghiaioso dei ruscelli (Farneti 1889); In un fosso presso le mura (Avetta 1897); Sulle travi di legno presso le ruote dei mulini (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul macigno nei ruscelletti (Bottini 1913); Stillicidi sul calcare (Zangheri 1959); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Bottini 1913)

***Rhynchostegium rotundifolium*** (Scop. ex Brid.) Schimp.

**Bologna:** SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014)

### ***Rhytidiadelphus*** (Limpr.) Warnst. (Hylocomiaceae)

***Rhytidiadelphus loreus*** (Hedw.) Warnst.

**SINONIMI:** *Hylocomium loreum* (Hedw.) Schimp.; *Hypnum loreum* Hedw.

**Parma:** Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Passo del Fugicchio (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Alpi di Camporaghena, Alpi di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881); Cerreto dell'Alpi (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena:** Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Bologna:** Vallata del Dardagna al Monte Grande, a Rio Piano e al Cavone del Corno alle Scale (Farneti 1889)

**ECOLOGIA:** Sulla terra e sui sassi nei boschi (Casali 1899b)

**ALTITUDINE:** 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1650 m (Gerdol & Tomaselli 1993); Nell'Appennino (Casali 1899b)

***Rhytidiadelphus squarrosus*** (Hedw.) Warnst.

*SINONIMI*: *Hylocomium squarrosum* (Hedw.) Schimp.; *Hypnum squarrosum* L. ex Hedw.

**Parma**: Monte Orsajo, Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Passo della Cappelletta (Razzara 1980; Sburlino et al. 1980) – **Reggio Emilia**: Lago Cerretano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Prado (Velluti 1993) – **Modena**: Rondinajo, Lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Provasi 1926); Monte Cantiere di Barigazzo (Fiori 1886) – **Bologna**: Vallata del Dardagna all'Acero, al Monte Fabuino e a Rio Piano (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena**: Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Nei luoghi ombrosi (Farneti 1889); Nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Terreno (Zangheri 1966b); Suolo in un vaccinieto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1750 m, 1770 m (Velluti 1993); Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Rhytidiadelphus triquetrus*** (Hedw.) Warnst.

*SINONIMI*: *Hylocomium triquetrum* (Hedw.) Schimp.; *Hypnum triquetrum* (L.) B.S.G.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Reggio Emilia**: Civago, Colli di San Valentino (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Toano, Cerè Marabino, Vetto, Montemiscoso (Casali 1899b); Monte Prado, Monte Cusna (Velluti 1993); SIC Ca` del Vento, Ca` del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) – **Modena**: Montefiorino, Montese, Montegibbio (Fiori 1886); Vallata del Dardagna alla Riva (Farneti 1889); Monte Giovo (Tomaselli & Agostini 1990) – **Bologna**: Corno alle Scale (Cocconi 1881); Vallata del Dardagna alla Chiesina, a Rio Piano, alla Riva e al Cavone del Corno alle Scale (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena**: Comero, Colli di Cesena (Del Testa 1903); Ladino, Monte Aiola, Premilcuore, Monte Gemelli, Campigna località Burraia, Monte Falco (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Cresce nei boschi cedui, nei prati, nei verzieri (Bracciforti 1877); Nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Nei boschi sul terreno (Del Testa 1903); Terreno, ceppi, sfaticcio rocce calcaree (Zangheri 1966b); Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1000 m (Del Testa 1903); 1780 m, 1800 m, 1920 m, 1960 m, 1990 m (Velluti 1993); Al monte (Casali 1899b)

***Rhytidium*** (Sull.) Kindb. (Rhytidiaceae)

***Rhytidium rugosum*** (Ehrh. ex Hedw.) Kindb.

*SINONIMI*: *Hypnum rugosum* Ehrh. ex Hedw.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Alpi di Camporaghena (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*ALTITUDINE*: 1800 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Saelania*** Lindb. (Ditrichaceae)

***Saelania glaucescens*** (Hedw.) Broth.

*SINONIMI*: *Leptotrichum glaucescens* (Hedw.) Hampe

**Reggio Emilia**: Alpi di Mommio, Le Forbici alle sorgenti del Dolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Prado (Velluti 1993) – **Modena**: San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Farneti 1889); Colli di Montegibbio (Fiori 1886) – **Bologna**: Vallata del Dardagna al Cavone del Corno alle Scale (Farneti 1889)

*ECOLOGIA*: Sul macigno (Fitzgerald & Bottini 1881); Sopra l'arenaria (Fiori 1886); Suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1500 m, 1800 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1950 m (Velluti 1993)

*Sanionia* Loeske (Amblystegiaceae)*Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske

*SINONIMI*: *Drepanocladus uncinatus* (Hedw.) Warnst.; *Hypnum uncinatum* Hedw.

**Parma**: Monte Orsajo, Lago Ballano (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Vertice del Giovarello (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Civago, Ospitaletto di Ligonchio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Alpe di Succiso (Avetta 1897 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b); Lago del Barone (Cerretano) (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b; Provasi 1938); Monte Cusna/Monte Prado (Tomaselli 1991); Monte Cusna, Monte Ravino, Abetina Reale (Velluti 1993); Monte Prado (Velluti 1993; Rossi & Ferrari 1994; Ferrari 2002a) – **Modena**: San Pellegrino, Rondinajo, Libro Aperto, Lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Da Fiumalbo salendo il Cimone, Monte Cantiere di Barigazzo (Fiori 1886); Lago Baccio-Monte Rondinaio (Credaro et al. 1980) – **Bologna**: Madonna dell'Acero (Lange 1868; Lange 1875; Fiori 1886); Corno alle Scale (Bertoloni 1859 citato in Fitzgerald & Bottini 1881 e in Fiori 1886; Cocconi 1881); Alta valle del Dardagna (Credaro et al. 1980) – **Emilia**: Modenese/Reggiano (Tomaselli 1991) – **Forlì-Cesena**: Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Nei boschi di faggio (Avetta 1897 citato in Casali 1899b); Sulla terra, i sassi ed alla base degli alberi nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Legno secco (Zangheri 1966b); Tronco di faggio morto e calcare in un faggeto, suolo in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1900 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1500-1600 m, 1580-1700 m (Credaro et al. 1980); 1400 m, 1500 m, 1800 m, 1900 m, 1910 m, 1990 m, 2000 m (Velluti 1993); Negli alti monti (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Sarmentypnum* Tuom. & T.J. Kop. (Calliergonaceae)*Sarmentypnum exannulatum* (Schimp.) Hedenäs

*SINONIMI*: *Drepanocladus exannulatus* (Schimp.) Warnst.; *Drepanocladus exannulatus* (Schimp.) Warnst. var. *pinnatus* (Boulay) G. Roth; *Hypnum exannulatum* Schimp.; *Hypnum exannulatum* Schimp. var. *purpurascens* Schimp.; *Warnstorfia exannulata* (Schimp.) Loeske

**Parma**: Lago di Rocca Pianaccia (Provasi 1938); Padule del Braiola, Capanne Badignana, Pozza di Badignana, tra I Lagoni e il Lago Scuro, Passo del Fugicchio, fra Passo Paitino e Lago Rocca Pianaccia, Sopra il Lago Verde, Lago Verde (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia**: Lago Scuro (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Lago Cerretano (Bottini 1913); Lago Verde di Monte Ventasso (Provasi 1938); Monte Acuto, Lago Gonella, Prati di Pranda, Paduletta di Sillano, La Bargetana, Monte Vecchio versante Nord, Monte La Piella versante Nord (Gerdol & Tomaselli 1993); Monte Prado (Velluti 1993) – **Modena**: Passo del Piastrino, Sant'Anna Pelago al Fontanone, Piandelagotti a San Geminiano, Sant'Anna Pelago sotto il vertice del Saltello (Bottini 1913); In tutto l'Appennino di Piandelagotti (Bottini 1914); Pian Cavallaro sul Cimone (Fiori 1886; Gerdol & Tomaselli 1993); Le Maccherie, Lagacci di Monte Albano, Lagacci della Porticciola, Circo glaciale di Monte (Lago) Turchino, Colle Acquamarzia, Monte Spigolino versante Nord (Gerdol & Tomaselli 1993); Alto Appennino modenese (Tomaselli et al. 1994); Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881; Fiori 1886; Provasi 1926; Gerdol & Tomaselli 1993; Raffaelli et al. 1997) – **Bologna**: Alta valle del Dardagna (Credaro et al. 1980); Parco Regionale del Corno alle Scale (Tomaselli et al. 2002)

*ECOLOGIA*: Lungo i rigagnoli (Fiori 1886); In un Cariceto-Erioforeto, negli acquitrini, in un Cariceto, in un Erioforeto, in una piccola conca paludosa, sulle rive torbose di un lago (Bottini 1913); Al margine degli stagni e nei pascoli paludosi delle radure delle faggete (Bottini 1914); Arenaria sulle sponde detritiche di un lago (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1620 m (Fitzgerald & Bottini 1881); 1300 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); 1360 m, 1470 m, 1500 m, 1520 m, 1550 m, 1580 m (Bottini 1913); 1500-1700 m (Credaro et al. 1980); 1290 m, 1460 m, 1480 m, 1489 m, 1510 m, 1550 m, 1554 m, 1560 m, 1574 m, 1576 m, 1584 m, 1600 m, 1630 m, 1650 m, 1660 m, 1600-1660 m, 1700 m, 1760 m, 1780 m, 1840 m,



1880 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1750 m (Velluti 1993)

*NOTE:* In letteratura esiste anche una segnalazione per l'Appennino tosco-emiliano (Ferrarini 1982) con l'indicazione stazionale generica di "Laghetti e acquitrini dal Passo della Cisa al Passo delle Radici"

***Schistidium*** Bruch & Schimp. (Grimmiaceae)

***Schistidium apocarpum*** (Hedw.) Bruch & Schimp.

*SINONIMI:* *Grimmia apocarpa* Hedw.; *Schistidium apocarpum* (Hedw.) Bruch & Schimp. subsp. *vulgare* Loeske *nom. illeg. incl. typ. spec.*

**Parma:** Collecchio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Monte del Gesso a Scandiano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Bagnolo in Piano, Reggio, Bianello alle Quattro Castella (Casali 1899b); Monte Cusna (Fiori 1886 citato in Casali 1899b; Velluti 1993); Passo della Cisa, Abetina Reale, Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena:** Orto Botanico di Modena, Modena, Colli di Sassuolo, Cimone, Libro Aperto (Fiori 1886); Valle del Dardagna al Monte Capelbuso (Farneti 1889) – **Bologna:** Bologna a Gaibola, a Monte Donato, a Beverara, al Ravone, a Mongardino, Granaglione, Valle del Sela a Pianaccio, Valle del Dardagna a Rocca Corneta, al Monte Capelbuso e a Chiesina (Farneti 1889); Gessi bolognesi (Cobau 1932); Parco Storico di Monte Sole (inedito) – **Ravenna:** Persolino, Dintorni di Lugo (Del Testa 1903); Sasso (Zangheri 1959); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena:** Dintorni di Cesena (Del Testa 1903); Castrocaro, Bertinoro (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Vecchiazzano, Polenta, Campigna (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA:* Sulle marne (Farneti 1889); Sui muri (Avetta 1897); Sui muri, sui sassi e le rupi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sui tetti (Del Testa 1903); Sulle rocce (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); Sul calcare, sui gessi (Zangheri 1959); Cortecce, terreno, rocce calcaree e gessose (Zangheri 1966b); Arenaria in un faggeto e in un nardeto, suolo sopra arenaria in un faggeto, calcare lungo le sponde di un torrente (Velluti 1993)

*ALTITUDINE:* 1250 m, 1400 m, 1450 m, 1500 m, 1600 m, 1700 m (Velluti 1993); Dal piano ai più alti monti (Fiori 1886; Casali 1899b)

*NOTE:* Sulla base della revisione del gruppo di *Schistidium apocarpum* (Blom 1996) tutte le segnalazioni delle specie del genere *Schistidium* precedenti a tale data e non soggette a revisione sono considerate dubbie (Aleffi et al. 2008)

***Schistidium atrofusum*** (Schimp.) Limpr.

**Forlì-Cesena:** Campigna (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA:* Terreno in foresta (Zangheri 1966b)

*NOTE:* Zangheri indica come dubbia la segnalazione

***Schistidium confertum*** (Funck) Bruch & Schimp.

*SINONIMI:* *Grimmia conferta* Funck

**Parma:** Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Santa Maria sul Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b) – **Modena:** Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*ECOLOGIA:* Sul macigno (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Sulle rupi (Fiori 1886 citato in Casali 1899b)

*ALTITUDINE:* 1600 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Schistidium crassipilum*** H.H. Blom

**Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

*DATI D'ERBARIO:* **Modena:** Colli di Sassuolo, Mori 1886 [S] (Blom 1996)

***Schistidium helveticum*** (Schkuhr) Deguchi

**Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

***Schistidium rivulare*** (Brid.) Podp.

*SINONIMI*: *Schistidium alpicola* (Hedw.) Limpr. *nom. rejic.* var. *rivulare* (Brid.) Limpr. *nom. rejic.*

**Parma**: Monte Orsaro tra il Lago Santo ed il vertice (Bottini 1914)

*ECOLOGIA*: Sul macigno bagnato (Bottini 1914)

*ALTITUDINE*: 1600 m (Bottini 1914)

***Schistidium trichodon*** (Brid.) Poelt

*SINONIMI*: *Schistidium apocarpum* (Hedw.) Bruch & Schimp. var. *gracile* (Schleich. ex Roehl.) Bruch & Schimp.; *Schistidium gracile* (Schleich. ex Roehl.) Limpr.

**Reggio Emilia**: Sorgenti del Dolo sotto il Vertice del Monte Prado (Bottini 1913) – **Forlì-Cesena**: Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sul macigno (Bottini 1913); Suolo (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 1800 m (Bottini 1913)

***Sciuro-hypnum*** (Hampe) Hampe (Brachytheciaceae)

***Sciuro-hypnum flotowianum*** (Sendtn.) Ignatov & Huttunen

*SINONIMI*: *Eurhynchium velutinoides* Schimp. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Modena**: San Pellegrino (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*ALTITUDINE*: 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Sciuro-hypnum glaciale*** (Schimp.) Ignatov & Huttunen

*SINONIMI*: *Brachythecium glaciale* Schimp.

**Reggio Emilia**: Vertice delle Alpi di Soraggio, presso la Lama della Lite (Fitzgerald e Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Monte Cusna/Monte Prado (Tomaselli 1991)

*ECOLOGIA*: Fra i detriti delle schisto argilloso (Fitzgerald e Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)

*ALTITUDINE*: 1750 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)

***Sciuro-hypnum plumosum*** (Hedw.) Ignatov & Huttunen

*SINONIMI*: *Brachythecium plumosum* (Hedw.) Schimp.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald e Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Modena**: Sotto il Rondinajo (Fitzgerald e Bottini 1881); Lago Baccio (Fitzgerald e Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Provasi 1926); Dintorni di Fiumalbo (Fiori 1886) – **Bologna**: Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889); Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000) – **Ravenna**: Castelraniero (Zangheri 1966b) – **Forlì-Cesena**: San Varano, Bagnolo di Castrocaro (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sulle pietre nelle fonti e nei ruscelli (Farneti 1889); Terra, ceppi, cortecce (Zangheri 1966b); Su roccia lungo il fosso (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: 1620 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Sciuro-hypnum populeum*** (Hedw.) Ignatov & Huttunen

*SINONIMI*: *Brachythecium populeum* (Hedw.) Schimp.

**Parma**: Rigoso (Fitzgerald e Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Collecchio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Ramiseto al Macchione dell'Olio, Montemiscoso (Casali 1899a; Casali 1899b); Abetina Reale, Monte Ravino (Velluti 1993) – **Modena**: San Pellegrino, Rondinajo (Fitzgerald e Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Bosco di Campogalliano lungo la Secchia presso Modena (Fiori 1886) – **Bologna**: Vallata del Dardagna all'Acero e al Cavone del Corno alle Scale (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena**: Lungo il Rubicone (Pisciatiello) a Calisese (Del Testa 1903); Campigna (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sulle rupi e alla base degli alberi (Farneti 1889); Sugli alberi nei luoghi ombrosi (Avetta 1897);

Sugli alberi (Casali 1899b); Al piede degli alberi (Fiori 1886; Del Testa 1903); Suolo e arenaria in un faggeto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881); 1250 m, 1600 m (Velluti 1993)

**NOTE:** La segnalazione di Zangheri (1966b) è dubbia

***Sciuro-hypnum reflexum*** (Starke) Ignatov & Huttunen

**SINONIMI:** *Brachythecium reflexum* (Starke) Schimp.

**Parma:** Lago Scuro (Fitzgerald e Bottini 1881); Monte Orsajo (Fitzgerald e Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Praderena presso Ospitaletto di Ligonchio (Fiori 1886; Casali 1899b); Monte Prado (Velluti 1993) – **Bologna:** Vallata del Dardagna a Rio Piano e al Cavone del Corno alle Scale (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)

**ECOLOGIA:** Sui sassi (Fiori 1886; Casali 1899b); Suolo e arenaria in un vaccinieto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1750 m, 1870 m (Velluti 1993)

***Sciuro-hypnum starkei*** (Brid.) Ignatov & Huttunen

**SINONIMI:** *Brachythecium starkei* (Brid.) Schimp.

**Reggio Emilia:** Monte Ravino (Velluti 1993) – **Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)

**ECOLOGIA:** Suolo e scorza di faggio in un faggeto (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1400 m, 1500 m (Velluti 1993)

### ***Scleropodium*** Bruch & Schimp. (Brachytheciaceae)

***Scleropodium touretii*** (Brid.) L.F. Koch

**SINONIMI:** *Brachythecium illecebrum* (Schimp.) De Not.; *Scleropodium illecebrum* Schimp.

**Reggio Emilia:** Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena:** Montefiorino (Fiori 1886) – **Bologna:** Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Emilia:** Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950) – **Ravenna:** Duna di Casalborsetti (Brullo et al. 1991) – **Forlì-Cesena:** San Demetrio (Cesena) (Del Testa 1903); Polena (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950)

**ECOLOGIA:** Nei castagneti sul suolo arenoso nudo (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Sugli alberi e sul terreno nei boschi in collina (Del Testa 1903); Terra (Zangheri 1966b); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

### ***Scorpidium*** (Schimp.) Limpr. (Amblystegiaceae)

***Scorpidium revolvens*** (Sw. ex anon.) Rubers

**SINONIMI:** *Drepanocladus revolvens* (Sw. ex anon.) Warnst.

**Piacenza:** Pratogrande di Granere (Razzara 1981)

***Scorpidium scorpioides*** (Hedw.) Limpr.

**Reggio Emilia:** SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016)

### ***Scorpiurium*** Schimp. (Brachytheciaceae)

***Scorpiurium circinatum*** (Bruch) M. Fleisch. & Loeske

**SINONIMI:** *Eurhynchium circinatum* (Brid.) Schimp.; *Rhynchostegium circinatum* (Bruch) De Not.

**Bologna:** Vallata del Dardagna alla Chiesina (Farneti 1889 citato in Fiori 1892b); Gessi bolognesi sulla via della Gaibola e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) – **Ravenna:** Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena:** Comero, Colli vicino a Cesena (Del Testa 1903); Monte dei Cappuccini di Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Castrocaro località Cozzi (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Carpinello, Ladino, Bertinoro, Castelnuovo di Meldola, Campigna località Burraia (Zangheri 1966b) – **Rimini:** SIC Onferno (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) –

**Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sul macigno (Farneti 1889); Sulle rupi (Fiori 1892b); Sul terreno e sugli alberi, nelle faggete (Del Testa 1903); Sul calcare, sui gessi (Zangheri 1959); Terra, rocce calcaree e gessifere, cortecce (Zangheri 1966b); Su terreno, su gesso e su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

***Seligeria*** Bruch & Schimp. (Seligeriaceae)

***Seligeria calcarea*** (Hedw.) Bruch & Schimp.

**Parma:** Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881) – **Forlì-Cesena:** Cappuccinini (Forlì) (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Terreno (Zangheri 1966b)

***Seligeria donniana*** (Sm.) Müll. Hal.

**Parma:** Rigoso (Cortini-Pedrotti 1992)

**NOTE:** La segnalazione si riferisce ad alcuni campioni raccolti per uno studio svolto da Fitzgerald & Bottini (1881) indicati dagli autori come *S. pusilla*, e così citata anche da Fiori (1886), ma che una revisione dei campioni d'erbario ha dimostrato essere in realtà *S. donniana* e *S. recurvata* (Cortini-Pedrotti 1992)

***Seligeria pusilla*** (Hedw.) Bruch & Schimp.

**Reggio Emilia:** Appennino di Mommio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b); Cerreto dell'Alpi presso la Sega (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b) –

**Modena:** Rocca Santa Maria, Montebaranzone, Monte Modino di Frassinoro, Cimone, Libro Aperto (Fiori 1886) – **Bologna:** Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 e 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito)

**ECOLOGIA:** Sui sassi umidi ed ombreggiati tanto calcarei che silicei (Fiori 1886; Casali 1899b); Roccia gessifera (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881); Dai colli alle vette appenniniche (Fiori 1886); Al colle e al monte (Casali 1899b)

**NOTE:** Si vedano anche le note della specie precedente

***Seligeria recurvata*** (Hedw.) Bruch & Schimp.

**Parma:** Rigoso (Cortini-Pedrotti 1992) – **Reggio Emilia:** Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Scaffajolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Farneti 1889) – **Bologna:** Vallata del Dardagna al Baggioledo (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)

**ECOLOGIA:** Sul macigno (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Sulle rupi di macigno (Farneti 1889); Arenaria in una prateria discontinua di crinale (Velluti 1993)

**ALTITUDINE:** 1900 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 2030 m (Velluti 1993)

**NOTE:** Per la segnalazione della località di Rigoso si vedano le note di *S. donniana*

***Sematophyllum*** Mitt. (Sematophyllaceae)

***Sematophyllum substrumosum*** (Hampe) E. Britton

**Ravenna:** Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015)

**ECOLOGIA:** Su *Pinus pinaster* (Fariselli 2015)

***Sphagnum*** L. (Sphagnaceae)

***Sphagnum angustifolium*** (C.E.O. Jensen ex Russow) C.E.O. Jensen

**SINONIMI:** *Sphagnum rothii* Röhl. var. *tenue* Röhl

**Parma:** Prati di Spilla (Bottini 1919; Provasi 1938)

*ECOLOGIA:* Negli acquitrini (Bottini 1919)

*ALTITUDINE:* 1220-1250 m (Bottini 1919)

*NOTE:* Nel lavoro di Bottini sugli sfagni italiani (1919) vengono citate complessivamente un numero enorme di varietà (diverse per ciascuna specie segnalata) quasi tutte rivelatesi di scarsissimo significato dal punto di vista tassonomico

***Sphagnum auriculatum*** Schimp.

*SINONIMI:* *Sphagnum lescurii* Sull. in Gray.; *Sphagnum obesum* (Wilson) Warnst.; *Sphagnum rufescens* (Nees & Hornsch.) Warnst.; *Sphagnum turgidum* Röhl *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Parma:** Capanna Biancani (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Sotto il Lago Cerretano nei Prati di Pranda (Bottini 1919; Provasi 1938; Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena:** Piandelagotti al Lagaccio del Bufalo (Bottini 1919) – **Emilia:** Emilia (Raimondo & Dia 1978)

*DATI D'ERBARIO:* **Reggio Emilia:** Gabellina a Prato Spinaccio, Lunardi & Bottini 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976) – **Modena:** Piandelagotti a Ronco Bello, Lunardi 1917 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976)

*ECOLOGIA:* Nei pascoli paludosi e nelle fosse di prati paludosi (Bottini 1919); Pascoli acquitrinosi (Raffaelli 1976)

*ALTITUDINE:* 1300 m (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1917); 1290 m, 1570 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1100 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi & Bottini 1915)

*NOTE:* La segnalazione di Raimondo & Dia è derivata da fonti bibliografiche.

***Sphagnum capillifolium*** (Ehrh.) Hedw.

*SINONIMI:* *Sphagnum acutifolium* Ehrh. *ex Schrad.*; *Sphagnum acutifolium* Schrad. *var. deflexum* Schimp.; *Sphagnum nemoreum* Scop.; *Sphagnum schimperi* Röhl

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Tra I Lagoni e il Lago Scuro, Capanna Biancani (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Sopra Gabellina a Prato Spinaccio (Bottini 1919); Prati di Pranda (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena:** Tra San Pellegrino e il lago Santo (Fiori 1886); Piandelagotti sotto Punta Cimetta (Bottini 1914); Nello stagno della Bocca del Fornello (Bottini 1919); Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1926); Lago di Pratignano (Fiori 1886; Provasi 1926; Corbetta 1973; Tomaselli & Gerdol 1983; Gerdol & Tomaselli 1993; Tomaselli et al. 1994) – **Bologna:** Praduro e Sasso di Monte Mario (Bottini 1919)

*DATI D'ERBARIO:* **Reggio Emilia:** Gabellina a Prato Spinaccio, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976) – **Modena:** Piandelagotti a Punta Cimetta, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976) – **Bologna:** Praduro e Sasso di Monte Mario, Maccagno 1917 [PI] (Raffaelli 1976)

*ECOLOGIA:* Nelle paludi, negli stagni e nei luoghi inondati dei boschi (Bracciforti 1877); Lungo i rigagnoli (Fiori 1886); Negli stagni (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Bottini 1914; Bottini 1919); Negli acquitrini (Bottini 1919); Pascoli acquitrinosi (Raffaelli 1976)

*ALTITUDINE:* 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1550 m (Bottini 1914; Bottini 1919); 479 m (Bottini 1919); 1100 (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Bottini 1915); 1290 m, 1307 m, 1480 m, 1570 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1400 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 130 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Maccagno 1917); Nell'alto Appennino (Fiori 1886)

*NOTE:* I campioni della provincia di Bologna della segnalazione di Bottini (1919) e di Raffaelli sono stati raccolti entrambi da Maccagno

***Sphagnum centrale*** C.E.O. Jensen

**Parma:** Paduli di Cima, Lago Verdaro, Lago Squincio, Lago Verde (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena:** Lago di Pratignano (Gerdol & Tomaselli 1993)

*DATI D'ERBARIO:* **Reggio Emilia:** Prati di Pranda, Bottini 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976) – **Modena:** Sant'Anna Pelago alla Punta dello Spicchio, Lunardi 1918 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976)

*ECOLOGIA:* Pascoli acquitrinosi, acquitrini (Raffaelli 1976)

*ALTITUDINE:* 1200 m, 1241 m, 1307 m, 1390 m, 1460 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1300 m (Raffaelli

1976, dati d'erbario Bottini 1915); 1250 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1918)

*NOTE:* Per la redazione del suo lavoro sugli sfagni italiani Bottini (1919) ha utilizzato quasi sempre campioni raccolti da lui stesso oppure da Lunardi per quanto riguarda il territorio emiliano. Non è quindi chiaro per quale motivo a volte siano presenti segnalazioni derivanti da revisione di materiale d'erbario (Raffaelli 1976) a cui non corrisponda nessuna segnalazione originale nel lavoro di Bottini

***Sphagnum compactum*** Lam. & DC.

*SINONIMI:* *Sphagnum compactum* Lam. & DC. var. *imbricatum* Warnst.; *Sphagnum compactum* Lam. & DC. var. *squarrosum* (Russow) Warnst.; *Sphagnum cymbifolium* (Ehrh.) Hedw. var. *compactum* (Lam. & DC.) Schultz; *Sphagnum rigidum* (Nees & Hornsch.) Schimp. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Parma:** Sopra il Lago Santo, Prati di Spilla (Bottini 1919); Padule del Lago Santo (Provasi 1938); Alto circo di Prato Spilla, tra il Lago di Roccapianaccia e il Passo di Paitino, Alto circo di Prato Spilla a Nord di Monte Bocco (Tomaselli & Gerdol 1983); Tra I Lagoni e il Lago Scuro (Tomaselli & Gerdol 1983; Gerdol & Tomaselli 1993); Capanna Biancani, Circo glaciale di Monte Bocco (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena:** Sopra il Lago Baccio (Bottini 1919); Tra il Lago Baccio e la cima del Rondinaio (Raffaelli 1976); Lago Baccio (Venturi & Bottini 1884 citati in Fiori 1886; Provasi 1926; Tomaselli et al. 1994)

*DATI D'ERBARIO:* **Modena:** Tra il Lago Baccio e il Monte Rondinaio, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Tomaselli & Gerdol 1983)

*ECOLOGIA:* Negli uliginosi, in una conca paludosa, in uno stagno, negli acquitrini (Bottini 1919); Pascolo acquitrinoso (Raffaelli 1976)

*ALTITUDINE:* 1220-1280 m, 1600 m, 1800 m (Bottini 1919); 1650 m (Raffaelli 1976); 1670 m, 1700 m (Tomaselli & Gerdol 1983); 1480 m, 1570 m, 1600 m, 1700 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1690 m, 1800 m (Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Lunardi 1915)

***Sphagnum contortum*** Schultz

**Reggio Emilia:** Lago Cerretano (Bottini 1919; Provasi 1938) – **Modena:** Piandelagotti sotto l'Imbrancamento (Bottini 1914; Bottini 1919); Piandelagotti a San Geminiano (Bottini 1919); Lago di Pratignano (Ferrari et al. 1981) – **Emilia:** Emilia (Raimondo & Dia 1978)

*DATI D'ERBARIO:* **Reggio Emilia:** Lago Cerretano, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976) – **Modena:** Piandelagotti a San Geminiano, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Piandelagotti a Punta Cimetta, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976)

*ECOLOGIA:* Negli stagni delle radure delle faggete (Bottini 1914; Bottini 1919); Sulle rive torbose di un lago (Bottini 1919); Pascoli acquitrinosi (Raffaelli 1976)

*ALTITUDINE:* 1300 m (Bottini 1914); 1200 m (Bottini 1919); 1360 (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 1400 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 1450 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915)

*NOTE:* La segnalazione di Raimondo & Dia è derivata da fonti bibliografiche

***Sphagnum cuspidatum*** Ehrh. ex Hoffm.

**Modena:** Lago di Pratignano (Cocconi 1881; Bertarelli 1916; Provasi 1926; Corbetta 1973)

*ALTITUDINE:* 1300 m (Bertarelli 1916)

***Sphagnum fallax*** (H. Klinggr.) H. Klinggr.

*SINONIMI:* *Sphagnum brevifolium* (Lindb. ex Braithw.) Röhl

**Reggio Emilia:** Prati di Pranda (Gerdol & Tomaselli 1993)

*DATI D'ERBARIO:* **Parma:** Valle dell'Enza al Prataccio, Bottini 1914 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Valle della Cedra ai Pascoli della Spilla, Bottini 1914 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976)

*ECOLOGIA:* Pascoli acquitrinosi (Raffaelli 1976)

*ALTITUDINE:* 1290 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1130 m, 1250 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Bottini 1914)

*NOTE:* In letteratura esistono diverse segnalazioni di *S. recurvum* P. Beauv. binomio ambiguo in precedenza

interpretato come *S. fallax* (Cortini-Pedrotti 1992) di cui si riportano di seguito le località indicate per la Regione. **Parma:** Torrente della Spilla (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Prati di Spilla (Bottini 1919; Provasi 1938) – **Reggio Emilia:** Lago Mesco (Provasi 1938) – **Modena:** Lago di Pratignano (Castaldo & Di Martino 1968-1969) – **Emilia:** Appennino emiliano (Levier 1901). I valori di altitudine si riferiscono alle sole segnalazioni certe

***Sphagnum fimbriatum*** Wilson

**Parma:** Lago Capello (Provasi 1938)

***Sphagnum flexuosum*** Dozy & Molk.

**Parma:** Capanna Biancani (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Prati di Pranda (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena:** Lago di Pratignano (Ferrari et al. 1981; Tomaselli & Gerdol 1983; Gerdol & Tomaselli 1993; Tomaselli et al. 1994)

**DATI D'ERBARIO:** **Parma:** Valle della Cedra ai pascoli della Spilla, Bottini 1914 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976)

**ECOLOGIA:** Pascoli acquitrinosi (Raffaelli 1976)

**ALTITUDINE:** 1220-1250 m (Bottini 1919); 1290 m, 1307 m, 1570 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1250 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Bottini 1914)

**NOTE:** In letteratura esistono un paio di segnalazioni relative a *S. recurvum* P. Beauv. var. *majus* (Ångstr. ex Warnst.) Warnst. nella provincia di Parma ai Prati di Spilla (Bottini 1919; Provasi 1938) di significato ambiguo (si vedano le note di *S. fallax*) a cui è possibile si riferisca la segnalazione di Raffaelli

***Sphagnum girgensohnii*** Russow

**SINONIMI:** *Sphagnum girgensohnii* Russow var. *strictum* Russow

**Parma:** Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Tomaselli & Gerdol 1983); Lago Palo (Bottini 1919); Capanne Badignana, tra I Lagoni e il Lago Scuro (Tomaselli & Gerdol 1983; Gerdol & Tomaselli 1993); Passo del Fugicchio (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Bargetana (versante Nord del Monte Prado) (Tomaselli & Gerdol 1983) – **Modena:** Presso San Pellegrino, tra San Pellegrino e il Lago Santo, Sant'Anna Pelago sopra Casa Carzoli, al Fontanone e presso i Laghetti di Porticciola (Bottini 1919) – **Emilia:** Appennino emiliano (Levier 1901)

**DATI D'ERBARIO:** **Parma:** Lago Palo, Fitzgerald 1879 [FI] (Raffaelli 1976); Fitzgerald 1880 [FI] (Tomaselli & Gerdol 1983) – **Modena:** Presso San Pellegrino, Fiori 1885 [FI] (Raffaelli 1976); Tra San Pellegrino e il Lago Santo, Fiori 1885 [FI]-[PI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Piandelagotti sopra Casa Carzoli, Lunardi 1914 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Sant'Anna Pelago al Fontanone, Bottini 1912 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983), Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Sant'Anna Pelago presso il Laghetto di Porticciola, Lunardi 1915 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983), Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Sant'Anna Pelago alla Punta dello Spicchio, Lunardi 1918 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976)

**ECOLOGIA:** Lungo le acque (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Pascoli acquitrinosi, pascoli paludosi, in una palude, nei rigagnoli (Bottini 1919); Pascoli acquitrinosi (Raffaelli 1976)

**ALTITUDINE:** 1320 m, 1512 m, 1550 m, 1584 m (Bottini 1919); 1480 m, 1750 m (Tomaselli & Gerdol 1983); 1480 m, 1650 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1508 m (Raffaelli 1976 e Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Fitzgerald 1880); 1300 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Fiori 1885); 1550 m (Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Bottini 1912); 1600 m (Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Lunardi 1914); 1550 m, 1580 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 1250 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1918)

***Sphagnum inundatum*** Russow

**Piacenza:** Pratogrande di Granere (Razzara 1981) – **Parma:** Laghetto Gradina, Rigoso al Prataccio (Bottini 1919) – **Modena:** Piandelagotti a San Geminiano (Bottini 1914; Bottini 1919); Piandelagotti al Lagaccio Palandri, Piandelagotti sotto l'Imbrancamento, Sant'Anna Pelago sopra Casa Carzoli (Bottini 1919); Lago di Pratignano (Ferrari et al. 1981)

**DATI D'ERBARIO:** **Parma:** Laghetto Gradina, Martelli 1913 [FI] (Raffaelli 1976); Valle dell'Enza al Prataccio, Bottini 1914 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976) – **Modena:** Piandelagotti a Punta Cimetta, Lunardi 1915

[FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Piandelagotti ai Lagacci, Bottini 1917 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Sant'Anna Pelago alla Punta dello Spicchio, Lunardi 1918 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976)

*ECOLOGIA*: Pacoli paludosi (Bottini 1914; Bottini 1919); In una palude, negli stagni delle radure delle faggete, sul margine di uno stagno, negli acquitrini (Bottini 1919); Pascoli acquitrinosi (Raffaelli 1976)

*ALTITUDINE*: 1450 m (Bottini 1914; Bottini 1919); 1320 m (Bottini 1919); 1500 m (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Martelli 1913); 1130 m (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Bottini 1914); 1400 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 1300 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Bottini 1917); 1250 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1918)

### *Sphagnum magellanicum* Brid.

*SINONIMI*: *Sphagnum magellanicum* Brid. var. *laxum* Röhl

**Parma**: Sopra il Lago Santo (Bottini 1914; Bottini 1919); Padule del Lago Santo (Provasi 1938) – **Modena**: Sant'Anna Pelago (Piandelagotti) sopra Casa Carzoli (Bottini 1919); Sant'Anna Pelago alla Piana (Bottini 1919 citato in Tomaselli & Gerdol 1983); Lago di Pratignano (Ferrari et al. 1981; Tomaselli & Gerdol 1983; Gerdol & Tomaselli 1993; Tomaselli et al. 1994) – **Emilia**: Emilia (Raimondo & Dia 1978)

*DATI D'ERBARIO*: **Parma**: Tra il Lago Santo e il vertice del Monte Orsaro, Martelli 1913 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Martelli 1919 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983) – **Modena**: Piandelagotti sopra Casa Carzoli, Lunardi 1918 [PI] (Tomaselli & Gerdol 1983); Sant'Anna Pelago alla Punta dello Spicchio, Lunardi 1918 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Sant'Anna Pelago ai Piani, Barsali 1915 [FI]-[PI], (Raffaelli 1976)

*ECOLOGIA*: In uno stagno (Bottini 1914; Bottini 1919); In una conca paludosa, nei paludosi delle faggete (Bottini 1919); Pascoli acquitrinosi (Raffaelli 1976)

*ALTITUDINE*: 1600 m (Bottini 1914; Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Martelli 1913; Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Martelli 1919); 1320 m (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 1307 m (Tomaselli & Gerdol 1983; Gerdol & Tomaselli 1993); 1250 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1918); 1320 m (Tomaselli & Gerdol 1983, dati d'erbario Lunardi 1918);

*NOTE*: La segnalazione di Raimondo & Dia è derivata da fonti bibliografiche

### *Sphagnum palustre* L.

*SINONIMI*: *Sphagnum cymbifolium* (Ehrh.) Hedw.; *Sphagnum cymbifolium* (Ehrh.) Hedw. var. *squarrosulum* Nees & Hornsch.; *Sphagnum klinggraeffi* Röhl nom. illeg. incl. spec. prior.; *Sphagnum palustre* L. var. *pyncocladum* (Martenson) Röhl; *Sphagnum subbicolor* Hampe

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Sopra il Lago Santo, Laghetto Gradina (Bottini 1914; Bottini 1919); Prati di Spilla, Rigoso al Prataccio (Bottini 1919); Lago Capello, Padule del Lago Santo (Provasi 1938) – **Reggio Emilia**: Sotto il Lago Cerretano nei Prati di Pranda (Bottini 1919; Provasi 1938); Lago Gonella, Le Porraie (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena**: Piandelagotti sotto l'Imbrancamento e a Borabella (Bottini 1914; Bottini 1919); Piandelagotti a Ronco Bello e al Lagaccio del Bufalo (Bottini 1919); Lago di Pratignano (Ferrari et al. 1981; Gerdol & Tomaselli 1993) – **Bologna**: Presso Monteveglio sul Monte Avezzano verso la borgata Pradalbino (Bottini 1919)

*DATI D'ERBARIO*: **Parma**: Tra il Lago Santo e il vertice del Monte Orsaro, Martelli 1913 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Laghetto Gradina, Martelli 1913 [PI] (Raffaelli 1976); Valle della Cedra ai Pascoli della Spilla, Bottini 1914 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Valle dell'Enza al Prataccio, Bottini 1914 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976) – **Modena**: Piandelagotti a San Geminiano, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); A Punta Cimetta, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Ai Lagacci, Bottini 1917 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); A Ronco Bello, Lunardi 1917 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Sant'Anna Pelago alla Punta dello Spicchio, Lunardi 1918 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Monte Cimone a Pian Cavallaro, Lunardi 1922 [FI] (Raffaelli 1976) – **Bologna**: Monteveglio nei dintorni di Pradalpino, Maccagno s.d. [PI] (Raffaelli 1976)

*ECOLOGIA*: Nelle paludi, negli stagni e nei luoghi inondatai dei boschi (Bracciforti 1877); In un pascolo paludoso all'ombra dei cespugli di faggi (Bottini 1914); Nei pascoli paludosi delle radure delle faggete, in uno stagno (Bottini 1914; Bottini 1919); Nei paludosi, negli acquitrini (Bottini 1919); Pascoli acquitrinosi (Raffaelli 1976)

*ALTITUDINE*: 1500 m, 1600 m (Bottini 1914; Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Martelli 1913);



1300 m (Bottini 1914; Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1917); 1250 m (Bottini 1914; Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1918); 416 m, 1220-1280 m, 1250-1300 m (Bottini 1919); 1130 m (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Bottini 1914); 1307 m, 1489 m, 1720 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1400 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 1450 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 1700 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1922); 300 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Maccagno s.d.)

*NOTE:* I campioni utilizzati per le segnalazioni di Bottini e di Raffaelli per il bolognese sono stati raccolti entrambi da Maccagno. In Bottini (1919) è presente una segnalazione con l'indicazione "Prati acquitrinosi dell'Appennino" che riporta la seguente nota: "Il cartellino d'erbario non cita la Provincia ma verosimilmente si riferisce a quella di Parma"

*Sphagnum platyphyllum* (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.

*SINONIMI:* *Sphagnum subsecundum* Nees var. *robustum* (Warnst.) Cardot

**Parma:** Prato alla Spilla (Provasi 1938) – **Reggio Emilia:** Sotto il Lago Cerretano nei Prati di Pranda (Bottini 1919; Provasi 1938) – **Modena:** Piandelagotti a Ronco Bello (Bottini 1919)

*ECOLOGIA:* Nei pascoli paludosi, nelle fosse dei prati paludosi (Bottini 1919)

*ALTITUDINE:* 1300 m (Bottini 1919)

*Sphagnum rubellum* Wilson

**Modena:** Lago di Pratignano (Ferrari et al. 1981)

*Sphagnum russowii* Warnst.

**Parma:** Padule del Braiolo (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Lago Gonella (Gerdol & Tomaselli 1993)

*ALTITUDINE:* 1489 m, 1574 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

*Sphagnum squarrosum* Crome

**Parma:** Passo della Cisa, Padule del Braiolo, tra I Lagoni e il Lago Scuro, Passo del Fugicchio, Circo glaciale di Monte Bocco, Capanna Biancani (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Sotto il Lago Cerretano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) nei Prati di Pranda (Bottini 1919; Provasi 1938; Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena:** Lago di Pratignano, Piandelagotti a Ronco di Nicolò, Sant'Anna Pelago sotto la Punta dello Spicchio (Bottini 1919); Lago Turchino, Pieve Pelago sotto Foce a Giogo alla Borra (Bottini 1919; Raffaelli 1976); Lago Baccio (Bottini 1919; Raffaelli 1976; Gerdol & Tomaselli 1993); Circo glaciale di Monte (Lago) Turchino (Gerdol & Tomaselli 1993)

*DATI D'ERBARIO:* **Reggio Emilia:** Lago Cerretano, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Nei Prati di Pranda, Bottini 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976) – **Modena:** Lago Baccio, Lunardi 1915 [FI] (Raffaelli 1976); Foce a Giovo, Lunardi 1915 [FI] (Raffaelli 1976); Lago Turchino, Lunardi 1916 [FI] (Raffaelli 1976); Piandelagotti a Ronco di Nicolò, Lunardi 1916 [PI] (Raffaelli 1976); A Ronco Bello, Lunardi 1917 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Sant'Anna Pelago sotto la Punta dello Spicchio, Lunardi 1918 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976)

*ECOLOGIA:* Nei paludosi, sulle rive torbose di un lago, negli uliginosi, in una pianella paludosa, negli acquitrini, lungo i rigagnoli (Bottini 1919); Pascoli acquitrinosi (Raffaelli 1976)

*ALTITUDINE:* 1465 m, 1584 m, 1550-1600 m (Bottini 1919); 1300 m (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1917); 1465 m, 1550 m, 1600 m (Raffaelli 1976); 1107 m, 1290 m, 1480 m, 1554 m, 1570 m, 1574 m, 1650 m, 1600-1660 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1360 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 1250 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1918)

*Sphagnum subnitens* Russow & Warnst.

*SINONIMI:* *Sphagnum plumulosum* Röhl

**Parma:** Rigoso al Prataccio (Bottini 1919); Rocca Pumaciolo (Versante Nord-Est) (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Reggio Emilia:** Monte Vecchio versante Nord, Pian Vallese (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena:** Circo glaciale di Monte (Lago) Turchino, Lago di Pratignano (Gerdol & Tomaselli 1993)

*DATI D'ERBARIO:* **Parma:** Valle dell'Enza al Prataccio, Bottini 1914 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976)

*ECOLOGIA*: Negli acquitrini (Bottini 1919); Pascoli acquitrinosi (Raffaelli 1976)

*ALTITUDINE*: 1130 (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Bottini 1914); 1300 m, 1307 m, 1600-1660 m, 1780 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

***Sphagnum subsecundum*** Nees

**Parma**: Laghetto Gradina (Bottini 1914); Sopra il Lago Santo (Bottini 1914; Bottini 1919); Prati di Spilla (Bottini 1919; Provasi 1938); Lago di Rocca Pianaccia, Padule del Lago Santo (Provasi 1938); Padule del Braiola, Capanne Badignana, tra I Lagoni e il Lago Scuro, Passo del Fugicchio, Rocca Pumaciolo versante Nord-Est, Colla Val di Tacca, fra Passo Paitino e Lago Rocca Pianaccia, Circo glaciale di Monte Bocco, Capanna Biancani (Gerdol & Tomaselli 1993); Alta Val Parma e Cedra (Ferrari 2002b) – **Reggio Emilia**: Sopra Gabellina nei Prati Spinaccio (Bottini 1919); Sopra Gabellina nei Prati di Pranda, Lago Cerretano (Bottini 1919; Provasi 1938); Lago Gora, Lago Gonella, Prati di Pranda (Gerdol & Tomaselli 1993); Alto Appennino reggiano (Ferrari 2002a) – **Modena**: Piandelagotti sotto l'Imbrancamento, al Lagaccio Palandri, a San Geminiano e sotto Punta Cimetta (Bottini 1914; Bottini 1919); Piandelagotti al Lagaccio del Bufalo, sotto Punta Cimetta nello stagno della Bocca del Fornello, Sant'Anna Pelago sopra Casa Carzoli, Valle del Dolo a Maccaria, Piandelagotti a Ronco Bello, a Ronco di Nicolò, Sant'Anna Pelago ai Piani (Bottini 1919); Le Maccherie, Prati di San Geminiano, Lago di Pratignano (Gerdol & Tomaselli 1993); Alto Appennino modenese (Tomaselli et al. 1994) – **Emilia**: Emilia (Raimondo & Dia 1978)

*DATI D'ERBARIO*: **Parma**: Tra il Lago Santo e il vertice del Monte Orsaro, Martelli 1913 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Laghetto Gradina, Martelli 1913 [FI] (Raffaelli 1976); Valle della Cedra ai Pascoli della Spilla, Bottini 1914 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Valle dell'Enza al Prataccio, Bottini 1914 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976) – **Reggio Emilia**: Nei Prati di Pranda, Bottini 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Lago Cerretano, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Gabellina nei Prati Spinaccio, Lunardi 1915 [FI] (Raffaelli 1976) – **Modena**: Piandelagotti a San Geminiano Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); A Punta Cimetta, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Valle del Dolo a Maccaria, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Sant'Anna Pelago ai Piani, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Piandelagotti a Ronco di Nicolò, Lunardi 1916 [PI] (Raffaelli 1976); Ai Lagacci, Bottini 1917 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); A Ronco Bello, Lunardi 1917 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Sant'Anna Pelago alla Punta dello Spicchio, Lunardi 1918 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976)

*ECOLOGIA*: Negli stagni delle radure delle faggete, nei pascoli paludosi, sul margine di uno stagno (Bottini 1914); In uno stagno, in una palude, nelle radure paludose delle faggete (Bottini 1914; Bottini 1919); Negli acquitrini scoperti, nei paludosi, sulle rive torbose di un lago (Bottini 1919); Pascoli acquitrinosi, acquitrini (Raffaelli 1976)

*ALTITUDINE*: 1230 m, 1350 m, 1450 m (Bottini 1914); 1550 m (Bottini 1914; Bottini 1919); 1300 m (Bottini 1914; Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1917); 1200 m, 1220-1250 m, 1310 m (Bottini 1919); 1600 m (Bottini 1914; Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Martelli 1913); 1500 m (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 1100 m (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 1320 m (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 1250 m (Bottini 1919; Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1917); 1290 m, 1307 m, 1370 m, 1425 m, 1470 m, 1480 m, 1489 m, 1550 m, 1570 m, 1574 m, 1650 m, 1700 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1130 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Bottini 1914); 1360 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915); 1400 m, 1450 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1915)

*NOTE*: La segnalazione di Raimondo & Dia è derivata da fonti bibliografiche

***Sphagnum teres*** (Schimp.) Ångstr.

*SINONIMI*: *Sphagnum squarrosulum* Crome var. *squarrosulum* Schimp.; *Sphagnum teres* (Schimp.) Ångstr. var. *squarrosulum* (Schimp.) Warnst.; *Sphagnum teres* (Schimp.) Ångstr. var. *strictum* Cardot; *Sphagnum teres* (Schimp.) Ångstr. var. *subteres* (Lindb.) Röhl

**Parma**: Monte Orsajo, Rigoso (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Prati di Spilla (Bottini 1919; Provasi 1938); Passo della Cisa, tra I Lagoni e il Lago Scuro (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Modena**: Sopra il Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Sant'Anna Pelago ai Piani, sotto la Punta dello Spicchio e sopra Casa Carzoli (Bottini 1919); Sotto il vertice del Rondinajo (Bottini 1919; Provasi 1926);

Lago Pratignano (Provasi 1926; Corbetta 1973); Lago Turchino (Bottini 1919; Raffaelli 1976) presso la Foce a Giovo (Fiori 1886); Pieve Pelago alla Borra di Foce a Giovo (Bottini 1919; Raffaelli 1976); Tra il Lago Baccio e la cima del Rondinaio, Borra al Fosso (Raffaelli 1976); Lago di Pratignano (Ferrari et al. 1981); Lago Baccio (Bottini 1919; Provasi 1926; Raffaelli 1976; Raffaelli et al. 1997)

**DATI D'ERBARIO:** **Parma:** Valle della Cedra ai Pascoli della Spilla, Bottini 1914 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976) –

**Modena:** Tra il Lago Baccio e la cima del Rondinaio, Lunardi 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Foce a Giovo, Lunardi 1915 [FI] (Raffaelli 1976); Sant'Anna Pelago ai Piani, Barsali 1915 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Lago Baccio, Lunardi 1916 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Piandelagotti a Ronco Bello, Lunardi 1917 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976); Sant'Anna Pelago sotto la Punta dello Spicchio, Lunardi 1918 [FI]-[PI] (Raffaelli 1976)

**ECOLOGIA:** Nei paludosi, sul margine torboso di un lago, negli acquitrini (Bottini 1919); Pascoli acquitrinosi (Raffaelli 1976)

**ALTITUDINE:** 1800 m (Fitzgerald & Bottini 1881; Bottini 1919); 1200 m, 1220 m, 1220-1250 m, 1584 m, 1690 m (Bottini 1919); 1320 m (Bottini 1919; Raffaelli 1976, Barsali 1915, Lunardi 1915); 1465 m, 1600 m (Bottini 1919; Raffaelli 1976); 1550 m, 1650 m (Raffaelli 1976); 1107 m, 1480 m (Gerdol & Tomaselli 1993); 1300 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1917); 1250 m (Raffaelli 1976, dati d'erbario Lunardi 1918)

**NOTE:** Provasi (1926) cita anche la stazione del Lago Turchino sulla base del lavoro di Fitzgerald & Bottini (1881) ma in realtà la segnalazione non è presente in quella pubblicazione

### *Splachnum* Hedw. (Splachnaceae)

#### *Splachnum ampullaceum* Hedw.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Ferrara:** Paludi ferraresi (Zangheri 1925)

**ECOLOGIA:** Vegeta nei siti torbosi, sulla terra nuda, sullo sterco vaccino (Bracciforti 1877)

### *Straminergon* Hedenäs (Calliergonaceae)

#### *Straminergon stramineum* (Dicks. ex Brid.) Hedenäs

**SINONIMI:** *Calliergon stramineum* (Dicks. ex Brid.) Kindb.; *Hypnum stramineum* Dicks. ex Brid.

**Parma:** Sopra il Lago Palo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Modena:** Prati di San Geminiano (Gerdol & Tomaselli 1993) – **Bologna:** Vallata del Dardagna al Cavone del Corno alle Scale (Farneti 1889)

**ECOLOGIA:** In luogo inondato (Fiori 1886)

**ALTITUDINE:** 1400 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1470 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

### *Syntrichia* Brid. (Pottiaceae)

#### *Syntrichia laevipila* Brid.

**SINONIMI:** *Barbula laevipila* (Brid.) Garov.; *Syntrichia laevipila* Brid. var. *laevipilaeformis* (De Not.) J.J. Amann; *Tortula laevipila* (Brid.) Schwägr.; *Tortula laevipila* (Brid.) Schwägr. var. *laevipilaeformis* (De Not.) Limpr.

**Bologna:** Bologna all'Archiginnasio (Bertoloni 1859); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Forlì-Cesena:** Forlì (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Vecchiazzano, Ladino (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950)

**ECOLOGIA:** Sui muri (Bertolini 1859); Sui tronchi (Zodda 1921); Cortece (Zangheri 1966b)

#### *Syntrichia montana* Nees

**SINONIMI:** *Barbula intermedia* (Brid.) Milde; *Tortula montana* (Nees) Lindb. *hom. illeg.*

**Parma:** Montagnana, Monte Prinzerà (Avetta 1897) – **Bologna:** Bologna a Gaibola e a Monte Donato (Farneti 1889 citato in Fiori 1892b); Gessi bolognesi (Cobau 1932); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena:** Castrocaro località Cozzi, San Giovanni in Galilea (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Sui gessi (Farneti 1889); Rocce calcaree, gessose e sfaticci (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

***Syntrichia norvegica*** F. Weber

*SINONIMI*: *Barbula aciphylla* Bruch & Schimp.

**Reggio Emilia**: Le Forbici alle sorgenti del Dolo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886 e in Casali 1899b)

*ECOLOGIA*: Sul macigno (Casali 1899b)

*ALTITUDINE*: 1500 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Casali 1899b)

***Syntrichia papillosa*** (Wilson) Jur.

*SINONIMI*: *Tortula papillosa* Wilson

**Ravenna**: Persolino presso Faenza (Del Testa 1903); Indicata per i dintorni di Faenza (Zodda 1921) – **Forlì-Cesena**: Presso Forlì (Zodda 1921); Villagrappa, Selbagnone (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Sui tronchi (Zodda 1921); Cortecce (Zangheri 1966b)

***Syntrichia princeps*** (De Not.) Mitt.

*SINONIMI*: *Barbula muelleri* Bruch & Schimp.; *Tortula princeps* De Not.

**Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena**: San Giovanni in Galilea (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Sui gessi (Zangheri 1959); Rocce calcaree e gessifere (Zangheri 1966b)

***Syntrichia ruralis*** (Hedw.) F. Weber & D. Mohr var. *ruralis*

*SINONIMI*: *Barbula ruralis* Hedw.; *Tortula ruralis* (Hedw.) P. Gaernt, B. Mey. & Schreb.

**Piacenza**: Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma**: Berceto (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Colli di Casalgrande, Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Sant'Antonino presso Sassuolo (Fiori 1892b); Cerè Marabino, Laguigno, Roncocesi (Casali 1899b); Passo della Cisa, Abetina Reale, Monte Ravino, Monte Cusna (Velluti 1993); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) ai contrafforti del Castello di Borzano (Aleffi 2016); SIC Gessi Triassici (Aleffi 2016) – **Modena**: Monte Cantiere di Barigazzo, Montefiorino, Dintorni di Fiumalbo (Fiori 1886); Modena (Fiori 1886; Fiori 1892b); Casinalbo (Fiori 1892b) – **Bologna**: Corno alle Scale (Bertoloni 1844); Bologna (Bertoloni 1859 citato in Farneti 1889); Madonna dell'Acerò (Lange 1868; Lange 1875; Fiori 1866); Gaibola, Mongardino, Vallata del Sela a Lizzano, Vallata del Dardagna a Rocca Corneta e a Chiesina (Farneti 1889); Gessi bolognesi (Cobau 1932); Croara/Miserazzano (Ferrari 1974); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Persolino presso Faenza (Del Testa 1903); Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); Bardello (Piccoli & Merloni 1989); Duna di Marina Romea (Brullo et al. 1991); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) al Monte della Volpe, a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena**: Poggio Gabrendo (Pichi & Bottini 1888); Castrocaro (Del Testa 1903); Giardino pubblico di Forlì (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Monte Casale (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Castrocaro località Cozzi (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Monte Trebbio, Colle del Carnaio, Campigna, Monte Fumajolo (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Rimini**: SIC Onferno (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016); **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sulle mura (Bertoloni 1859); Sui tetti delle case umide e basse, delle catapecchie, delle capanne ecc. (Bracciforti 1877); Sulle mura, sui gessi, sulle marne (Farneti 1889); Sopra gli aceri, sopra gli alberi (Fiori 1892b); Sui muri a secco (Avetta 1897); Sui muri e le rupi, sul terreno ed al piede degli alberi, dai colli all'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b); Sulle rocce (Del Testa 1903); Sul calcare, sui gessi (Zangheri 1959); Terreno generalmente calcareo, muri, rocce calcaree e gessifere, ceppi (Zangheri 1966b); Suolo e arenaria in un faggeto, suolo in una prateria discontinua su detriti marnosi (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1460 m, 1500 m, 1600 m, 1800 m, 1850 m (Velluti 1993); Dai colli all'Appennino (Fiori 1886)

*NOTE*: Sono da ricondurre a questa specie le segnalazioni di Fiori (1886) relative a *Barbula laevipila* (Fiori 1892b)

*Syntrichia ruralis* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr var. *ruraliformis* (Besch.) Delogne

**SINONIMI:** *Syntrichia ruraliformis* (Besch.) Mans.; *Tortula ruraliformis* (Besch.) W. Ingham; *Tortula ruralis* (Hedw.) P. Gaernt, B. Mey. & Schreb. subsp. *ruraliformis* (Besch.) Dixon

**Bologna:** Gessi bolognesi a Miserazzano (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) – **Ferrara:** Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Ravenna:** Sasso (Zangheri 1959); Monte Mauro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); Duna di Marina Romea (Brullo et al. 1991); Bardello (Piccoli & Merloni 1989; Lazzari et al. 2008); Dune e retroduna della costa ravennate (Lazzari et al. 2008); Porto Corsini, Duna costiera ravennate e foce Torrente Bevano, Pinete di Ravenna (Lazzari et al. 2009); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Monte Mauro e a Sasso (inedito) – **Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
**ECOLOGIA:** Sui gessi (Zangheri 1959); Su roccia calcarea (Aleffi & Silenzi 2000)

**NOTE:** In letteratura esiste anche una segnalazione di cui non è possibile stabilire con precisione la localizzazione trattandosi di uno studio vegetazionale comprendente parte della zona costiera del Veneto e, per l'Emilia-Romagna, delle provincie di Ferrara e Ravenna ed in cui non vengono riportate in dettaglio le località di rinvenimento (Gerdol & Piccoli 1984)

*Taxiphyllum* M. Fleisch. (Hypnaceae)

*Taxiphyllum wissgrillii* (Garov.) Wijk & Margad.

**Bologna:** Gessi bolognesi a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000)

**ECOLOGIA:** Su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

*Tetraplodon* Bruch & Schimp. (Splachnaceae)

*Tetraplodon angustatus* (Hedw.) Bruch & Schimp.

**SINONIMI:** *Splachnum angustatum* Hedw.

**Ferrara:** Nelle paludi ferraresi (Zangheri 1925)

*Thamnobryum* Nieuwl. (Neckeraceae)

*Thamnobryum alopecurum* (Hedw.) Gangulee

**SINONIMI:** *Thamnium alopecurum* (Hedw.) Schimp.; *Thamnobryum alopecurum* (Hedw.) Gangulee var. *cavernarum* (Hedw.) Bruch & Schimp.

**Reggio Emilia:** SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Modena:** Varana (Fiori 1886) – **Bologna:** Buca della Spipola presso Bologna (Fiori 1886); Gessi bolognesi al Buco dei Buoi, al Buco del Budriolo e a Acquafredda (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) a Gaibola e a Spipola e nella Valle dell'Acquafredda (Aleffi 2016) – **Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Rimini:** SIC Onferno (Aleffi et al. 2014)

**ECOLOGIA:** In una fessura del serpentino (Fiori 1886); Su terreno e su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*Thuidium* Bruch & Schimp. (Thuidiaceae)

*Thuidium assimile* (Mitt.) A. Jaeger

**Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11732-2 (Fariselli et al. 2017)

*Thuidium delicatulum* (Hedw.) Schimp.

**Ravenna:** Castelraniero (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Terra (Zangheri 1966b)

*Thuidium recognitum* (Hedw.) Lindb.

**Parma:** Lago Ballano (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1938) – **Reggio Emilia:** La

Veggia presso Sassuolo, Colli di San Valentino (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Albinea (Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014) – **Modena:** Montegibbio, Casinalbo (Fiori 1886) – **Bologna:** Vallata del Dardagna a Rocca Corneta (Farneti 1889) – **Forlì-Cesena:** Polenta (Zangheri 1966b)  
**ECOLOGIA:** Nei boschi e lungo le rive (Fiori 1886; Casali 1899b); Terreno castagneti (Zangheri 1966b)  
**ALTITUDINE:** 1300 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

***Thuidium tamariscinum*** (Hedw.) Schimp.

**SINONIMI:** *Hypnum tamariscinum* Hedw.

**Piacenza:** Provincia di Piacenza (Bracciforti 1877) – **Parma:** Collecchio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Vetto, Montemiscoso, Selvapiana (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Bologna:** Monte Donato (Cocconi 1881; Farneti 1889); Vallata del Dardagna a Rocca Corneta (Farneti 1889 citato in Fiori 1892b) – **Forlì-Cesena:** Colli di Cesena (Del Testa 1903); Poggio Appennino presso Civitella (Zodda 1921); Predappio, Ricò (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Monte Ajola (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Appennino romagnolo (Del Testa 1903); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
**ECOLOGIA:** Nei boschi (Bracciforti 1877; Casali 1899a; Casali 1899b); Nei boschi ombrosi (Avetta 1897); Sul terreno nei luoghi freschi ombreggiati (Del Testa 1903); In un bosco di castagno (Zodda 1921); Terra (Zangheri 1966b)

***Timmia*** Hedw. (Timmiaceae)

***Timmia austriaca*** Hedw.

**Modena:** Lago Scaffajolo (Fiori 1886)

**ECOLOGIA:** Pascoli (Fiori 1886)

***Timmiella*** (Lindb.) Limpr. (Pottiaceae)

***Timmiella anomala*** (Bruch & Schimp.) Limpr.

**Ravenna:** Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Pineta di Classe (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito) – **Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950)

**ECOLOGIA:** Sui gessi (Zangheri 1959); Terra, rocce gessifere (Zangheri 1966b)

***Tomentypnum*** Loeske (Brachytheciaceae)

***Tomentypnum nitens*** (Hedw.) Loeske

**SINONIMI:** *Homalothecium nitens* (Hedw.) H. Rob.

**Piacenza:** Pratogrande di Granere (Razzara 1981) – **Parma:** Paduli di Cima (Gerdol & Tomaselli 1993)

**ALTITUDINE:** 1200 m (Gerdol & Tomaselli 1993)

***Tortella*** (Müll. Hal.) Limpr. (Pottiaceae)

***Tortella bambergeri*** (Schimp.) Broth.

**Ravenna:** Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b)

**ECOLOGIA:** Sulla roccia gessifera (Zangheri 1959); Gessi (Zangheri 1966b)

***Tortella flavovirens*** (Bruch) Broth. var. ***flavovirens***

**SINONIMI:** *Trichostomum flavovirens* Bruch

**Bologna:** Gessi bolognesi (Cobau 1932); Croara/Miserazzano (Ferrari 1974); Gessi bolognesi a Miserazzano (Aleffi & Silenzi 2000; Pellis et al. 2014; Aleffi 2016); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-4, 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Emilia:** Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950) – **Ravenna:** Sasso (Zangheri

1959); Rivola, Monte Mauro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); Pineta di Cervia (Zangheri 1966b); Bardello, Dune e retroduna costa ravennate (Lazzari et al. 2008); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Monte Mauro, a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena**: Predappio (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Civitella di Romagna, Monte Aiola (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sul conglomerato calcareo, sulle rocce gessifere (Zangheri 1959); Terra, fessure rocce, calcari, conglomerati, gessi (Zangheri 1966b); Su gesso (Aleffi & Silenzi 2000); Al suolo (Fariselli 2015)

***Tortella humilis*** (Hedw.) Jenn.

*SINONIMI*: *Barbula caespitosa* Schwaegr.

**Modena**: Montegibbio, Montebanzone (Fiori 1892b) – **Bologna**: Monte Paderno (Fiori 1886); Nota per il bolognese (Fiori 1892b) – **Ravenna**: Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA*: Nei boschetti di pini (Fiori 1892b); Al suolo (Fariselli 2015)

***Tortella inclinata*** (R. Hedw.) Limpr. var. *inclinata*

*SINONIMI*: *Barbula inclinata* (R. Hedw.) Schwägr.

**Reggio Emilia**: Colli di Casalgrande, Colli di Scandiano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: Monteciccio, Vallurbana (Fiori 1886) – **Bologna**: Bologna (Bertoloni 1859 citato in Farneti 1889); Barbiano (Cocconi 1881); Crovara presso Bologna (Fiori 1886); Mongardino, Vallata del Dardagna alla Chiesina e ai Monti della Riva (Farneti 1889); Gessi bolognesi (Cobau 1932); Croara/Miserazzano (Ferrari 1974); Gessi bolognesi al Buco del Budriolo e al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Pineta di Classe (Zangheri 1966b); Duna di Marina Romea e di Casalborsetti (Brullo et al. 1991); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena**: Castrocaro località Cozzi (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009)

*ECOLOGIA*: Nelle argille scagliose (Fiori 1886; Casali 1899b); Nelle fessure della roccia calcarea, sui gessi (Zangheri 1959); Terreno, fessure rocce calcaree, gessi (Zangheri 1966b); Su roccia, su gesso al margine di una dolina (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: Nei colli (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Tortella inclinata*** (R. Hedw.) Limpr. var. *densa* (Lorentz & Molendo) Limpr.

*SINONIMI*: *Tortella densa* (Lorentz & Molendo) Crundw. & Nyholm

**Reggio Emilia**: SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Bologna**: Gessi bolognesi al Buco dei Quercioli (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014)

*ECOLOGIA*: Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

***Tortella inflexa*** (Bruch) Broth.

**Bologna**: Gessi bolognesi al Buco del Budriolo, alla Grotta della Spipola e sulla via della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014)

*ECOLOGIA*: Su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

***Tortella nitida*** (Lindb.) Broth.

*SINONIMI*: *Barbula nitida* (Lindb.) Renaud; *Trichostomum nitidum* (Lindb.) Schimp.

**Modena**: Fajè sopra Campo di Lolio (Fiori 1886); Colli del Modenese (Venturi 1886) – **Bologna**: Bologna a Gaibola (Farneti 1889); Gessi bolognesi al Buco dei Vinchi e a Miserazzano (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) – **Emilia**: Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950) – **Forlì-Cesena**: San Savino (Zangheri 1966b) presso Casa Trove

(Zodda 1921); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)  
**ECOLOGIA:** Sopra un sasso nei castagneti (Fiori 1886); Sui gessi (Farneti 1889); In un bosco di querce (Zodda 1921); Terra (Zangheri 1966b); Su terreno, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

***Tortella squarrosa*** (Brid.) Limpr.

**SINONIMI:** *Barbula squarrosa* Brid.; *Pleurochaete squarrosa* (Brid.) Lindb.

**Reggio Emilia:** Rivalta, Villa San Maurizio lungo il Rodano (Casali 1899a; Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano ai contrafforti del Castello di Borzano (Aleffi 2016) – **Modena:** Orto Botanico di Modena, Argine della Secchia a Freto, Montegibbio (Fiori 1886) – **Bologna:** Zola nella provincia di Bologna (Fiori 1886); Gessi bolognesi a Acquafredda, al Buco del Budriolo, al Buco della Gaibola e a Monte Castello (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) a Miserazzano (Pellis et al. 2014; Aleffi 2016) e all'ex cava a Filo (Aleffi 2016); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ferrara:** Bosco della Mesola (Piccoli et al. 1983) – **Ravenna:** Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Pineta di San Vitale, Pineta di Classe (Zangheri 1966b); Dune di Marina Romea e di Casalborsetti (Brullo et al. 1991); Bardello, Dune e retroduna della costa ravennate (Lazzari et al. 2008); Porto Corsini, Duna costiera ravennate e foce Torrente Bevano, Pinete di Ravenna (Lazzari et al. 2009); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena:** Colli di Cesena a San Demetrio (Del Testa 1903); Ladino, Monte Casale (Zodda 1921; Zangheri 1966b); San Martino in Strada, Scardavilla, Castrocara località Cozzi (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Rimini:** SIC Onferno (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Nei luoghi erbosi, sopra gli argini e nei prati (Fiori 1886); Nei luoghi erbosi (Casali 1899a; Casali 1899b); Sul terreno nei luoghi selvatici (Del Testa 1903); In un bosco di querce (Zodda 1921); Sulla roccia gessifera (Zangheri 1959); Terra, ceppi, rocce calcaree e gessifere (Zangheri 1966b); Su roccia calcarea e su gesso, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000); Al suolo (Fariselli 2015)

**NOTE:** In letteratura esiste anche una segnalazione di cui non è possibile stabilire con precisione la localizzazione trattandosi di uno studio vegetazionale comprendente parte della zona costiera del Veneto e, per l'Emilia-Romagna, delle provincie di Ferrara e Ravenna ed in cui non vengono riportate in dettaglio le località di rinvenimento (Gerdol & Piccoli 1984)

***Tortella tortuosa*** (Hedw.) Limpr. var. *tortuosa*

**SINONIMI:** *Barbula tortuosa* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr; *Tortula tortuosa* Hedw.

**Parma:** Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Lago Ballano (Fiori 1892b); Rondebocco, Monte Prinzerà (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** San Valentino (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Le Forbici (Bottini 1913); Passo della Cisa, Pian Vallese, Abetina Reale, Monte Ravino, Monte Cusna, Monte Prado (Velluti 1993); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Modena:** Montebaranzone, Monte Modino di Frassinoro, Campo di Lolio verso Serramazzone (Fiori 1886); Rondinajo (Fiori 1892b) – **Bologna:** Santuario dell'Acero (Fiori 1886); Bologna a Gaibola (Farneti 1889); Gessi bolognesi (Cobau 1932); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11633-4, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Pineta di Classe (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena:** Comero (Del Testa 1903); San Savino (Zangheri 1966b) presso Casa Trove (Zodda 1921); Civitella di Romagna, Spinello, Cabelli, Colle Tre Faggi, Campigna, Pian delle Fontanelle, Monte Falco, Burraia di Campigna, Balze località Scalette (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Sui gessi (Farneti 1889); Nelle fessure dei sassi e sul terreno nei boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sul terreno, nelle faggete (Del Testa 1903); In un bosco di castagno (Zodda 1921); Terra, ceppi, rocce calcaree (Zangheri 1966b); Suolo e arenaria in un faggeto e in un nardeto, suolo in una prateria



discontinua di crinale (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1550 m (Bottini 1913); 1284 m, 1460 m, 1500 m, 1600 m, 1700 m, 1850 m, 1950 m, 2050 m (Velluti 1993); Dai colli fino all'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*NOTE*: Le segnalazioni di Fiori per il Lago Ballano ed il Monte Rondinaio erano state in un primo momento attribuite a *Tortella fragilis* (Fiori 1886)

*Tortula* Hedw. (Pottiaceae)

*Tortula acaulon* (With.) R.H. Zander var. *acaulon*

*SINONIMI*: *Phascum acaulon* L.; *Phascum cuspidatum* Hedw.

**Parma**: Strada di circonvallazione di Parma (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Reggio, Dintorni di Reggio, Quattro Castella, Albinea (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena**: Dintorni di Modena, Orto Botanico di Modena, Colli di Sassuolo, Casinalbo (Fiori 1886) – **Bologna**: Dintorni di Bologna (Fiori 1886) – **Forlì-Cesena**: Forlì (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Ajuole (Fiori 1886); In una terriciata (Avetta 1897); Sulla terra nuda, nei campi, lungo le vie ecc. (Fiori 1886; Casali 1899b); Terreno (Zangheri 1966b)

*Tortula atrovirens* (Sm.) Lindb.

*SINONIMI*: *Desmatodon atrovirens* (Sm.) Jur.

**Bologna**: Gessi bolognesi al Buco del Budriolo, al Buco della Gaibola e a Miserazzano (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) – **Ravenna**: Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena**: Dintorni di Cesena (Del Testa 1903)

*ECOLOGIA*: Sullo sfaticcio e sulla roccia gessifera (Zangheri 1959); Suolo e rocce gessifere (Zangheri 1966b); Su roccia calcarea e su gesso, su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*Tortula canescens* Mont.

**Forlì-Cesena**: Monte dei Cappuccini di Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b) –

**Romagna**: Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950)

*ECOLOGIA*: Suolo calcareo (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 300 m (Zodda 1921)

*Tortula caucasica* Broth.

*SINONIMI*: *Pottia intermedia* (Turner) Fürnr.

**Reggio Emilia**: Montebabbio, Monte del Gesso a Scandiano, Sant'Antonino presso Sassuolo (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Vezzano sul Crostolo (Casali 1899b) – **Modena**: Torre della Majna a Gorzano (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Arenarie (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Nei campi lungo le vie, specialmente in collina (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Tortula cuneifolia* (Dicks.) Turner

**Reggio Emilia**: SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) nei contrafforti del Castello di Borzano (Aleffi 2016) – **Bologna**: SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) nell'altipiano di Miserazzano (Pellis et al. 2014)

*Tortula hoppeana* (Schultz) Ochyra

*SINONIMI*: *Desmatodon latifolius* (Hedw.) Brid.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886)

*Tortula inermis* (Brid.) Mont.

**Bologna**: Barbiano, Bastia di Savena (Cocconi 1881) – **Forlì-Cesena**: Forlì, San Varano (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Terreno, ceppi, roccia calcarea (Zangheri 1966b)

***Tortula lindbergii*** Broth.

*SINONIMI*: *Pottia lanceolata* (Hedw.) Müll. Hal.; *Pottia lanceolata* (Hedw.) Müll. Hal. var. *leucodonta* Schimp.

**Parma**: Parma, Vigheffio (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Monte del Gesso a Scandiano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Albinea, Pecorile, Quattro Castella (Casali 1899b) – **Modena**: Orto Botanico di Modena, lungo la fossa di Spezzano, Varana, Colli di Sassuolo, Montese (Fiori 1886) – **Bologna**: Gessi bolognesi (Cobau 1932); Croara/Miserazzano (Ferrari 1974); Gessi bolognesi a Palestrina (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-2, 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena**: Dintorni di Cesena (Del Testa 1903); Nota per i dintorni di Cesena (Zodda 1921); Monte dei Cappuccini di Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); San Martino in Strada, Colmano (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Sui muri (Avetta 1897); Sopra gli argini, nei campi lungo le vie ecc. (Fiori 1886; Casali 1899b); Margini dei campi (Del Testa 1903); Sullo sfaticcio calcareo, sui gessi (Zangheri 1959); Terreno calcareo, rocce gessifere (Zangheri 1966b); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

*ALTITUDINE*: Tanto in pianura che nei monti (Fiori 1886; Casali 1899b)

***Tortula muralis*** Hedw.

*SINONIMI*: *Barbula muralis* Hedw.; *Tortula muralis* Hedw. f. *incana* (Bruch & Schimp.) Sapjegin; *Tortula muralis* Hedw. f. *obcordata* (Schimp.) Mönk.; *Tortula muralis* Hedw. var. *obcordata* (Schimp.) Limpr.; *Tortula muralis* Hedw. f. *rupestris* (A. Chev.) Sapjegin; *Tortula muralis* Hedw. var. *rupestris* A. Chev.

**Parma**: Orto Botanico di Parma, Monte Prinzerà, Torrechiara (Avetta 1897); Ottagono della Villetta (Bouvet 2008) – **Reggio Emilia**: Dintorni di Reggio, Quattro Castella, Albinea al Castello, Rossena, Montemiscoso (Casali 1899a; Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Modena**: Orto Botanico di Modena, Casinalbo, Montebanzzone (Fiori 1886) – **Bologna**: Bologna (Bertoloni 1859); Margini della strada che dalla Sella conduce alla Porretta (Bertoloni 1865); Campi di Lustrola (Bertoloni 1865; Cocconi 1881); Monte della Croce sopra il bagno Donzelle, via provinciale di Porretta presso il paese (presso il ponte della Sella), Corno alle Scale (Cocconi 1881); Provincia di Bologna (Farneti 1889); Gessi bolognesi (Cobau 1932); Gessi bolognesi a Siberia e a Palestrina (Aleffi & Silenzi 2000); San Lazzaro di Savena nell'altipiano di Miserazzano (Pellis et al. 2014); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Tossignano (inedito); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11633-4, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Persolino presso Faenza, Fagnano, Faenza (Del Testa 1903); Sasso (Zangheri 1959); Rivola, Zattaglia (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Monte Mauro, a Monte della Volpe, a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena**: Castrocaro, Comero, Dintorni di Cesena (Del Testa 1903); Monte Codruzzo (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959); Casticciano (Zodda 1921); Bertinoro (Del Testa 1903 citato in Zangheri 1959; Zodda 1921); Giardino pubblico di Forlì, Ladino (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Monte dei Cappuccini di Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Castrocaro località Cozzi, Monte Casale, San Giovanni in Galilea (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Cappuccinini (Forlì), Bussecchio, Ronco, San Martino Villafranca, Vecchiuzzano, Villanova di Forlì, Terra del Sole, Bagnolo di Castrocaro, Colmano, Collina (Forlì), Castelnuovo di Meldola, Petrignone, Taibo, Sadurano, San Benedetto in Alpe, Monte Ajola, Campigna (Zangheri 1966b) – **Rimini**: SIC Onferno (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Romagna**: Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sulle rupi, sulle macerie e sui muri, margini della strada (Bertoloni 1865); Sui muri, i sassi e le rupi (Fiori 1886); Sulle pietre e sui muri (Avetta 1897); Sui sassi e sui muri (Casali 1899a; Casali 1899b); Sui calcari travertinosi del miocene (Del Testa 1903); Sopra terreno calcareo, sui muri (Zodda 1921); Sullo sfaticcio calcareo, sul calcare, sulla roccia gessifera, sui gessi (Zangheri 1959); Terreno, muri, calcinacci, rocce calcaree e gessose, ceppi ecc. (Zangheri 1966b); Su roccia (Aleffi & Silenzi 2000)

**ALTITUDINE:** Al piano e all'Appennino (Fiori 1886); Al piano, al colle e al monte (Casali 1899a; Casali 1899b)

***Tortula muralis*** Hedw. var. ***aestiva*** Brid. ex Hedw.

**Forlì-Cesena:** Monte presso Cesena (Del Testa 1903)

**ECOLOGIA:** Su terreno sabbioso (Del Testa 1903)

***Tortula muralis*** Hedw. subsp. ***obtusifolia*** (Schwagr.) Culm.

**SINONIMI:** *Tortula obtusifolia* Schwägr.

**Ravenna:** Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola e a Sasso (inedito)

**ECOLOGIA:** Sui gessi (Zangheri 1959)

***Tortula protobryoides*** R.H. Zander

**SINONIMI:** *Phascum bryoides* Dicks.

**Parma:** Orto Botanico di Parma, alveo della Baganza (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Dintorni di Reggio, Correggio, Bagnolo in Piano, Quattro Castella, Albinea, Borzano (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena:** Modenese (Venturi 1885b); Dintorni di Modena; Orto Botanico di Modena, Casinalbo, Ubersetto sopra Formigine, Torre della Maina (Fiori 1886); Nel Modenese (Venturi 1886); Campagne di Modena (Venturi 1899)

**ECOLOGIA:** Ajuole (Fiori 1886); Lungo le vie e nei campi, in pianura e collina (Fiori 1886; Casali 1899b)

**ALTITUDINE:** In pianura e collina (Fiori 1886; Casali 1899a; Casali 1899b)

***Tortula revolvens*** (Schimp.) G. Roth

**SINONIMI:** *Barbula fiorii* Venturi; *Barbula revolvens* Schimp.; *Tortula revolvens* (Schimp.) G. Roth. var. *obtusata* Reimers

**Reggio Emilia:** Monte del Gesso a Scandiano, Castello di Borzano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Borzano (Fiori 1892b); SIC Ca` del Vento, Ca` del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) nei contrafforti del Castello di Borzano (Aleffi 2016) – **Modena:** Colline di Modena (Venturi 1885b); Colli modenesi (Venturi 1886); Colline gessose presso Modena (Quelle 1906) – **Bologna:** Miserazzano e Gaibola (Fiori 1892b); Gessi bolognesi presso Gesso, alla Croara e attorno a Castel de' Britti (Cobau 1932); Gessi bolognesi al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) a Miserazzano (Aleffi 2016) – **Emilia:** Modenese/Reggiano (Fiori 1884); Subappennino emiliano orientale (Bologna e Modena) (Giacomini 1950) – **Ravenna:** Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Monte Mauro, a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Rimini:** SIC Onferno (Aleffi 2016)

**ECOLOGIA:** Rocce gessose (Zangheri 1959; Zangheri 1966b) soleggiate (Zangheri 1966b)

**NOTE:** Le segnalazioni di Venturi (1885b; 1886) e Quelle (1906) per il Modenese e quella di Fiori (1884) per Modenese/Reggiano è possibile che si riferiscono alle segnalazioni del Reggiano di Fiori (1886)

***Tortula schimperii*** M.J. Cano, O. Werner & J. Guerra

**SINONIMI:** *Tortula subulata* Hedw. var. *integrifolia* (Boulay) Brizi

**Forlì-Cesena:** Balze località Scalette (Zangheri 1966b) – **Romagna:** Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** Roccia calcarea (Zangheri 1966b)

***Tortula subulata*** Hedw.

**SINONIMI:** *Barbula subulata* (Hedw.) P. Beauv.; *Barbula subulata* (Hedw.) P. Beauv. var. *subinermis* (Bruch & Schimp.) Wilson

**Parma:** Collecchio, Varano dei Marchesi, Berceto (Avetta 1897) – **Reggio Emilia:** Montebabbio, Ventasso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Cusna (Velluti 1993) – **Modena:** Colli di Spezzano, Montegibbio,

Cimone, Monte Cantiere di Barigazzo (Fiori 1886) – **Bologna**: Bologna fuori porta Castiglione, Bastia di Savena (Bertoloni 1859); Bologna a Gaibola (Bertoloni 1859 citato in Farneti 1889); Beverara (Farneti 1889); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Persolino presso Faenza, Castelraniero (Del Testa 1903) – **Forlì-Cesena**: Poggio Gabrendo (Pichi & Bottini 1888); Predappio (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Forlì, Polenta, Monte Falco, Passo dei Mandrioli, Poggio Martino (Zangheri 1966b); Sasso Fratino (Bonini 2009) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sui gessi (Farneti 1889); Sui muri, lungo le vie e nei boschi dai colli alle vette appenniniche (Fiori 1886; Casali 1899b); Terreno, cortecce, legni fradici, cortecce *Fagus sylvatica* (Zangheri 1966b); Suolo in una prateria discontinua su detriti marnosi (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: Al colle e al monte (Fiori 1886; Casali 1899b); 1800 m (Velluti 1993)

***Tortula truncata*** (Hedw.) Mitt.

*SINONIMI*: *Bryum truncatum* With.; *Pottia truncata* (Hedw.) Müll. Hal.

**Parma**: Collecchio (Avetta 1897) – **Ravenna**: Persolino presso Faenza (Del Testa 1903); Pinete di Ravenna (Zangheri 1925) – **Forlì-Cesena**: Cesena (Del Testa 1903)

*ECOLOGIA*: Sulla terra umida (Avetta 1897); Sulle ceppaie di Robinia argine delle ferrovie (Del Testa 1903)

***Tortula vabliana*** (Schultz) Mont.

**Bologna**: Gessi bolognesi al Buco del Budriolo (Aleffi & Silenzi 2000); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito)

*ECOLOGIA*: Sulle rocce gessifere (Zangheri 1959); Gessi (Zangheri 1966b); Su *Sambucus nigra* (Aleffi & Silenzi 2000)

#### ***Trichodon*** Schimp. (Ditrichaceae)

***Trichodon cylindricus*** (Hedw.) Schimp.

*SINONIMI*: *Ditrichum cylindricum* (Hedw.) Grout

**Reggio Emilia**: Monte Ravino (Velluti 1993)

*ECOLOGIA*: Areanaria in un faggeto (Velluti 1993)

*ALTITUDINE*: 1400 m (Velluti 1993)

#### ***Trichostomum*** Bruch (Pottiaceae)

***Trichostomum brachydontium*** Bruch

*SINONIMI*: *Trichostomum brachydontium* Bruch var. *littorale* (Mitt.) C.E.O. Jensen; *Trichostomum brachydontium* Bruch subsp. *mutabile* (Bruch) Giacom.; *Trichostomum mutabile* Bruch

**Bologna**: Gessi bolognesi al Buco della Gaibola e sulla via della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-3, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna**: Sasso (Zangheri 1959); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena**: Roversano (Del Testa 1903); San Savino (Zangheri 1966b) presso Casa Trove (Zodda 1921); Monte Casale, Bertinoro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Ladino, Scardavilla, Monte Aiola (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sul terreno nei boschi (Del Testa 1903); In un bosco di castagno (Zodda 1921); Sul calcare, sui gessi (Zangheri 1959); Terra, muri a secco, rocce calcaree e gessose (Zangheri 1966b); Su gesso e su terreno (Aleffi & Silenzi 2000)

***Trichostomum crispulum*** Bruch

*SINONIMI*: *Trichostomum crispulum* Bruch subsp. *brevifolium* (Sendtn. ex Müll. Hal.) Giacom.; *Trichostomum crispulum* Bruch var. *brevifolium* (Sendtn. ex Müll. Hal.) Bruch & Schimp.; *Trichostomum crispulum* Bruch

var. *viridulum* (Bruch) Dixon

**Reggio Emilia:** Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014); SIC Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano (Aleffi et al. 2014) al Castello di Borzano (Aleffi 2016) – **Modena:** Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena, Montebanzone (Fiori 1886) – **Bologna:** Gessi bolognesi al Buco dei Vinchi, al Buco del Budriolo, al Buco dei Quercioli, al Buco della Gaibola (Aleffi & Silenzi 2000); SIC Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano (Aleffi et al. 2014); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Tossignano (inedito); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) all'altipiano di Miserazzano (Pellis et al. 2014; Aleffi 2016); Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-2, 11633-3, 11733-1, 11732-2 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); Pineta di San Vitale, Pineta di Cervia (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Monte Mauro, alla Tana del Re Tiberio, a Ca' di Sasso, a Monte della Volpe, a Borgo Rivola e a Sasso (inedito) – **Forlì-Cesena:** Castrocaro (Zangheri 1959); Ladino (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Monte dei Cappuccini (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Scardavilla, Bagnolo di Castrocaro, Collina di Civitella, Cabelli, Monte Aiola, San Benedetto in Alpe, San Piero in Bagno, Balze località Scalette (Zangheri 1966b) – **Rimini:** SIC Onferno (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Romagna:** Romagna litoranea e subappenninica (Giacomini 1950); Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

**ECOLOGIA:** In un bosco di querce (Zodda 1921); Sul calcare, sui gessi, sullo sfaticcio e sulla roccia gessifera (Zangheri 1959); Terra, rocce calcaree e gessose (Zangheri 1966b); Su roccia e su gesso (Aleffi & Silenzi 2000)

**NOTE:** In letteratura esistono due segnalazioni per il Modenese (Montegibbio e Rocca Santa Maria) che Fiori (1886) aveva in un primo momento attribuito a questa specie e che poi sono state ricondotte a *Weissia wimmeriana* (Fiori 1892b)

#### *Ulot* D. Mohr (Orthotrichaceae)

*Ulot bruchii* Hornsch. ex Brid.

**Forlì-Cesena:** Sasso Fratino (Bonini 2009)

*Ulot crista* (Hedw.) Brid.

**Reggio Emilia:** Lago Cerretano (Fiori 1892b citato in Casali 1899b e in Dia 1987) – **Forlì-Cesena:** Burraja nel Monte Falterona (Pichi & Bottini 1888)

**ECOLOGIA:** Alla base dei faggi (Pichi & Bottini 1888); Sui vecchi faggi (Fiori 1892b citato in Casali 1899b)

**ALTITUDINE:** 1500 m (Pichi & Bottini 1888)

*Ulot hutchinsiae* (Sm.) Hammar

**Parma:** Monte Prinzerà (Avetta 1897)

**ECOLOGIA:** Sopra un sasso (Avetta 1897)

#### *Warnstorfia* Loeske (Calliergonaceae)

*Warnstorfia fluitans* (Hedw.) Loeske

**SINONIMI:** *Drepanocladus fluitans* (Hedw.) Warnst.; *Hypnum fluitans* L.; *Hypnum fluitans* L. var. *falcatum* Schimp. *hom. illeg.*

**Parma:** Rigoso, Lago Ballano (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia:** Lago Verde di Monte Ventasso (Provasi 1938) – **Modena:** Lago Baccio (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886; Provasi 1926); Pendice appennina sovrastante Piandelagotti (Bottini 1913); Piandelagotti al Lago Tondo (Bottini 1914) – **Bologna:** Corno alle Scale a Baggioleto (Bertoloni 1844; Bertoloni 1859 citato in Fitzgerald & Bottini 1881 e in Fiori 1886; Cocconi 1881)

**ECOLOGIA:** In acque stagnanti (Bertoloni 1844); Sul margine di uno stagno esalante metano (Bottini 1913; Bottini 1914)

**ALTITUDINE:** 1600 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 1538 m (Bottini 1913; Bottini 1914)

*Weissia* Hedw. (Pottiaceae)

*Weissia brachycarpa* (Nees & Hornsch.) Jur.

*SINONIMI*: *Hymenostomum microstomum* (Hedw.) R. Br. ex Nees & Hornsch.

**Parma**: Valbona (Berceto) (Avetta 1897) – **Reggio Emilia**: Monte del Gesso a Scandiano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena**: Montebaranzone (Fiori 1886)

*ECOLOGIA*: Nei pascoli (Avetta 1897); Sui sassi e sul terreno (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Weissia condensata* (Voit) Lindb.

*SINONIMI*: *Hymenostomum tortile* (Schwägr.) Bruch & Schimp.

**Parma**: Monte Orsajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Reggio Emilia**: Sopra Santa Maria sul Ventasso, Valle dell'Ozola (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Monte Casarola (Casali 1899b) – **Modena**: Rondinajo (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886) – **Bologna**: Miserazzano presso Bologna (Fiori 1886) – **Ravenna**: Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) a Borgo Rivola (inedito) – **Forlì-Cesena**: Monte dei Cappuccini di Bertinoro (Zodda 1921; Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Monte Casale, Bertinoro (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Scardavilla (Zangheri 1966b)

*ECOLOGIA*: Sul macigno (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); Sui gessi e nelle fessure dei muri a secco (Fiori 1886); Tra le fessure dei sassi e nei pascoli (Fiori 1886; Casali 1899b); Sui gessi (Zangheri 1959); Terreno, rocce calcaree e gessifere (Zangheri 1966b)

*ALTITUDINE*: 1700 m (Fitzgerald & Bottini 1881 citati in Fiori 1886); 300 m (Zodda 1921); Nell'Appennino (Fiori 1886; Casali 1899b)

*Weissia controversa* Hedw. var. *controversa*

*SINONIMI*: *Weissia viridula* Hedw. ex Brid. *nom. illeg. incl. spec. prior.*

**Piacenza**: In prossimità di Bobbio (Pollini 1824) – **Parma**: Monte Orsato (Avetta 1897); Roccamurata (Razzara 1981) – **Reggio Emilia**: Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Dintorni di Reggio, Bagnolo in Piano, Roncocesi, Vezzano (Casali 1899b); SIC Gessi Triassici (Aleffi et al. 2014; Aleffi 2016) – **Modena**: Dintorni di Modena, Casinalbo, Montegibbio (Fiori 1886) – **Bologna**: Bologna a Castiglione (Bertoloni 1859); Barbiano (Cocconi 1881); Monte Paderno (Fiori 1886; Farneti 1889); Bologna ai prati di Caprara e al Meloncello, a Gaibola, Vallata del Santerno a Fontana Elice (Farneti 1889); SIC Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (Aleffi et al. 2014) nell'altipiano di Miserazzano (Pellis et al. 2014) – **Ravenna**: Sasso (Zangheri 1959); Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); Sassatello (Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Monte Mauro, a Borgo Rivola e a Sasso (inedito); Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena**: Rio Marano a San Tommaso (Del Testa 1903); Ladino, Monte Casale, Collina di Civitella (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Scardavilla, Polenta (Zangheri 1966b) – **Romagna**: Medio e alto Appennino romagnolo (Zangheri 1966a)

*ECOLOGIA*: Sulle argille scagliose, sui gessi (Farneti 1889); Sul ciglio dei campi e delle vie, ne boschi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sulle sponde erbose e sulle radure dei boschi (Del Testa 1903); Boschi (Zodda 1921); Sui gessi (Zangheri 1959); Al suolo (Fariselli 2015)

*Weissia controversa* Hedw. var. *crispata* (Nees & Hornsch.) Nyholm

*SINONIMI*: *Hymenostomum crispatum* Nees & Hornsch.

**Parma**: Collecchio (Avetta 1897)

*ERBARIO CRITTOGAMICO ITALIANO*: Provincia di Parma, Serie I Fascicolo XXIII 112 (1112), Passerini 1863

*ECOLOGIA*: Sulla terra argillosa (Avetta 1897)

*Weissia longifolia* Mitt.

*SINONIMI*: *Systegium crispum* (Hedw.) Schimp.

**Reggio Emilia**: Dintorni di Reggio, Villa San Maurizio, Roncocesi, Bagnolo in Piano, Traghettino (Casali 1899a; Casali 1899b) – **Modena**: Dintorni di Modena, Fontanazzi di San Faustino presso Modena, Fontanazzi

di Cognento, Monteciccio, Montegibbio (Fiori 1886)

**ECOLOGIA:** Nei boschetti di pini (Fiori 1886); Lungo i fossi e le rive (Casali 1899a); Lungo le sponde dei fossati e i margini dei campi (Fiori 1886; Casali 1899b)

**ALTITUDINE:** Al piano; meno comune al colle (Casali 1899a)

***Weissia rostellata*** (Brid.) Lindb.

**SINONIMI:** *Hymenostomum rostellatum* (Brid.) Schimp.

**Ravenna:** Rivola (Zangheri 1959; Zangheri 1966b); SIC Vena del Gesso Romagnola (Aleffi et al. 2014) a Borgo Rivola (inedito)

**ECOLOGIA:** Rocce gessifere (Zangheri 1959; Zangheri 1966b)

***Weissia wimmeriana*** (Sendtn.) Bruch & Schimp.

**SINONIMI:** *Hymenostomum murale* Spruce

**Reggio Emilia:** Colli di Montebabbio (Fiori 1886 citato in Casali 1899b) – **Modena:** Colli modenesi (Venturi 1886); Bosco Bertoni lungo la Secchia presso Modena, Montegibbio, Rocca Santa Maria (Fiori 1892b)

**ECOLOGIA:** Sopra un sasso in luogo ombroso (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Sul terreno nei boschetti di pini (Fiori 1892b)

**NOTE:** Le segnalazioni Montegibbio e Rocca Santa Maria erano state erroneamente riferite in un primo momento a *Trichostomum crispulum* (Fiori 1886)

### ***Zygodon*** Hook. & Taylor (Orthotrichaceae)

***Zygodon forsteri*** (Dicks.) Mitt.

**Parma:** Santa Caterina a Castelnuovo, nel campo della Parma (Avetta 1897)

**ECOLOGIA:** Su vecchi olmi (Avetta 1897)

***Zygodon rupestris*** Schimp. ex Lorentz

**Reggio Emilia:** Colli di Dinazzano (Fiori 1886 citato in Casali 1899b); Rivalta, Vezzano, Roncolo (Casali 1899b) – **Modena:** Bosco di Campogalliano lungo la Secchia presso Modena, Casinalbo, Colli di Montegibbio (Fiori 1886) – **Bologna:** Parco Storico di Monte Sole quadrante 11633-1, 11633-2, 11633-3 e 11733-1 (Fariselli et al. 2017) – **Ravenna:** Pineta di Milano Marittima (Fariselli 2015) – **Forlì-Cesena:** Scardavilla (Zodda 1921; Zangheri 1966b); Ladino, Selbagnone (Zangheri 1966)

**ECOLOGIA:** Sopra gli alberi (Fiori 1886; Casali 1899b); Sui tronchi delle querce (Zodda 1921); Terra, cortecce (Zangheri 1966b); Su *Pinus pinaster* (Fariselli 2015)

**ALTITUDINE:** In pianura e collina (Fiori 1886; Casali 1899b)

**NOTE:** Tutte le segnalazioni antiche si riferiscono a *Z. viridissimum* ma, sulla base di uno studio tassonomico di Düll (1985) sul genere *Zygodon* in Europa, vanno ricondotte alla subsp. *baumgartneri* (= *Z. rupestris*) (Cortini-Pedrotti 1992)





Tabella 1. Sintesi della distribuzione delle epatiche in Emilia-Romagna

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b>Anastrophyllum</b> (Spruce) Steph. (Scapaniaceae)												
<i>minutum</i> (Schreb.) R. M. Schust.								○			○	○
<b>Aneura</b> Dumort. (Aneuraceae)												
<i>pinguis</i> (L.) Dumort.	○	●	○	○			●					●
<b>Anthelia</b> (Dumort.) Dumort. (Antheliaceae)												
<i>juratzkana</i> (Limpr.) Trevis.			●				●					●
<b>Apometzgeria</b> Kuwah. (Metzgeriaceae)												
<i>pubescens</i> (Schrank) Kuwah.		○	○	○	○		○					○
<b>Barbilophozia</b> Loeske (Scapaniaceae)												
<i>barbata</i> (Schmidel ex Schreb.) Loeske					●		●					●
<i>lycopodioides</i> (Wallr.) Loeske			●				●					●
<b>Blepharostoma</b> (Dumort.) Dumort. (Pseudolepicoleaceae)												
<i>trichophyllum</i> (L.) Dumort.		○	●				●					●
<b>Calypogeia</b> Raddi (Calypogeiaceae)												
<i>fissa</i> (L.) Raddi			○				○		●		●	●
<b>Cephalozia</b> (Dumort.) Dumort. (Cephaloziaceae)												
<i>bicuspidata</i> (L.) Dumort.	○	●	●	○	●		●					●
<i>connivens</i> (Dicks.) Lindb.			●				●					●
<b>Cephaloziella</b> (Spruce) Schiffn. (Cephaloziellaceae)												
<i>baumgartneri</i> Schiffn.			●		●		●			●	●	●
<i>calyculata</i> (Durieu & Mont.) Müll. Frib.			●				●					●
<i>divaricata</i> (Sm.) Schiffn.					●		●		●		●	●
<i>hampeana</i> (Nees) Schiffn.			○		●		●					●
<i>rubella</i> (Nees) Warnst.			●		●		●					●
<b>Chiloscyphus</b> Corda (Lophocoleaceae)												
<i>pallescens</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.				●	●		●		●		●	●
<i>polyanthos</i> (L.) Corda			○				○					○
<b>Cololejeunea</b> (Spruce) Schiffn. (Lejeuneaceae)												
<i>rossettiana</i> (C. Massal.) Schiffn.					●		●					●
<b>Conocephalum</b> Hill (Conocephalaceae)												
<i>conicum</i> (L.) Dumort.	○	○	●	○	●		●		●		●	●
<b>Diplophyllum</b> (Dumort.) Dumort. (Scapaniaceae)												
<i>albicans</i> (L.) Dumort.	○						○					○
<i>taxifolium</i> (Wahlenb.) Dumort.			●				●					●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b><i>Eremonotus</i></b> Lindb. & Kaal. ex Pearson (Gymnomitriaceae)												
<i>myriocarpus</i> (Carrington) Pearson			●				●					●
<b><i>Fossombronia</i></b> Raddi (Fossombroniaceae)												
<i>caespitiformis</i> De Not. ex Rabenh. subsp. <i>caespitiformis</i>					●		●					●
<b><i>Frullania</i></b> Raddi (Frullaniaceae)												
<i>dilatata</i> (L.) Dumort.		○	○	○	●		●	●	●		●	●
<i>fragilifolia</i> (Taylor) Gottsche et al.									●		●	●
<i>tamarisci</i> (L.) Dumort.		○	○	○	○		○					○
<b><i>Gymnocolea</i></b> (Dumort.) Dumort. (Scapaniaceae)												
<i>inflata</i> (Huds.) Dumort.			●				●		●		●	●
<b><i>Gymnomitrium</i></b> Corda (Gymnomitriaceae)												
<i>concinatum</i> (Lightf.) Corda			●				●					●
<b><i>Jungermannia</i></b> L. (Jungermanniaceae)												
<i>atrovirens</i> Dumort.					●		●		●		●	●
<i>gracillima</i> Sm.			●		●		●					●
<i>leiantha</i> Grolle			●				●					●
<i>sphaerocarpa</i> Hook.			●				●					●
<b><i>Leiocolea</i></b> (Müll. Frib.) H. Buch (Scapaniaceae)												
<i>bantriensis</i> (Hook.) Jörg.			●		●		●					●
<i>turbinata</i> (Raddi) H. Buch					●		●		●		●	●
<b><i>Lejeunea</i></b> Lib. (Lejeuneaceae)												
<i>cavifolia</i> (Ehrh.) Lindb.			●		●		●		●		●	●
<b><i>Lophocolea</i></b> (Dumort.) Dumort. (Lophocoleaceae)												
<i>bidentata</i> (L.) Dumort.					●		●		●		●	●
<i>fragrans</i> (Moris & De Not.) Gottsche et al.	○						○					○
<i>heterophylla</i> (Schrad.) Dumort.			●		●		●	●	○		●	●
<i>minor</i> Nees	○				●		●					●
<b><i>Lophozia</i></b> (Dumort.) Dumort. (Scapaniaceae)												
<i>obtusata</i> (Lindb.) A. Evans			●				●		●		●	●
<i>sudetica</i> (Nees ex Huebener) Grolle			●		●		●					●
<i>ventricosa</i> (Dicks.) Dumort.			●		●		●					●
<i>wenzelii</i> (Nees) Steph.			●				●					●
<b><i>Lunularia</i></b> Adans. (Lunulariaceae)												
<i>cruciata</i> (L.) Lindb.		○	○	○	○	○	○		○		○	○
<b><i>Mannia</i></b> Opiz (Aytoniaceae)												
<i>androgyna</i> (L.) A. Evans	○						○					○
<i>fragrans</i> (Balbis) Frye & L. Clark	○						○					○

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b>Marchantia</b> L. (Marchantiaceae)												
<i>polymorpha</i> L. subsp. <i>ruderalis</i> Bischl. & Boisselier	○	●	○	○	○		●		●		●	●
<b>Marchesinia</b> Gray (Lejeuneaceae)												
<i>mackaii</i> (Hook.) Gray					●		●					●
<b>Marsupella</b> Dumort. (Gymnomitriaceae)												
<i>brevissima</i> (Dumort.) Grolle			●				●					●
<i>emarginata</i> (Ehrh.) Dumort.			○				○					○
<i>funckii</i> (F. Weber & D. Mohr) Dumort.			●				●					●
<i>sprucei</i> (Limpr.) Bernet			●				●					●
<b>Metzgeria</b> Raddi (Metzgeriaceae)												
<i>furcata</i> (L.) Dumort.	○	○	●		●		●		●		●	●
<b>Nardia</b> Gray (Jungermanniaceae)												
<i>scalaris</i> Gray			●				●					●
<b>Odontoschisma</b> (Dumort.) Dumort. (Cephaloziaceae)												
<i>denudatum</i> (Mart.) Dumort.		●	●				●					●
<b>Pedinophyllum</b> (Lindb.) Lindb. (Plagiochilaceae)												
<i>interruptum</i> (Nees) Kaal.					●		●					●
<b>Pellia</b> Raddi (Pelliaceae)												
<i>endiviifolia</i> (Dicks.) Dumort.			●		●		●		●		●	●
<i>epiphylla</i> (L.) Corda	○	○	●	●	●		●		●		●	●
<b>Plagiochila</b> (Dumort.) Dumort. (Plagiochilaceae)												
<i>asplenioides</i> (L. emend. Taylor) Dumort.	○		●				●		●		●	●
<i>porelloides</i> (Torrey ex Nees) Lindenb.			●		●		●		●		●	●
<b>Porella</b> L. (Porellaceae)												
<i>arboris-vitae</i> (With.) Grolle			○	○	●		●		●		●	●
<i>cordaeana</i> (Huebener) Moore		○	●				●					●
<i>platyphylla</i> (L.) Pfeiff.		○	●	○	●		●	●	●	●	●	●
<b>Preissia</b> Corda (Marchantiaceae)												
<i>quadrata</i> (Scop.) Nees				○	○		○					○
<b>Ptilidium</b> Nees (Ptilidiaceae)												
<i>ciliare</i> (L.) Hampe	○	●					●					●
<b>Radula</b> Dumort. (Radulaceae)												
<i>complanata</i> (L.) Dumort.		○	●	○	●		●	●	●	●	●	●
<i>lindenbergiana</i> Gottsche ex C. Hartm.									●		●	●
<b>Reboulia</b> Raddi (Aytoniaceae)												
<i>hemisphaerica</i> (L.) Raddi		○	●	○	●		●	●			●	●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b><i>Riccardia</i></b> Gray (Aneuraceae)												
<i>multifida</i> (L.) Gray									●		●	●
<b><i>Riccia</i></b> L. (Ricciaceae)												
<i>bifurca</i> Hoffm.	○						○					○
<i>cavernosa</i> Hoffm.								●			●	●
<i>crystallina</i> L. emend. Raddi	○						○					○
<i>fluitans</i> L.		○	○	○	●	●	●	●			●	●
<i>frostii</i> Austin	○					○	○					○
<i>glaucula</i> L.	○		○				○					○
<i>sorocarpa</i> Bisch. var. <i>sorocarpa</i>								●			●	●
<b><i>Ricciocarpos</i></b> Corda (Ricciaceae)												
<i>natans</i> (L.) Corda		○	○				○					○
<b><i>Scapania</i></b> (Dumort.) Dumort. (Scapaniaceae)												
<i>aequiloba</i> (Schwägr.) Dumort.			●		●		●					●
<i>curta</i> (Mart.) Dumort.			●	○			●					●
<i>irrigua</i> (Nees) Nees		○					○					○
<i>nemorea</i> (L.) Grolle	○	○	●				●		●		●	●
<i>subalpina</i> (Nees ex Lindenb.) Dumort.			●				●					●
<i>undulata</i> (L.) Dumort.		●	●	●			●					●
<b><i>Southbya</i></b> Spruce (Arnelliaceae)												
<i>tophacea</i> (Spruce) Spruce							○		○		○	○
<b><i>Sphaerocarpos</i></b> Boehm. (Sphaerocarpaceae)												
<i>michelii</i> Bellardi	○		○	○		○	○					○
<b><i>Targionia</i></b> L. (Targioniaceae)												
<i>hypophylla</i> L.	○						○					○
<b><i>Tritomaria</i></b> Schiffn. ex Loeske (Scapaniaceae)												
<i>quinquedentata</i> (Huds.) H. Buch			●				●					●

Tabella 2. Sintesi della distribuzione dei muschi in Emilia-Romagna

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b><i>Abietinella</i></b> Müll. Hal. (Thuidiaceae)												
<i>abietina</i> (Hedw.) M. Fleisch. var. <i>abietina</i>	○	●	○	○	○		●		●		●	●
<b><i>Acaulon</i></b> Müll. Hal. (Pottiaceae)												
<i>muticum</i> (Hedw.) Müll. Hal.								●			●	●
<b><i>Alleniella</i></b> S. Olsson, Enroth & D. Quandt (Neckeraceae)												
<i>complanata</i> (Hedw.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt		○	●	○	●		●		●		●	●
<b><i>Aloina</i></b> Kindb. (Pottiaceae)												
<i>aloides</i> (Koch ex Schultz) Kindb.			●				●		●		●	●
<i>ambigua</i> (Bruch & Schimp.) Limpr.			○	○	○		○		○		○	○
<i>rigida</i> (Hedw.) Limpr.				○			○		○		○	○
<b><i>Amblystegium</i></b> Schimp. (Amblystegiaceae)												
<i>serpens</i> (Hedw.) Schimp.	○	○	○	○	●	●	●	●	●		●	●
<b><i>Amphidium</i></b> Schimp. (Rhabdoweisiaceae)												
<i>lapponicum</i> (Hedw.) Schimp.				○			○					○
<b><i>Andreaea</i></b> Hedw. (Andreaeaceae)												
<i>rupestris</i> Hedw. var. <i>rupestris</i>		○	○	○	○		○					○
<b><i>Anomobryum</i></b> Schimp. (Bryaceae)												
<i>concinatum</i> (Spruce) Lindb.								●			●	●
<b><i>Anomodon</i></b> Hook. & Taylor (Anomodontaceae)												
<i>attenuatus</i> (Hedw.) Huebener			○	○	●		●		●		●	●
<i>rugelii</i> (Müll. Hal.) Keissl.		○					○					○
<i>viticulosus</i> (Hedw.) Hook. & Taylor		○	●	○	●		●	●	●	●	●	●
<b><i>Antitrichia</i></b> Brid. (Leucodontaceae)												
<i>curtipendula</i> (Hedw.) Brid.		○	○	○			○		●		●	●
<b><i>Archidium</i></b> Brid. (Archidiaceae)												
<i>alternifolium</i> (Hedw.) Mitt.					●		●					●
<b><i>Atrichum</i></b> P. Beauv. (Polytrichaceae)												
<i>angustatum</i> (Brid.) Bruch & Schimp.					●		●					●
<i>undulatum</i> (Hedw.) P. Beauv.		○	●	○	●		●	○	●		●	●
<b><i>Aulacomnium</i></b> Schwägr. (Aulacomniaceae)												
<i>palustre</i> (Hedw.) Schwägr.	●	●	●	●			●					●
<b><i>Barbula</i></b> Hedw. (Pottiaceae)												
<i>convoluta</i> Hedw. var. <i>convoluta</i>			○	○	●		●	●	●		●	●
<i>unguiculata</i> Hedw.		○	●	○	●		●	●	●	●	●	●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b>Bartramia</b> Hedw. (Bartramiaceae)												
<i>halleriana</i> Hedw.		○	○	○	○		○		●		●	●
<i>ithyphylla</i> Brid.			●	○	○		●		●		●	●
<i>pomiformis</i> Hedw.		○	●	○	○		●		●		●	●
<b>Blindia</b> Bruch & Schimp. (Seligeriaceae)												
<i>acuta</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.		○	○	○			○					○
<b>Brachydontium</b> Fürnr. (Seligeriaceae)												
<i>trichodes</i> (F. Weber) Milde		○	●				●					●
<b>Brachytheciastrum</b> Ignatov & Huttunen (Brachytheciaceae)												
<i>collinum</i> (Schleich. ex Müll. Hal.) Ignatov & Huttunen			●				●					●
<i>trachypodium</i> (Brid.) Ignatov & Huttunen											●	●
<i>velutinum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen var. <i>velutinum</i>	○	○	●	○	●		●		●		●	●
<b>Brachythecium</b> Schimp. (Brachytheciaceae)												
<i>albicans</i> (Hedw.) Schimp.				○			○					○
<i>campestre</i> (Müll. Hal.) Schimp.			●				●					●
<i>cirrosum</i> (Schwägr.) Schimp.		○					○					○
<i>erythrorrhizon</i> Schimp. subsp. <i>erythrorrhizon</i>			●				●					●
<i>gebeebii</i> Milde		○					○					○
<i>glareosum</i> (Bruch ex Spruce) Schimp.			●		●		●	●			●	●
<i>rivulare</i> Schimp.		●	●	●	●		●		●		●	●
<i>rutabulum</i> (Hedw.) Schimp. var. <i>rutabulum</i>	○	●	●	○	●	●	●	●	●		●	●
<i>salebrosum</i> (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.		○	●	○	●		●	●	●		●	●
<b>Bryoerythrophyllum</b> P.C. Chen (Pottiaceae)												
<i>recurvirostrum</i> (Hedw.) P.C. Chen		○	●	○	●		●		●		●	●
<b>Bryum</b> Hedw. (Bryaceae)												
<i>argenteum</i> Hedw.	○	○	○	○	●	○	●	○	●		●	●
<i>canariense</i> Brid.											●	●
<i>dichotomum</i> Hedw.		○	○	○	●		●	●	●		●	●
<i>elegans</i> Nees									●		●	●
<i>intermedium</i> (Brid.) Blandow								●			●	●
<i>klinggraeffii</i> Schimp.			●				●					●
<i>kunzei</i> Hornsch.			●				●					●
<i>radiculosum</i> Brid.			○	○	●		●		●		●	●
<i>ruderales</i> Crundw. & Nyholm					●		●					●
<i>sauteri</i> Bruch & Schimp.			●				●					●
<i>schleicheri</i> DC.		●	○	●	●		●		●		●	●
<i>turbinatum</i> (Hedw.) Turner			●	○			●					●
<i>weigeli</i> Spreng.			○				○					○
<b>Calliergon</b> (Sull.) Kindb. (Calliergonaceae)												
<i>cordifolium</i> (Hedw.) Kindb.		●	●	●			●					●
<i>giganteum</i> (Schimp.) Kindb.		●	○	●			●					●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b><i>Calliergonella</i></b> Loeske (Hypnaceae)												
<i>cuspidata</i> (Hedw.) Loeske	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●
<i>lindbergii</i> (Mitt.) Hedenäs		○		○			○					○
<b><i>Campyliadelphus</i></b> (Kindb.) R.S. Chopra (Amblystegiaceae)												
<i>chrysophyllus</i> (Brid.) R.S. Chopra		○	●	○	●	●	●		●		●	●
<b><i>Campylium</i></b> (Sull.) Mitt. (Amblystegiaceae)												
<i>protensum</i> (Brid.) Kindb.		○	○	○			○		●		●	●
<i>stellatum</i> (Hedw.) Lange & C.E.O. Jensen	●	●	●	○	●		●		●		●	●
<b><i>Campylophyllum</i></b> (Schimp.) M. Fleisch. (Hypnaceae)												
<i>calcareum</i> (Crundw. & Nyholm) Hedenäs					●		●		●		●	●
<i>halleri</i> (Hedw.) M. Fleisch.					●		●					●
<i>sommerfeltii</i> (Myrin) Hedenäs		●	○	○			●		●		●	●
<b><i>Campylopus</i></b> Brid. (Leucobryaceae)												
<i>pyriformis</i> (Schultz) Brid.		○					○					○
<b><i>Catoscopium</i></b> Brid. (Catoscopiaceae)												
<i>nigratum</i> (Hedw.) Brid.			●				●					●
<b><i>Ceratodon</i></b> Brid. (Ditrichaceae)												
<i>purpureus</i> (Hedw.) Brid.		○	●	○	○		●	●	●		●	●
<b><i>Cinclidotus</i></b> P.Beauv. (Pottiaceae)												
<i>aquaticus</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	○						○					○
<i>fontinaloides</i> (Hedw.) P. Beauv.					○		○					○
<b><i>Cirriphyllum</i></b> Grout (Brachytheciaceae)												
<i>crassinervium</i> (Taylor) Loeske & M. Fleisch.				○	●		●		●		●	●
<i>piliferum</i> (Hedw.) Grout			●				●					●
<b><i>Climacium</i></b> F. Weber & D. Mohr (Climaciaceae)												
<i>dendroides</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	●	●	●	●	○		●					●
<b><i>Cratoneuron</i></b> (Sull.) Spruce (Amblystegiaceae)												
<i>filicinum</i> (Hedw.) Spruce		●	●	○	●		●		●		●	●
<b><i>Crossidium</i></b> Jur. (Pottiaceae)												
<i>crassinervium</i> (De Not.) Jur.								●			●	●
<i>squamiferum</i> (Viv.) Jur.			○		○		○	●			●	●
<b><i>Cryphaea</i></b> D. Mohr (Cryphaeaceae)												
<i>heteromalla</i> (Hedw.) D. Mohr	○						○				●	●
<b><i>Ctenidium</i></b> (Schimp.) Mitt. (Hylocomiaceae)												
<i>molluscum</i> (Hedw.) Mitt.		●	●	○	●		●	●	●	●	●	●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b><i>Cynodontium</i></b> Schimp. (Rhabdoweisiaceae)												
<i>bruntonii</i> (Sm.) Bruch & Schimp.		○		○			○					○
<i>gracilescens</i> (F. Weber & D. Mohr) Schimp.			●				●					●
<i>polycarpon</i> (Hedw.) Schimp.				○			○					○
<i>tenellum</i> (Schimp.) Limpr.			●				●					●
<b><i>Dichodontium</i></b> Schimp. (Rhabdoweisiaceae)												
<i>flavescens</i> (Dicks.) Lindb.		○	○	○			○					○
<i>palustre</i> (Dicks.) M. Stech	○			●			●					●
<i>pellucidum</i> (Hedw.) Schimp.			●	○			●	●			●	●
<b><i>Dicranella</i></b> (Müll. Hal.) Schimp. (Dicranaceae)												
<i>grevilleana</i> (Brid.) Schimp.				○			○					○
<i>heteromalla</i> (Hedw.) Schimp.		○			●		●					●
<i>howei</i> Renaud & Cardot				○	●		●		●		●	●
<i>humilis</i> R. Ruthe									○		○	○
<i>subulata</i> (Hedw.) Schimp.			●				●					●
<i>varia</i> (Hedw.) Schimp.		○	○	○	●		●	●	●		●	●
<b><i>Dicranodontium</i></b> Bruch & Schimp. (Leucobryaceae)												
<i>denudatum</i> (Brid.) E. Britton			○				○					○
<b><i>Dicranoweisia</i></b> Milde (Rhabdoweisiaceae)												
<i>cirrata</i> (Hedw.) Lindb.					○		○		●		●	●
<b><i>Dicranum</i></b> Hedw. (Dicranaceae)												
<i>bonjeanii</i> De Not.	●			●			●					●
<i>fuscescens</i> Sm.		○	●	○			●		●		●	●
<i>majus</i> Sm.											●	●
<i>scoparium</i> Hedw.		●	●	○	●		●	●	●		●	●
<i>tauricum</i> Sapjegin			○		○		○		●		●	●
<b><i>Didymodon</i></b> Hedw. (Pottiaceae)												
<i>acutus</i> (Brid.) K. Saito		○		○	●		●	●	●		●	●
<i>asperifolius</i> (Mitt.) H.A. Crum, Steere & L.E. Anderson			●		●		●					●
<i>cordatus</i> Jur.									●		●	●
<i>fallax</i> (Hedw.) R.H. Zander			●	○	●		●	●	●		●	●
<i>ferrugineus</i> (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill					●		●	●			●	●
<i>insulanus</i> (De Not.) M.O. Hill									●		●	●
<i>luridus</i> Hornsch.			●		●		●	●	●	●	●	●
<i>rigidulus</i> Hedw.									●		●	●
<i>sinuosus</i> (Mitt.) Delogne					●		●		(●)		(●)	●
<i>spadiceus</i> (Mitt.) Limpr.			●				●		○		○	●
<i>trophaceus</i> (Brid.) Lisa		○	○	○	●		●		●		●	●
<i>vinealis</i> (Brid.) R.H. Zander			●		●		●	●	●	●	●	●
<b><i>Diphyscium</i></b> D. Mohr (Diphysciaceae)												
<i>foliosum</i> (Hedw.) D. Mohr		○	○	○	○		○	○	●		●	●



	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b><i>Distichium</i></b> Bruch & Schimp. (Ditrichaceae)												
<i>capillaceum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.		●	●	○	●		●		●		●	●
<i>inclinatum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.			●				●					●
<b><i>Ditrichum</i></b> Hampe (Ditrichaceae)												
<i>flexicaule</i> (Schwägr.) Hampe			●	○	○		●		●		●	●
<i>heteromallum</i> (Hedw.) E. Britton			○	○	●		●					●
<i>pallidum</i> (Hedw.) Hampe		○					●		●		●	●
<i>pusillum</i> (Hedw.) Hampe			○		●		●		●		●	●
<i>subulatum</i> Hampe			●				●					●
<i>zonatum</i> (Brid.) Kindb.			●				●					●
<b><i>Drepanocladus</i></b> (Müll. Hal.) G. Roth (Amblystegiaceae)												
<i>aduncus</i> (Hedw.) Warnst.		●	●	○			●	○	●		●	●
<b><i>Encalypta</i></b> Hedw. (Encalyptaceae)												
<i>alpina</i> Sm.			○	○	○		○					○
<i>ciliata</i> Hedw.			○	○	○		○	●			●	●
<i>rhaptocarpa</i> Schwägr. var. <i>rhaptocarpa</i>				○	●		●					●
<i>streptocarpa</i> Hedw.			●	○	●		●	●	●		●	●
<i>vulgaris</i> Hedw.		○	○	○	●		●	●	●		●	●
<b><i>Entodon</i></b> Müll. Hal. (Entodontaceae)												
<i>cladorrhizans</i> (Hedw.) Müll. Hal.				○			○					○
<i>concinus</i> (De Not.) Paris		○	○	○			○					○
<b><i>Entosthodon</i></b> Schwägr. (Funariaceae)												
<i>fascicularis</i> (Hedw.) Müll. Hal.									●		●	●
<i>muhlenbergii</i> (Turner) Fife		○	○	○	○		○	●	●		●	●
<i>obtus</i> (Hedw.) Lindb.		○					●					●
<b><i>Eucladium</i></b> Bruch & Schimp. (Pottiaceae)												
<i>verticillatum</i> (With.) Bruch & Schimp.		○	○	○	●		●	●	●		●	●
<b><i>Eurhynchiastrum</i></b> Ignatov & Huttunen (Brachytheciaceae)												
<i>pulchellum</i> (Hedw.) I. & H. var. <i>pulchellum</i>					●		●		●		●	●
<b><i>Eurhynchium</i></b> Bruch & Schimp. (Brachytheciaceae)												
<i>striatum</i> (Hedw.) Schimp.		○	●	○	○		●	●	●		●	●
<b><i>Exsertotheca</i></b> S. Olsson, Enroth & D. Quandt (Neckeraceae)												
<i>crispa</i> (Hedw.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt	○	○	●	○	●		●		●		●	●
<b><i>Fabronia</i></b> Raddi (Fabroniaceae)												
<i>pusilla</i> Raddi											●	●
<b><i>Fissidens</i></b> Hedw. (Fissidentaceae)												
<i>adianthoides</i> Hedw.		●	○	○	●		●	●	●		●	●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<i>bryoides</i> Hedw. var. <i>bryoides</i>					○		○					○
<i>crassipes</i> Wilson ex Bruch & Schimp. subsp. <i>crassipes</i>				○	●		●					●
<i>dubius</i> P. Beauv.			○	○	●	●	●	●	●		●	●
<i>exilis</i> Hedw.					●		●					●
<i>gracilifolius</i> Brugg.-Nann. & Nyholm					●		●					●
<i>osmundoides</i> Hedw.					●		●		●		●	●
<i>pusillus</i> (Wilson) Milde		○					○					○
<i>serrulatus</i> Brid.			●		●		●	●	●		●	●
<i>taxifolius</i> Hedw. subsp. <i>taxifolius</i>		○	●	○	●		●		●		●	●
<i>viridulus</i> (Sw. ex anon.) Wahlenb. var. <i>viridulus</i>			○				●					●
var. <i>incurvus</i> (Starke ex Röhl.) Waldh.		○	○	○			○					○
<b>Fontinalis</b> Hedw. (Fontinalaceae)												
<i>antipyretica</i> (Hedw.) subsp. <i>antipyretica</i>	○	○	○	●	○		●	●	●		●	●
subsp. <i>gracilis</i> (Lindb.) Schimp.		○		○			○					○
<i>hypnoides</i> C. Hartm. var. <i>duriae</i> (Schimp.) Kindb.				○			●				●	●
<i>squamosa</i> Hedw.			○				○					○
<b>Funaria</b> Hedw. (Funariaceae)												
<i>hygrometrica</i> Hedw.	○	○	●	○	○		●	●	●		●	●
<i>microstoma</i> Bruch ex Schimp.								○			○	○
<b>Grimmia</b> Hedw. (Grimmiaceae)												
<i>alpestris</i> (F. Weber & D. Mohr) Schleich.				○			○					○
<i>decipiens</i> (Schultz) Lindb.		○	○	○	○		○		●		●	●
<i>donniana</i> Sm.			○	○			○					○
<i>funalis</i> (Schwägr.) Bruch & Schimp.		○	○	○			○					○
<i>hartmanii</i> Schimp.			●	○			●					●
<i>incurva</i> Schwägr.			●				●					●
<i>laevigata</i> (Brid.) Brid.			○	○			○					○
<i>longirostris</i> Hook.			●				●					●
<i>orbicularis</i> Bruch ex Wilson									(●)		(●)	(●)
<i>ovalis</i> (Hedw.) Lindb.		○	○	○	○		○				●	●
<i>pulvinata</i> (Hedw.) Sm.		●	●	○	●		●		●		●	●
<i>ramondii</i> (Lam. & DC.) Margad.		○	●	○			●					●
<i>tergestina</i> Tomm. ex Bruch & Schimp.				○			●					●
<b>Gymnostomum</b> Nees & Hornsch. (Pottiaceae)												
<i>aeruginosum</i> Sm. var. <i>aeruginosum</i>		○	○	○			○					○
<i>calcareum</i> Nees & Hornsch.			●		●		●	●	●		●	●
<i>viridulum</i> Brid.					●		●					●
<b>Gyroweisia</b> Schimp. (Pottiaceae)												
<i>tenuis</i> (Hedw.) Schimp.	○		●		●		●		●		●	●
<b>Hamatocaulis</b> Hedenäs (Calliergonaceae)												
<i>vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs		●					●					●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b>Hedwigia</b> P. Beauv. (Hedwigiaceae)												
<i>ciliata</i> (Hedw.) P. Beauv. var. <i>ciliata</i>		○	●	○	○		●					●
<b>Herzogiella</b> Broth. (Hypnaceae)												
<i>seligeri</i> (Brid.) Z. Iwats.		○	●		●		●		●		●	●
<b>Heterocladium</b> Bruch & Schimp. (Pterigynandraceae)												
<i>dimorphum</i> (Brid.) Schimp.		○	○	○			○					○
<i>heteropterum</i> (Brid.) Schimp.			●		●		●					●
<b>Homalia</b> Brid. (Neckeraceae)												
<i>trichomanoides</i> (Hedw.) Brid.			○	○			○					○
<b>Homalothecium</b> Schimp. (Brachytheciaceae)												
<i>lutescens</i> (Hedw.) H. Rob. var. <i>lutescens</i>	○	●	●	○	●		●	●	●		●	●
<i>philippeanum</i> (Spruce) Schimp.			●	○	○		●					●
<i>sericeum</i> (Hedw.) Schimp.	○	○	●	○	●		●	●	●	●	●	●
<b>Homomallium</b> (Schimp.) Loeske (Hypnaceae)												
<i>incurvatum</i> (Schrad. ex Brid.) Loeske				○			○					○
<b>Hygroamblystegium</b> Loeske (Amblystegiaceae)												
<i>tenax</i> (Hedw.) Jenn.			●		●		●		●		●	●
<i>varium</i> (Hedw.) Mönk.			●				●					●
<b>Hygrohypnum</b> Lindb. (Amblystegiaceae)												
<i>duriusculum</i> (De Not.) D.W. Jamieson			○	○			○					○
<i>luridum</i> (Hedw.) Jenn.		○	○	○	●		●		●		●	●
<b>Hylocomiastrum</b> Broth. (Hylocomiaceae)												
<i>pyrenaicum</i> (Spruce) M. Fleisch.			○				○					○
<b>Hylocomium</b> Bruch & Schimp. (Hylocomiaceae)												
<i>splendens</i> (Hedw.) Schimp.	○		●	○	○		●		●		●	●
<b>Hymenoloma</b> Dusén (Rhabdoweisiaceae)												
<i>crispulum</i> (Hedw.) Ochyra		○	●	○	○		●		●		●	●
<b>Hymenostylium</b> Brid. (Pottiaceae)												
<i>recurvirostrum</i> (Hedw.) Dixon var. <i>recurvirostrum</i>									●		●	●
<b>Hypnum</b> Hedw. (Hypnaceae)												
<i>andoi</i> A.J.E. Sm.				○	○		○		●		●	●
<i>callichroum</i> Brid.		○	○	○			○					○
<i>cupressiforme</i> Hedw. var. <i>cupressiforme</i>		○	●	○	●	●	●	●	●		●	●
var. <i>filiforme</i> Brid.				○	●		●		●		●	●
var. <i>lacunosum</i> Brid.		●	●		●		●	●	●	●	●	●
var. <i>resupinatum</i> (Taylor) Schimp.					●		●	●	●		●	●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
var. <i>subjulaceum</i> Molendo					○		○		●		●	●
<i>imponens</i> Hedw.								●			●	●
<i>procerrimum</i> Molendo		○					○					○
<i>vaucheri</i> Lesq.								●			●	●
<b><i>Imbribryum</i></b> N. Pedersen (Bryaceae)												
<i>alpinum</i> (Huds. ex With.) N. Pedersen			○	○			○					○
<i>mildeanum</i> (Jur.) J.R. Spence			●				●				●	●
<b><i>Isopterygiopsis</i></b> Z. Iwats. (Hypnaceae)												
<i>pulchella</i> (Hedw.) Z. Iwats.			●		●		●					●
<b><i>Isothecium</i></b> Brid. (Lembophyllaceae)												
<i>alopecuroides</i> (Lam. ex Dubois) Isov.	○	○	●	○	●		●	●	●		●	●
<i>myosuroides</i> Brid.				○			○		●		●	●
<b><i>Kiaeria</i></b> I. Hagen (Rhabdoweisiaceae)												
<i>starkei</i> (F. Weber & D. Mohr) I. Hagen			●	●	●		●					●
<b><i>Kindbergia</i></b> Ochyra (Brachytheciaceae)												
<i>praelonga</i> (Hedw.) Ochyra	○	○	●	○	●		●	●	●		●	●
<b><i>Leptobarbula</i></b> Schimp. (Pottiaceae)												
<i>berica</i> (De Not.) Schimp.					●		●					●
<b><i>Leptobryum</i></b> (Bruch & Schimp.) Wilson (Meesiaceae)												
<i>pyriforme</i> (Hedw.) Wilson	○			○			○					○
<b><i>Leptodictyum</i></b> (Schimp.) Warnst. (Amblystegiaceae)												
<i>riparium</i> (Hedw.) Warnst.	○	○	○	○	●	○	●	●	●		●	●
<b><i>Leptodon</i></b> D. Mohr (Leptodontaceae)												
<i>smithii</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr	○				●		●		●		●	●
<b><i>Lescuraea</i></b> Schimp. (Leskeaceae)												
<i>incurvata</i> (Hedw.) E. Lawton			●	○	○		●		●		●	●
<i>mutabilis</i> (Brid.) Lindb. ex I. Hagen		○	○	○			○	●			●	●
<i>patens</i> Lindb.			○	○			○					○
<i>plicata</i> (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Broth.				○			○					○
<i>saxicola</i> (Schimp.) Molendo			○				○					○
<b><i>Leskea</i></b> Hedw. (Leskeaceae)												
<i>polycarpa</i> Hedw.			○	○	●		●					●
<b><i>Leucobryum</i></b> Hampe (Leucobryaceae)												
<i>glaucum</i> (Hedw.) Ångstr.				○	○		○		●		●	●
<b><i>Leucodon</i></b> Schwägr. (Leucodontaceae)												
<i>sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr.	○	○	○	○	●		●	○	●		●	●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b><i>Meesia</i></b> Hedw. (Meesiaceae)												
<i>triquetra</i> (L. ex Jolycl.) Ångstr.			○			○	○					○
<b><i>Microbryum</i></b> Schimp. (Pottiaceae)												
<i>davallianum</i> (Sm.) R.H. Zander	○	○	○	○			○	●			●	●
<b><i>Microeurhynchium</i></b> Ignatov & Vanderp. (Brachytheciaceae)												
<i>pumilum</i> (Wilson) Ignatov & Vanderp.			●		●		●	●	●		●	●
<b><i>Mielichhoferia</i></b> Nees & Hornsch. (Mniaceae)												
<i>mielichhoferiana</i> (Funck) Loeske			○				○					○
<b><i>Mnium</i></b> Hedw. (Mniaceae)												
<i>hornum</i> Hedw.		○			●		●					●
<i>lycopodioides</i> Schwägr.			○		●		●					●
<i>marginatum</i> (Dicks.) P. Beauv. var. <i>marginatum</i>			●	○	●		●					●
<i>spinosum</i> (Voit) Schwägr.			●				●					●
<i>spinulosum</i> Bruch & Schimp.			●				●					●
<i>stellare</i> Hedw.	○		●	○	●		●	●	●		●	●
<b><i>Myurella</i></b> Bruch & Schimp. (Pterigynandraceae)												
<i>julacea</i> (Schwägr.) Schimp.			●				●					●
<i>tenerrima</i> (Brid.) Lindb.							●					●
<b><i>Neckera</i></b> Hedw. (Neckeraceae)												
<i>pennata</i> Hedw.	○						○					○
<i>pumila</i> Hedw.									●		●	●
<b><i>Nogopterium</i></b> Crosby & W.R. Buck (Leucodontaceae)												
<i>gracile</i> (Hedw.) Crosby & W.R. Buck		○			○		○		●		●	●
<b><i>Nyholmiella</i></b> Holmen & Warncke (Orthotrichaceae)												
<i>obtusifolia</i> (Brid.) Holmen & Warncke			○	○			○					○
<b><i>Oligotrichum</i></b> Lam. & DC. (Polytrichaceae)												
<i>hercynicum</i> (Hedw.) Lam. & DC.			●	●	●		●					●
<b><i>Oncophorus</i></b> (Brid.) Brid. (Rhabdoweisiaceae)												
<i>virens</i> (Hedw.) Brid.			○	○	○		○					○
<b><i>Orthobecium</i></b> Bruch & Schimp. (Hypnaceae)												
<i>intricatum</i> (Hartm.) Schimp.					○		○					○
<b><i>Orthotrichum</i></b> Hedw. (Orthotrichaceae)												
<i>affine</i> Schrad. ex Brid.	○		○	○	●		●	○	●		●	●
<i>alpestre</i> Bruch & Schimp.				○			○					○
<i>anomalum</i> Hedw.		○	○	○	●		●		●		●	●
<i>cupulatum</i> Hoffm. ex Brid. var. <i>cupulatum</i>	○	○			●		●					●
var. <i>riparium</i> Huebener			○				○					○

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<i>diaphanum</i> Schrad. ex Brid.		○	●	○	●		●	●	●		●	●
<i>lyellii</i> Hook. & Taylor			○		●		●		●		●	●
<i>pallens</i> Bruch ex Brid.				○			○					○
<i>philibertii</i> Venturi											●	●
<i>pumilum</i> Sw. ex anon.					●		●	○			●	●
<i>rupestre</i> Schleich. ex Schwägr.		○	●	○	○		●		●	●	●	●
<i>schimperii</i> Hammar			○	○			○					○
<i>shawii</i> Wilson									○		○	○
<i>speciosum</i> Nees				○			○					○
<i>stramineum</i> Hornsch. ex Brid.			●		○		●					●
<i>striatum</i> Hedw.			○	○	●		●	○	●		●	●
<i>tenellum</i> Bruch ex Brid.		○	○	○	●		●	○			○	●
<b><i>Oxyrrhynchium</i></b> (Schimp.) Warnst. (Brachytheciaceae)												
<i>hians</i> (Hedw.) Loeske					●		●	●	●		●	●
<i>schleicheri</i> (R. Hedw.) Röhl.				○	●		●	●	●		●	●
<i>speciosum</i> (Brid.) Warnst.			○	○	●		●	●	○		●	●
<b><i>Oxystegus</i></b> (Broth.) Hilp. (Pottiaceae)												
<i>tenuirostris</i> (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm.		○			●		●	●			●	●
<b><i>Palustriella</i></b> Ochyra (Amblystegiaceae)												
<i>commutata</i> (Hedw.) Ochyra	●	●	●	●	●		●		●		●	●
<i>decipiens</i> (De Not.) Ochyra		●	●	●	●		●					●
<i>falcata</i> (Brid.) Hedenäs		●	●	○	●		●		○		●	●
<b><i>Paraleucobryum</i></b> (Limpr.) Loeske (Dicranaceae)												
<i>longifolium</i> (Hedw.) Loeske		○	●	○			●		○		○	●
<b><i>Philonotis</i></b> Brid. (Bartramiaceae)												
<i>caespitosa</i> Jur.			●				●		●		●	●
<i>calcareo</i> (Bruch & Schimp.) Schimp.		●	○	●	●		●					●
<i>fontana</i> (Hedw.) Brid.		○	●	●	●		●		●			●
<i>marchica</i> (Hedw.) Brid.				○			○					○
<i>seriata</i> Mitt.		●	●	●			●					●
<b><i>Physcomitrium</i></b> (Brid.) Brid. (Funariaceae)												
<i>pyriforme</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.	○	○					○					○
<b><i>Plagiomnium</i></b> T.J. Kop. (Mniaceae)												
<i>affine</i> (Blandow ex Funck) T.J. Kop.		●	●		●	●	●	●	●		●	●
<i>cuspidatum</i> (Hedw.) T.J. Kop.			○	○	●		●		●		●	●
<i>elatum</i> (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.		●	●	●	●		●		●		●	●
<i>ellipticum</i> (Brid.) T.J.Kop.			●		●		●					●
<i>medium</i> (Bruch & Schimp.) T.J.Kop.					●		●					●
<i>rostratum</i> (Schrad.) T.J. Kop.			○	○	●		●	○	●		●	●
<i>undulatum</i> (Hedw.) T.J. Kop. var. <i>undulatum</i>		○	○	○	●	●	●	●	●		●	●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b><i>Plagiopus</i></b> Brid. (Bartramiaceae)												
<i>oederianus</i> (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson var. <i>oederianus</i>		○	○	○	○		○		●		●	●
<b><i>Plagiothecium</i></b> Bruch & Schimp. (Plagiotheciaceae)												
<i>cavifolium</i> (Brid.) Z. Iwats.			●	○			●		●		●	●
<i>denticulatum</i> (Hedw.) Schimp. var. <i>denticulatum</i>	○	○	●	○	○		●					●
var. <i>undulatum</i> R. Ruthe ex Geh.									●		●	●
<i>laetum</i> Schimp.			●				●		●		●	●
<i>nemorale</i> (Mitt.) A.Jaeger	○						○		●		●	●
<i>platyphyllum</i> Mönk.			●				●					●
<i>succulentum</i> (Wilson) Lindb.			●				●		●		●	●
<i>undulatum</i> (Hedw.) Schimp.	○						○					○
<b><i>Plasteurbhynchium</i></b> Broth. (Brachytheciaceae)												
<i>meridionale</i> (Schimp.) M. Fleisch.		○					○		○		●	●
<i>striatulum</i> (Spruce) M. Fleisch.			○	○	●		●	●		○	●	●
<b><i>Platygyrium</i></b> Bruch & Schimp. (Pylaisiadelphaceae)												
<i>repens</i> (Brid.) Schimp.									●		●	●
<b><i>Pleuridium</i></b> Rabenh. (Ditrichaceae)												
<i>subulatum</i> (Hedw.) Rabenh.		○	○				○		●		●	●
<b><i>Pleurozium</i></b> Mitt. (Hylocomiaceae)												
<i>schreberi</i> (Willd. ex Brid.) Mitt.		○	●	○			●	○			○	●
<b><i>Pogonatum</i></b> P. Beauv. (Polytrichaceae)												
<i>aloides</i> (Hedw.) P.Beauv.		○	●	○	○		●		●		●	●
<i>nanum</i> (Hedw.) P. Beauv.		○	○				○					○
<i>urnigerum</i> (Hedw.) P. Beauv.		○	●	○	○		●	○	●		●	●
<b><i>Poblia</i></b> Hedw. (Mniaceae)												
<i>annotina</i> (Hedw.) Lindb.			●	○	○		●					●
<i>atropurpurea</i> (Wahlenb.) H.Lindb.					○		○	○			○	○
<i>cruda</i> (Hedw.) Lindb.		○	●	○	○		●		●		●	●
<i>drummondii</i> (Müll. Hal.) A.L. Andrews			●	●			●					●
<i>elongata</i> Hedw. var. <i>elongata</i>			●				●					●
var. <i>greenii</i> (Brid.) A.J.Shaw		○		○			○					○
<i>filum</i> (Schimp.) Martensson			●	○			●		(●)		(●)	●
<i>ludwigii</i> (Spreng. ex Schwägr.) Broth.			●				●					●
<i>melanodon</i> (Brid.) A.J.Shaw		○	○	○	●		●		●		●	●
<i>nutans</i> (Hedw.) Lindb.		○	○	○	○		○					○
<i>wahlenbergii</i> (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews var. <i>wahlenbergii</i>			○	○	●		●		●		●	●
var. <i>glacialis</i> (Brid.) E.F.Warb.				○			○					○
<b><i>Polytrichastrum</i></b> G.L. Sm. (Polytrichaceae)												
<i>alpinum</i> (Hedw.) G.L. Sm.			●	●	○		●		●		●	●
<i>sexangulare</i> (Brid.) G.L. Sm.			●	●			●					●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b><i>Polytrichum</i></b> Hedw. (Polytrichaceae)												
<i>commune</i> Hedw.	○	●	●	●	●		●	●	●		●	●
<i>formosum</i> Hedw.		●	●	○	●		●	○	●		●	●
<i>juniperinum</i> Hedw.			●	○	○		●		●		●	●
<i>piliferum</i> Hedw.		○	●	○	○		●		●		●	●
<i>strictum</i> Menzies ex Brid.		●	●	●			●					●
<b><i>Pottiopsis</i></b> Blockeel & A.J.E. Sm. (Pottiaceae)												
<i>caespitosa</i> (Bruch ex Brid.) Blockeel & A.J.E. Sm.				○			○	●			●	●
<b><i>Pseudophemerum</i></b> (Lindb.) I. Hagen (Dicranaceae)												
<i>nitidum</i> (Hedw.) Loeske		○					○	○			○	○
<b><i>Pseudoamblystegium</i></b> Vanderp. & Hedenäs (Amblystegiaceae)												
<i>subtile</i> (Hedw.) Vanderp. & Hedenäs		○	○		●		●		●		●	●
<b><i>Pseudocrossidium</i></b> R.S. Williams (Pottiaceae)												
<i>hornschurchianum</i> (Schultz) R.H. Zander			●		●		●					●
<i>revolutum</i> (Brid.) R.H. Zander					○		○	●	●		●	●
<b><i>Pseudoleskeella</i></b> Kindb. (Leskeaceae)												
<i>catenulata</i> (Brid. ex Schrad.) Kindb.					●		●		●		●	●
<i>nervosa</i> (Brid.) Nyholm			●	○	●		●			●	●	●
<i>tectorum</i> (Funck ex Brid.) Kindb. ex Broth.									●		●	●
<b><i>Pseudoscleropodium</i></b> (Limpr.) M. Fleisch. (Brachytheciaceae)												
<i>purum</i> (Hedw.) M. Fleisch.	○	●	●	○	●	●	●	●	●		●	●
<b><i>Pseudotaxiphyllum</i></b> Z. Iwats. (Hypnaceae)												
<i>elegans</i> (Brid.) Z. Iwats.					●		●					●
<b><i>Pterigynandrum</i></b> Hedw. (Pterigynandraceae)												
<i>filiforme</i> Hedw. var. <i>filiforme</i>		○	●	○	●		●		●		●	●
<b><i>Pterygoneurum</i></b> Jur. (Pottiaceae)												
<i>lamellatum</i> (Lindb.) Jur.				(○)			●					●
<i>ovatum</i> (Hedw.) Dixon	○			(○)			○					○
<b><i>Ptychostomum</i></b> Hornsch. (Bryaceae)												
<i>boreale</i> (F. Weber & D. Mohr) Ochyra & Bednarek-Ochyra		○	○	○			○	●	●		●	●
<i>capillare</i> (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen	○	●	●	○	●	●	●	●	●		●	●
<i>compactum</i> Hornsch.			●				●					●
<i>creberrimum</i> (Taylor) J.R. Spence & H.P. Ramsay	○						○	●				●
<i>donianum</i> (Grev.) Holyoak & N. Pedersen					●		●					●
<i>imbricatulum</i> (Müll. Hal.) Holyoak & N. Pedersen	○	○	●	○	●		●	●	●		●	●
<i>pallens</i> (Sw.) J.R. Spence		○	●		●		●	●	●		●	●
<i>pseudotriquetrum</i> (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay var. <i>pseudotriquetrum</i>		●	●	●			●					●



	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
var. <i>bimum</i> (Schreb.) Holyoak & N. Pedersen	○	●					●				●	●
<i>torquescens</i> (Bruch & Schimp.) Ros & Mazimpaka			○		●		●	●			●	●
<i>zieri</i> (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen		○					○					○
<b><i>Pylaisia</i></b> Schimp. (Hypnaceae)												
<i>polyantha</i> (Hedw.) Schimp.		○	○	○			○		●		●	●
<b><i>Racomitrium</i></b> Brid. (Grimmiaceae)												
<i>aciculare</i> (Hedw.) Brid.			○		○		○					○
<i>affine</i> (F. Weber & D. Mohr) Lindb.			●				●					●
<i>canescens</i> (Hedw.) Brid.			●	○	○		●		●		●	●
<i>elongatum</i> Ehrh. ex Frisvoll			●				●					●
<i>ericoides</i> (Brid.) Brid.			●	○	○		●		●		●	●
<i>heterostichum</i> (Hedw.) Brid.		○	●	○	○		●					●
<i>lanuginosum</i> (Hedw.) Brid.		○	○	○	○		○		●		●	●
<i>sudeticum</i> (Funck) Bruch & Schimp.		○	○	○			○					○
<b><i>Rhizomnium</i></b> (Broth.) T.J. Kop. (Mniaceae)												
<i>magnifolium</i> (Horik.) T.J. Kop.			●		●		●					●
<i>punctatum</i> (Hedw.) T.J. Kop.	○	○	●	●	●		●		●		●	●
<b><i>Rhynchostegiella</i></b> (Schimp.) Limpr. (Brachytheciaceae)												
<i>curviseta</i> (Brid.) Lindb.			○	○	●		●		●		●	●
<i>tenella</i> (Dicks.) Limpr.		○	●	○	●		●		●	●	●	●
<b><i>Rhynchostegium</i></b> Bruch & Schimp. (Brachytheciaceae)												
<i>confertum</i> (Dicks.) Schimp.		○	○	○	●	●	●	●	●		●	●
<i>megapolitanum</i> (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Schimp.			●	○	●		●	●	●	●	●	●
<i>murale</i> (Hedw.) Schimp.	○	○	○	○			○		●		●	●
<i>riparioides</i> (Hedw.) Cardot		●	○	○	●		●		●		●	●
<i>rotundifolium</i> (Scop. ex Brid.) Schimp.					●		●					●
<b><i>Rhytidiadelphus</i></b> (Limpr.) Warnst. (Hylocomiaceae)												
<i>loreus</i> (Hedw.) Warnst.		●	○	○	○		●					●
<i>squarrosus</i> (Hedw.) Warnst.		●	●	○	○		●		●		●	●
<i>triquetrus</i> (Hedw.) Warnst.	○		●	●	○		●		●		●	●
<b><i>Rhytidium</i></b> (Sull.) Kindb. (Rhytidiaceae)												
<i>rugosum</i> (Hedw.) Kindb.		○	○				○					○
<b><i>Saelania</i></b> Lindb. (Ditrichaceae)												
<i>glaucescens</i> (Hedw.) Broth.			●	○	○		●					●
<b><i>Sanionia</i></b> Loeske (Amblystegiaceae)												
<i>uncinata</i> (Hedw.) Loeske		○	●	●	●		●		●		●	●
<b><i>Sarmentypnum</i></b> Tuom. & T.J. Kop. (Calliergonaceae)												
<i>exannulatum</i> (Schimp.) Hedenäs		●	●	●	●		●					●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b><i>Schistidium</i></b> Bruch & Schimp. (Grimmiaceae)												
<i>apocarpum</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.		(○)	(●)	(○)	●		●	●	●		●	●
<i>atrofusum</i> (Schimp.) Limpr.									(●)		(●)	(●)
<i>confertum</i> (Funck) Bruch & Schimp.		(○)	(○)	(○)			(○)					(○)
<i>crassipilum</i> H.H. Blom				○	●		●					●
<i>helveticum</i> (Schkuhr) Deguchi					●		●					●
<i>rivulare</i> (Brid.) Podp.		(○)					(○)					(○)
<i>trichodon</i> (Brid.) Poelt			(○)				(○)		(●)		(●)	(●)
<b><i>Sciuro-hypnum</i></b> (Hampe) Hampe (Brachytheciaceae)												
<i>flotowianum</i> (Sendtn.) Ignatov & Huttunen				○			○					○
<i>glaciale</i> (Schimp.) Ignatov & Huttunen			●				●					●
<i>plumosum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen		○		○	●		●	●	●		●	●
<i>populeum</i> (Hedw.) Ignatov & Huttunen		○	●	○	○		●		(●)		(●)	●
<i>reflexum</i> (Starke) Ignatov & Huttunen		○	●		○		●		●		●	●
<i>starkei</i> (Brid.) Ignatov & Huttunen			●				●		●		●	●
<b><i>Scleropodium</i></b> Bruch & Schimp. (Brachytheciaceae)												
<i>touretii</i> (Brid.) L.F. Koch			○	○	●		●	●	●		●	●
<b><i>Scorpidium</i></b> (Schimp.) Limpr. (Amblystegiaceae)												
<i>revolvens</i> (Sw. ex anon.) Rubers	●						●					●
<i>scorpioides</i> (Hedw.) Limpr.			●				●					●
<b><i>Scorpiurium</i></b> Schimp. (Brachytheciaceae)												
<i>circinatum</i> (Bruch) M. Fleisch. & Loeske					●		●	●	●	●	●	●
<b><i>Seligeria</i></b> Bruch & Schimp. (Seligeriaceae)												
<i>calcareae</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.		○					○		●		●	●
<i>donniana</i> (Sm.) Müll. Hal.		○					○					○
<i>pusilla</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.			○	○	●		●	●			●	●
<i>recurvata</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.		○	●	○	○		●		●		●	●
<b><i>Sematophyllum</i></b> Mitt. (Sematophyllaceae)												
<i>substrumulosum</i> (Hampe) E. Britton								●			●	●
<b><i>Sphagnum</i></b> L. (Sphagnaceae)												
<i>angustifolium</i> (C.E.O. Jensen ex Russow) C.E.O. Jensen		○					○					○
<i>auriculatum</i> Schimp.		●	●	○			●					●
<i>capillifolium</i> (Ehrh.) Hedw.	○	●	●	●	○		●					●
<i>centrale</i> C.E.O. Jensen		●	○	●			●					●
<i>compactum</i> Lam. & DC.		●		●			●					●
<i>contortum</i> Schultz			○	●			●					●
<i>cuspidatum</i> Ehrh. ex Hoffm.				●			●					●
<i>fallax</i> (H. Klinggr.) H. Klinggr.		○	●				●					●
<i>fimbriatum</i> Wilson		○					○					○
<i>flexuosum</i> Dozy & Molk.		●	●	●			●					●
<i>girgensohnii</i> Russow		●	●	○			●					●
<i>inundatum</i> Russow	●	○		●			●					●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<i>magellanicum</i> Brid.		○		●			●					●
<i>palustre</i> L.	○	○	●	●	○		●					●
<i>platyphyllum</i> (Lindb. ex Braithw.) Warnst.		○	○	○			○					○
<i>rubellum</i> Wilson				●			●					●
<i>russowii</i> Warnst.		●	●				●					●
<i>squarrosum</i> Crome		●	●	●			●					●
<i>subnitens</i> Russow & Warnst.		●	●	●			●					●
<i>subsecundum</i> Nees		●	●	●			●					●
<i>teres</i> (Schimp.) Ångstr.		●		●			●					●
<b><i>Splachnum</i> Hedw. (Splachnaceae)</b>												
<i>ampullaceum</i> Hedw.	○					○	○					○
<b><i>Straminergon</i> Hedenäs (Calliergonaceae)</b>												
<i>stramineum</i> (Dicks. ex Brid.) Hedenäs		○		●	○		●					●
<b><i>Syntrichia</i> Brid. (Pottiaceae)</b>												
<i>laevipila</i> Brid.					●		●		●		●	●
<i>montana</i> Nees		○			●		●	●	●		●	●
<i>norvegica</i> F. Weber			○				○					○
<i>papillosa</i> (Wilson) Jur.								○	●		●	●
<i>princeps</i> (De Not.) Mitt.				○			○	●	●		●	●
<i>ruralis</i> (Hedw.) F. Weber & D. Mohr var. <i>ruralis</i>	○	○	●	○	●		●	●	●	●	●	●
var. <i>ruraliformis</i> (Besch.) Delogne					●	●	●	●			●	●
<b><i>Taxiphyllum</i> M. Fleisch. (Hypnaceae)</b>												
<i>wissgrillii</i> (Garov.) Wijk & Margad.					●		●					●
<b><i>Tetraplodon</i> Bruch &amp; Schimp. (Splachnaceae)</b>												
<i>angustatus</i> (Hedw.) Bruch & Schimp.						○	○					○
<b><i>Thamnobryum</i> Nieuwl. (Neckeraceae)</b>												
<i>alopecurum</i> (Hedw.) Gangulee			●	○	●		●		●	●	●	●
<b><i>Thuidium</i> Bruch &amp; Schimp. (Thuidiaceae)</b>												
<i>assimile</i> (Mitt.) A. Jaeger					●		●					●
<i>delicatulum</i> (Hedw.) Schimp.								●			●	●
<i>recognitum</i> (Hedw.) Lindb.		○	●	○	○		●		●		●	●
<i>tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.	○	○	○		○		○		●		●	●
<b><i>Timmia</i> Hedw. (Timmiaceae)</b>												
<i>austriaca</i> Hedw.				○			○					○
<b><i>Timmiella</i> (Lindb.) Limpr. (Pottiaceae)</b>												
<i>anomala</i> (Bruch & Schimp.) Limpr.								●			●	●
<b><i>Tomentypnum</i> Loeske (Brachytheciaceae)</b>												
<i>nitens</i> (Hedw.) Loeske	●	●					●					●

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b><i>Tortella</i></b> (Müll. Hal.) Limpr. (Pottiaceae)												
<i>bambergeri</i> (Schimp.) Broth.								●			●	●
<i>flavovirens</i> (Bruch) Broth. var. <i>flavovirens</i>					●		●	●	●		●	●
<i>humilis</i> (Hedw.) Jenn.				○	○		○	●	●		●	●
<i>inclinata</i> (R.Hedw.) Limpr. var. <i>inclinata</i>			○	○	●		●	●	●		●	●
var. <i>densa</i> (Lorentz & Molendo) Limpr.			●		●		●					●
<i>inflexa</i> (Bruch) Broth.					●		●					●
<i>nitida</i> (Lindb.) Broth.				○	●		●		●		●	●
<i>squarrosa</i> (Brid.) Limpr.			●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
<i>tortuosa</i> (Hedw.) Limpr. var. <i>tortuosa</i>		○	●	○	●		●	●	●		●	●
<b><i>Tortula</i></b> Hedw. (Pottiaceae)												
<i>acaulon</i> (With.) R.H. Zander var. <i>acaulon</i>		○	○	○	○		○		●		●	●
<i>atrovirens</i> (Sm.) Lindb.					●		●	●	○		●	●
<i>canescens</i> Mont.									○		●	●
<i>caucasica</i> Broth.			○	○			○					○
<i>cuneifolia</i> (Dicks.) Turner			●		●		●					●
<i>hoppeana</i> (Schultz) Ochrya		○					○					○
<i>inermis</i> (Brid.) Mont.					○		○		●		●	●
<i>lindbergii</i> Broth.		○	○	○	●		●	●	●		●	●
<i>muralis</i> Hedw.		●	●	○	●		●	●	●	●	●	●
var. <i>aestiva</i> Brid. ex Hedw.									○		○	○
subsp. <i>obtusifolia</i> (Schwägr.) Culm.								●			●	●
<i>protobryoides</i> R.H. Zander		○	○	○			○					○
<i>revolvens</i> (Schimp.) G. Roth			●	○	●		●	●		●	●	●
<i>schimperi</i> M.J. Cano, O. Werner & J. Guerra									●		●	●
<i>subulata</i> Hedw.		○	●	○	●		●	○	●		●	●
<i>truncata</i> (Hedw.) Mitt.		○					○	○	○		○	○
<i>vahliana</i> (Schultz) Mont.					●		●	●			●	●
<b><i>Trichodon</i></b> Schimp. (Ditrichaceae)												
<i>cylindricus</i> (Hedw.) Schimp.			●				●					●
<b><i>Trichostomum</i></b> Bruch (Pottiaceae)												
<i>brachydontium</i> Bruch					●		●	●	●		●	●
<i>crispulum</i> Bruch			●	○	●		●	●	●	●	●	●
<b><i>Ulota</i></b> D. Mohr (Orthotrichaceae)												
<i>bruchii</i> Hornsch. ex Brid.									●		●	●
<i>crispa</i> (Hedw.) Brid.			○				○		○		○	○
<i>hutchinsiae</i> (Sm.) Hammar		○					○					○
<b><i>Warnstorfia</i></b> Loeske (Calliergonaceae)												
<i>fluitans</i> (Hedw.) Loeske		○	○	○	○		○					○

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b>Weissia</b> Hedw. (Pottiaceae)												
<i>brachycarpa</i> (Nees & Hornsch.) Jur.		○	○	○			○					○
<i>condensa</i> (Voit) Lindb.		○	○	○	○		○	●	●		●	●
<i>controversa</i> Hedw. var. <i>controversa</i>	○	●	●	○	●		●	●	●		●	●
var. <i>crispata</i> (Nees & Hornsch.) Nyholm		○					○					○
<i>longifolia</i> Mitt.			○	○			○					○
<i>rostellata</i> (Brid.) Lindb.								●			●	●
<i>wimmeriana</i> (Sendtn.) Bruch & Schimp.			○	○			○					○
<b>Zygodon</b> Hook. & Taylor (Orthotrichaceae)												
<i>forsteri</i> (Dicks.) Mitt.		○					○					○
<i>rupestris</i> Schimp. ex Lorentz			○	○	●		●	●	●		●	●

Tabella 3. Numero di segnalazioni prima e dopo il 1950, per le epatiche ed i muschi in Emilia-Romagna

	PC	PR	RE	MO	BO	FE	EM	RA	FC	RN	RO	ER
<b>Epatiche</b>												
<i>Segnalazioni anteriori al 1950</i>	20	16	15	16	5	3	<b>20</b>	1	3	0	<b>3</b>	<b>20</b>
<i>Segnalazioni del 1950 o posteriori</i>	0	6	43	3	33	1	<b>61</b>	8	24	3	<b>30</b>	<b>67</b>
Totale epatiche	20	22	58	19	38	4	<b>81</b>	9	27	3	<b>33</b>	<b>87</b>
<b>Muschi</b>												
<i>Segnalazioni anteriori al 1950</i>	46	142	116	212	70	5	<b>130</b>	19	14	1	<b>14</b>	<b>96</b>
<i>Segnalazioni del 1950 o posteriori</i>	9	53	174	43	169	13	<b>292</b>	99	196	18	<b>239</b>	<b>363</b>
Totale muschi	55	195	290	255	239	18	<b>422</b>	118	210	19	<b>253</b>	<b>459</b>
<b>Totali generali</b>												
Totale segnalazioni anteriori al 1950 (muschi + epatiche)	66	158	131	228	75	8	<b>150</b>	20	17	1	<b>17</b>	<b>116</b>
Totale segnalazioni del 1950 o posteriori (muschi + epatiche)	9	59	217	46	202	14	<b>353</b>	107	220	21	<b>269</b>	<b>430</b>
Totale complessivo (muschi + epatiche)	75	217	348	274	277	22	<b>503</b>	127	237	22	<b>286</b>	<b>546</b>



## Elenco dei sinonimi delle epatiche

- Aneura multifida* (L.) Dumort. = *Riccardia multifida* (L.) Gray  
*Aneura pinguis* (L.) Dumort. var. *angustior* (Hook.) Dumort. = *Aneura pinguis* (L.) Dumort.  
*Blepharozia ciliaris* (L.) Dumort. = *Ptilidium ciliare* (L.) Hampe  
*Cephalozia byssacea* (A. Roth) Dumort. nom. rejic. var. *divaricata* (Sm.) C. Massal. = *Cephaloziella hampeana* (Nees) Schiffn.  
*Chiloscyphus polyanthos* var. *pallescens* (Ehrh.) Hartm. = *Chiloscyphus pallescens* (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort.  
*Conocephalus vulgaris* De Not. = *Conocephalum conicum* (L.) Dumort.  
*Cyathophora commutata* (Lindenb.) Trevis. = *Preissia quadrata* (Scop.) Müll. Frib.  
*Fegatella conica* (L.) Corda = *Conocephalum conicum* (L.) Dumort.  
*Grimaldia barbifrons* Bisch. = *Mannia fragrans* (Balbis) Frye & L. Clark  
*Grimaldia dichotoma* Raddi nom. illeg. = *Mannia androgyna* (L.) A. Evans  
*Hepatica conica* (L.) Lindb. = *Conocephalum conicum* (L.) Dumort.  
*Jungermannia albicans* L. = *Diplophyllum albicans* (L.) Dumort.  
*Jungermannia asplenoides* L. = *Plagiochila asplenioides* (L. emend. Taylor) Dumort.  
*Jungermannia bicornis* F. Weber & D. Mohr = *Anastrophyllum minutum* (Schreb.) R. M. Schust.  
*Jungermannia bicuspidata* L. = *Cephalozia bicuspidata* (L.) Dumort.  
*Jungermannia complanata* L. = *Radula complanata* (L.) Dumort.  
*Jungermannia dilatata* L. = *Frullania dilatata* (L.) Dumort.  
*Jungermannia epiphylla* L. = *Pellia epiphylla* (L.) Corda  
*Jungermannia furcata* L. = *Metzgeria furcata* (L.) Dumort.  
*Jungermannia nemorosa* L. nom. illeg. = *Scapania nemorea* (L.) Grolle  
*Jungermannia pinguis* L. = *Aneura pinguis* (L.) Dumort.  
*Jungermannia platyphylla* L. = *Porella platyphylla* (L.) Pfeiff.  
*Jungermannia quinquedentata* Huds. = *Tritomaria quinquedentata* (Huds.) H. Buch  
*Jungermannia tamarisci* L. = *Frullania tamarisci* (L.) Dumort.  
*Jungermannia tamariscifolia* L. nom. illeg. = *Frullania tamarisci* (L.) Dumort.  
*Jungermannia trichophylla* L. = *Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dumort.  
*Kantia trichomanis* (L.) Gray var. *fissa* (L.) Lindb. = *Calypogeia fissa* (L.) Raddi  
*Lejeunea serpyllifolia* (Dicks.) Lib. nom. illeg. = *Lejeunea cavifolia* (Ehrh.) Lindb.  
*Lophocolea crocata* Mich. = *Lophocolea minor* Nees  
*Lunularia vulgaris* Raddi nom. illeg. = *Lunularia cruciata* (L.) Lindb.  
*Madotheca cordaeana* (Huebener) Dumort. = *Porella cordaeana* (Huebener) Moore  
*Madotheca dentata* (Hartm.) C. Massal. = *Porella cordaeana* (Huebener) Moore  
*Madotheca laevigata* (Schrad.) Dumort. = *Porella arboris-vitae* (With.) Grolle  
*Madotheca platyphylla* (L.) Dumort. = *Porella platyphylla* (L.) Pfeiff.  
*Marchantia conica* L. = *Conocephalum conicum* (L.) Dumort.  
*Marchantia quadrata* Scop. = *Preissia quadrata* (Scop.) Müll. Frib.  
*Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dumort. var. *minor* C. Massal. ex Schiffn. nom. Illeg. = *Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dumort.  
*Metzgeria glabra* Raddi nom. illeg. = *Metzgeria furcata* (L.) Dumort.  
*Metzgeria pubescens* (Schrank) Raddi = *Apometzgeria pubescens* (Schrank) Kuwah.  
*Nardia emarginata* (Ehrh.) Gray = *Marsupella emarginata* (Ehrh.) Dumort.  
*Pellia fabbroniana* Raddi = *Pellia endiviifolia* (Dicks.) Dumort.  
*Porella laevigata* (Schrad.) Pfeiff. = *Porella arboris-vitae* (With.) Grolle  
*Preissia commutata* (Lindenb.) Nees = *Preissia quadrata* (Scop.) Müll. Frib.  
*Riccardia pinguis* (L.) Gray = *Aneura pinguis* (L.) Dumort.  
*Riccia natans* L. = *Ricciocarpos natans* (L.) Corda  
*Scapania dentata* (Dumort.) Dumort. = *Scapania undulata* (L.) Dumort.  
*Scapania nemorosa* Dumort. nom. illeg. = *Scapania nemorea* (L.) Grolle

*Scapania nemorosa* var. *aconiensis* (De Not.) C. Massal. = *Scapania nemorea* (L.) Grolle  
*Solenostoma sphaerocarpum* (Hook.) Steph. = *Jungermannia sphaerocarpa* Hook.  
*Southbya stillicidiorum* (Raddi) Lindb. = *Southbya tophacea* (Spruce) Spruce  
*Sphaerocarpos terrestris* Sm. *nom. Illeg.* = *Sphaerocarpos michelii* Bellardi

## Elenco dei sinonimi dei muschi

*Acrocladium cuspidatum* (Hedw.) Lindb. = *Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske  
*Aloina ericaefolia* (Lindb.) Kindb. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Aloina ambigua* (Bruch & Schimp.) Limpr.  
*Aloina stellata* Kindb. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Aloina rigida* (Hedw.) Limpr.  
*Amblystegiella subtilis* (Hedw.) Loeske = *Pseudoamblystegium subtile* (Hedw.) Vanderp. & Hedenäs  
*Amblystegium falcatum* (Brid.) De Not. = *Palustriella falcata* (Brid.) Hedenäs  
*Amblystegium juratzkanum* Schimp. = *Amblystegium serpens* (Hedw.) Schimp.  
*Amblystegium kneiffii* Schimp. = *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst.  
*Amblystegium riparium* (Hedw.) Schimp. = *Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst.  
*Amblystegium riparium* var. *inundatum* Schimp. = *Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst.  
*Amblystegium serpens* var. *rigescens* (Limpr.) Loeske = *Amblystegium serpens* (Hedw.) Schimp.  
*Amblystegium serpens* var. *tenuifolium* (Brid.) Schimp. = *Amblystegium serpens* (Hedw.) Schimp.  
*Amblystegium subtile* (Hedw.) Schimp. = *Pseudoamblystegium subtile* (Hedw.) Vanderp. & Hedenäs  
*Amblystegium tenax* (Hedw.) C.E.O. Jens. = *Hygroamblystegium tenax* (Hedw.) Jenn.  
*Amblystegium varium* (Hedw.) Lindb. = *Hygroamblystegium varium* (Hedw.) Mönk.  
*Amphoridium lapponicum* (Hedw.) Schimp. = *Amphidium lapponicum* (Hedw.) Schimp.  
*Andreaea petrophila* Ehrh. *ex Fürnr.* = *Andreaea rupestris* Hedw.  
*Anisothecium rubrum* (Huds.) Lindb. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Dicranella varia* (Hedw.) Schimp.  
*Anisothecium rubrum* var. *tenuifolium* (Bruch & Schimp.) Braithw. = *Dicranella howei* Renauld & Cardot  
*Anomobryum filiforme* (Dicks.) Husn. subsp. *concinatum* (Spruce) J.J. Amann = *Anomobryum concinatum*  
 (Spruce) Lindb.  
*Anomodon apiculatus* Sull. = *Anomodon rugelii* (Müll. Hal.) Keissl.  
*Barbula aciphylla* Bruch & Schimp. = *Syntrichia norvegica* F. Weber  
*Barbula acuta* (Brid.) Brid. = *Didymodon acutus* (Brid.) K. Saito  
*Barbula acuta* f. *rufescens* Podp. = *Didymodon acutus* (Brid.) K. Saito  
*Barbula acuta* (Brid.) Brid. var. *rufescens* (Schimp. *ex* Limpr.) Casares-Gil. = *Didymodon acutus* (Brid.) K.  
 Saito  
*Barbula aloides* (Koch *ex* Schultz) Bruch = *Aloina aloides* (Koch *ex* Schultz) Kindb.  
*Barbula ambigua* Bruch & Schimp. = *Aloina ambigua* (Bruch & Schimp.) Limpr.  
*Barbula caespitosa* Schwaegr. = *Tortella humilis* (Hedw.) Jenn.  
*Barbula cavifolia* Schimp. = *Pterygoneurum ovatum* (Hedw.) Dixon  
*Barbula cylindrica* (Taylor) Schimp. var. *sinuosa* (Mitt.) Lindb. = *Didymodon sinuosus* (Mitt.) Delogne  
*Barbula fallax* Hedw. = *Didymodon fallax* (Hedw.) R.H. Zander  
*Barbula fallax* subsp. *adriatica* (Baumg.) Giac. = *Didymodon fallax* (Hedw.) R.H. Zander  
*Barbula fiorii* Venturi = *Tortula revolvens* (Schimp.) G. Roth  
*Barbula gracilis* Schwägr. *hom. illeg.* = *Didymodon acutus* (Brid.) K. Saito  
*Barbula inclinata* (R. Hedw.) Schwägr. = *Tortella inclinata* (R. Hedw.) Limpr. var. *inclinata*  
*Barbula intermedia* (Brid.) Milde = *Syntrichia montana* Nees  
*Barbula laevipila* (Brid.) Garov. = *Syntrichia laevipila* Brid.  
*Barbula lamellata* (Lindb.) Müll. Hal. = *Pterygoneurum lamellatum* (Lindb.) Jur.  
*Barbula lurida* (Hornsch.) Lindb. *hom. illeg.* = *Didymodon luridus* Hornsch.  
*Barbula membranifolia* (Hook.) Schultz = *Crossidium squamiferum* (Viv.) Jur.  
*Barbula muelleri* Bruch & Schimp. = *Syntrichia princeps* (De Not.) Mitt.  
*Barbula muralis* Hedw. = *Tortula muralis* Hedw.



- Barbula nitida* (Lindb.) Renauld = *Tortella nitida* (Lindb.) Broth.  
*Barbula revoluta* (Schrad.) Brid. = *Pseudocrossidium revolutum* (Brid.) R.H. Zander  
*Barbula revolvens* Schimp. = *Tortula revolvens* (Schimp.) G. Roth  
*Barbula rigida* Hedw. = *Aloina rigida* (Hedw.) Limpr.  
*Barbula ruralis* Hedw. = *Syntrichia ruralis* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr var. *ruralis*  
*Barbula spadicea* (Mitt.) Braithw. = *Didymodon spadiceus* (Mitt.) Limpr.  
*Barbula squarrosa* Brid. = *Tortella squarrosa* (Brid.) Limpr.  
*Barbula subulata* (Hedw.) P. Beauv. = *Tortula subulata* Hedw.  
*Barbula subulata* var. *subinermis* (Bruch & Schimp.) Wilson = *Tortula subulata* Hedw.  
*Barbula tophacea* (Brid.) Mitt. = *Didymodon tophaceus* (Brid.) Lisa  
*Barbula tortuosa* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr = *Tortella tortuosa* (Hedw.) Limpr. var. *tortuosa*  
*Barbula vinealis* Brid. = *Didymodon vinealis* (Brid.) R.H. Zander  
*Bartramia norvegica* Lindb. nom. illeg. incl. spec. prior. = *Bartramia halleriana* Hedw.  
*Bartramia oederi* Brid. = *Plagiopus oederianus* (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson var. *oederianus*  
*Bartramia pomiformis* var. *crispa* (Brid.) Bruch & Schimp. nom. illeg. incl. var. prior. = *Bartramia pomiformis* Hedw.  
*Brachyodus trichodes* (F. Weber) Nees & Hornsch. = *Brachydontium trichodes* (F. Weber) Milde  
*Brachythecium collinum* (Schleich. ex Müll. Hal) Schimp. = *Brachytheciastrum collinum* (Schleich. ex Müll. Hal.) Ignatov & Huttunen  
*Brachythecium glaciale* Schimp. = *Sciuro-hypnum glaciale* (Schimp.) Ignatov & Huttunen  
*Brachythecium illecebrum* (Schimp.) De Not. = *Scleropodium touretii* (Brid.) L.F. Koch  
*Brachythecium lutescens* (Hedw.) De Not. = *Homalothecium lutescens* (Hedw.) H. Rob. var. *lutescens*  
*Brachythecium plumosum* (Hedw.) Schimp. = *Sciuro-hypnum plumosum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen  
*Brachythecium populeum* (Hedw.) Schimp. = *Sciuro-hypnum populeum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen  
*Brachythecium reflexum* (Starke) Schimp. = *Sciuro-hypnum reflexum* (Starke) Ignatov & Huttunen  
*Brachythecium rivulare* var. *cataractarum* Saut. = *Brachythecium rivulare* Schimp.  
*Brachythecium rutabulum* var. *plumulosum* Schimp. = *Brachythecium rutabulum* (Hedw.) Schimp.  
*Brachythecium rutabulum* var. *turgescens* Limpr. = *Brachythecium rutabulum* (Hedw.) Schimp.  
*Brachythecium starkei* (Brid.) Schimp. = *Sciuro-hypnum starkei* (Brid.) Ignatov & Huttunen  
*Brachythecium trachypodium* (Brid.) Schimp. = *Brachytheciastrum trachypodium* (Brid.) Ignatov & Huttunen  
*Brachythecium velutinum* (Hedw.) Bruch & Schimp. = *Brachytheciastrum velutinum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen var. *velutinum*  
*Bryum algovicum* Sendtn. = *Ptychostomum compactum* Hornsch  
*Bryum alpinum* Huds. ex With. = *Imbricobryum alpinum* (Huds. ex With.) N. Pedersen  
*Bryum atropurpureum* (Wahlenb.) Wahlenb. = *Pohlia atropurpurea* (Wahlenb.) Lindb.  
*Bryum atropurpureum* Bruch & Schimp. nom. illeg. = *Bryum dichotomum* Hedw.  
*Bryum bimum* (Schreb.) Turner = *Ptychostomum pseudotriquetrum* (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay var. *bimum* (Schreb.) Holyoak & N. Pedersen  
*Bryum caespiticium* Hedw. = *Ptychostomum imbricatulum* (Müll. Hal.) Holyoak & N. Pedersen  
*Bryum canariense* Brid. subsp. *provinciale* (H. Philib.) Giacom. = *Bryum canariense* Brid  
*Bryum capillare* Hedw. = *Ptychostomum capillare* (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen  
*Bryum capillare* var. *cuspidatum* Schimp. = *Ptychostomum creberrimum* (Taylor) J.R. Spence & H.P. Ramsay  
*Bryum capillare* subsp. *elegans* (Nees) Lindb. = *Bryum elegans* Nees  
*Bryum capillare* var. *ferchelii* (Funck ex Brid.) Bruch & Schimp. = *Bryum elegans* Nees  
*Bryum capillare* var. *flaccidum* B. S. G. = *Ptychostomum pallens* (Sw.) J.R. Spence  
*Bryum capillare* var. *macrocarpum* Huebener = *Ptychostomum capillare* (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen  
*Bryum capillare* var. *meridionale* Schimp. = *Ptychostomum capillare* (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen  
*Bryum capillare* subsp. *ovoideum* Podp. = *Ptychostomum capillare* (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen  
*Bryum capillare* var. *platyloma* (Schwägr.) Schimp. = *Ptychostomum capillare* (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen  
*Bryum capillare* var. *subobconicum* De Not. = *Ptychostomum capillare* (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen  
*Bryum capillare* subsp. *torquescens* (Bruch & Schimp.) Kindb. = *Ptychostomum torquescens* (Bruch & Schimp.)

Ros & Mazimpaka

- Bryum cuspidatum* (Bruch & Schimp.) Schimp. *hom. illeg.* = *Ptychostomum creberrimum* (Taylor) J.R. Spence & H.P. Ramsay
- Bryum donianum* Grev. = *Ptychostomum donianum* (Grev.) Holyoak & N. Pedersen
- Bryum duvalii* Voit in Sturm = *Bryum weigeli* Spreng.
- Bryum mildeanum* Jur. = *Imbribryum mildeanum* (Jur.) J.R. Spence
- Bryum murale* Wilson *ex* Hunt. *hom. illeg.* = *Bryum radiculosum* Brid.
- Bryum pallens* Sw. = *Ptychostomum pallens* (Sw.) J.R. Spence
- Bryum pallens* var. *abbreviatum* Schimp. = *Ptychostomum pallens* (Sw.) J.R. Spence
- Bryum pallescens* Schleich. *ex* Schwägr. = *Ptychostomum boreale* (F. Weber & D. Mohr) Ochyra & Bednarek-Ochyra
- Bryum paluste* Sw. = *Dichodontium palustre* (Dicks.) M. Stech
- Bryum pendulum* (Hornsch.) Schimp. *hom. illeg.* = *Ptychostomum compactum* Hornsch
- Bryum pseudotriquetrum* (Hedw.) P. Gaertn. et al. = *Ptychostomum pseudotriquetrum* (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay var. *pseudotriquetrum*
- Bryum pseudotriquetrum* subsp. *bimum* (Schreb.) Hartm. = *Ptychostomum pseudotriquetrum* (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay var. *pseudotriquetrum*
- Bryum pseudotriquetrum* var. *gracilescens* Schimp. = *Ptychostomum pseudotriquetrum* (Hedw.) J.R. Spence & H.P. Ramsay var. *pseudotriquetrum*
- Bryum punctatum* (Hedw.) Turner = *Rhizomnium punctatum* (Hedw.) T.J. Kop.
- Bryum pyriforme* Sw. = *Leptobryum pyriforme* (Hedw.) Wilson
- Bryum schleicheri* var. *latifolium* (Schwägr.) Schimp. = *Bryum schleicheri* DC.
- Bryum subelegans* Kindb. = *Ptychostomum pallens* (Sw.) J.R. Spence
- Bryum sydowii* Podp. = *Ptychostomum capillare* (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen
- Bryum torquescens* Bruch & Schimp. = *Ptychostomum torquescens* (Bruch & Schimp.) Ros & Mazimpaka
- Bryum truncatulum* With. = *Tortula truncata* (Hedw.) Mitt.
- Bryum versicolor* A. Braun *ex* Bruch & Schimp. = *Bryum dichotomum* Hedw.
- Calliergon stramineum* (Dicks. *ex* Brid.) Kindb. = *Straminergon stramineum* (Dicks. *ex* Brid.) Hedenäs
- Camptothecium lutescens* (Hedw.) Schimp. = *Homalothecium lutescens* (Hedw.) H. Rob. var. *lutescens*
- Campylium calcareum* Crundw. & Nyholm = *Campylophyllum calcareum* (Crundw. & Nyholm) Hedenäs
- Campylium chrysophyllum* (Brid.) Lange = *Campyliadelphus chrysophyllus* (Brid.) R.S. Chopra
- Campylium halleri* (Hedw.) Lindb. = *Campylophyllum halleri* (Hedw.) M. Fleisch.
- Campylium hispidulum* Brid. var. *sommerfeltii* (Myr.) Lindb. = *Campylophyllum sommerfeltii* (Myrin) Hedenäs
- Campylium sommerfeltii* (Myrin) Bryhn = *Campylophyllum sommerfeltii* (Myrin) Hedenäs
- Campylium stellatum* subsp. *protensum* (Brid.) C. Jens = *Campylium protensum* (Brid.) Kindb.
- Campylopus torfaceus* Bruch & Schimp. = *Campylopus pyriformis* (Schultz) Brid.
- Catharinea undulata* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr = *Atrichum undulatum* (Hedw.) P. Beauv.
- Cirriphyllum crassinervium* var. *turgescens* (Molendo) Mönk. = *Cirriphyllum crassinervium* (Taylor) Loeske & M. Fleisch.
- Cratoneuron commutatum* (Hedw.) G. Roth = *Palustriella commutata* (Hedw.) Ochyra
- Cratoneuron commutatum* var. *eucommutatum* Mönk. *nom. illeg.* = *Palustriella commutata* (Hedw.) Ochyra
- Cratoneuron commutatum* subsp. *falcatum* (Brid.) Giac. = *Palustriella falcata* (Brid.) Hedenäs
- Cratoneuron commutatum* var. *falcatum* (Brid.) Mönk = *Palustriella falcata* (Brid.) Hedenäs
- Cratoneuron commutatum* var. *fluctuans* (Schimp.) Wijk & Margad. = *Palustriella commutata* (Hedw.) Ochyra
- Cratoneuron commutatum* var. *irrigatum* (J.E. Zetterst.) Mönk. = *Palustriella commutata* (Hedw.) Ochyra
- Cratoneuron decipiens* (De Not.) Loeske = *Palustriella decipiens* (De Not.) Ochyra
- Cratoneuron falcatum* Brid. = *Palustriella falcata* (Brid.) Hedenäs
- Crossidium squamigerum* (Viv.) Jur. *nom. inval. err. orthogr.* = *Crossidium squamiferum* (Viv.) Jur.
- Cryphaea arborea* (P. Beauv.) Lindb. *nom. inval.* = *Cryphaea heteromalla* (Hedw.) D. Mohr
- Ctenidium molluscum* var. *gracile* (Boulay) Loeske = *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt.
- Ctenidium molluscum* var. *squarrosulum* (Boulay) G. Roth = *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt.

- Cylindrothecium cladorrhizans* (Hedw.) Schimp. = *Entodon cladorrhizans* (Hedw.) Müll. Hal.  
*Cylindrothecium concinnum* (De Not.) Schimp. = *Entodon concinnum* (De Not.) Paris  
*Cynodontium capillaceum* Hedw. = *Distichium capillaceum* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
*Cynodontium virens* (Hedw.) Schimp. = *Oncophorus virens* (Hedw.) Brid.  
*Daltonia heteromalla* (Hedw.) Hook. & Taylor = *Cryphaea heteromalla* (Hedw.) D. Mohr  
*Desmatodon atrovirens* (Sm.) Jur. = *Tortula atrovirens* (Sm.) Lindb.  
*Desmatodon latifolius* (Hedw.) Brid. = *Tortula hoppeana* (Schultz) Ochyra  
*Dichodontium pellucidum* var. *fagimontanum* (Brid.) Schimp. = *Dichodontium pellucidum* (Hedw.) Schimp.  
*Dichodontium pellucidum* var. *serratum* (Bruch & Schimp.) Schimp. = *Dichodontium flavescens* (Dicks.) Lindb.  
*Dicranella palustris* (Dicks.) Crundw. = *Dichodontium palustre* (Dicks.) M. Stech  
*Dicranella rubra* Lindb. = *Dicranella varia* (Hedw.) Schimp.  
*Dicranella varia* var. *tenella* Schimp. = *Dicranella humilis* R. Ruthe  
*Dicranodontium longirostre* (F. Weber & D. Mohr) Bruch & Schimp. = *Dicranodontium denudatum* (Brid.) Britt.  
*Dicranoweisia bruntonii* (Sm.) Schimp. = *Cynodontium bruntonii* (Sm.) Bruch & Schimp.  
*Dicranoweisia crispula* (Hedw.) Milde = *Hymenoloma crispulum* (Hedw.) Ochyra  
*Dicranum longifolium* Ehrh. ex Hedw. = *Paraleucobryum longifolium* (Ehrh. ex Hedw.) Loeske  
*Dicranum scoparium* var. *orthophyllum* Brid. = *Dicranum scoparium* Hedw.  
*Dicranum scoparium* var. *paludosum* Schimp. = *Dicranum scoparium* Hedw.  
*Dicranum scoparium* var. *recurvatum* (Schultz) Brid. = *Dicranum scoparium* Hedw.  
*Dicranum starkei* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr = *Kiaeria starkei* (F. Weber & D. Mohr) I. Hagen  
*Dicranum strictum* Schleich. ex D. Mohr *hom. illeg.* = *Dicranum tauricum* Sapjegin  
*Didymodon capillaceus* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr = *Distichium capillaceum* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
*Didymodon cylindricus* (Bruch ex Brid.) Bruch & Schimp. *hom. illeg.* = *Oxystegus tenuirostris* (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm.  
*Didymodon rubellus* Bruch & Schimp. = *Bryoerythrophyllum recurvirostrum* (Hedw.) P.C. Chen  
*Diphyscium sessile* Lindb. = *Diphyscium foliosum* (L. ex Hedw.) D. Mohr  
*Ditrichum cylindricum* (Hedw.) Grout = *Trichodon cylindricus* (Hedw.) Schimp.  
*Ditrichum homomallum* (Hedw.) Hampe = *Ditrichum heteromallum* (Hedw.) E. Britton  
*Ditrichum tortile* (Schrud.) Brockm. = *Ditrichum pusillum* (Hedw.) Hampe  
*Dolichotheca repens* Lindb. ex Par. *nom. inval. in synonym.* = *Herzogiella seligeri* (Brid.) Z. Iwats.  
*Drepanium cupressiforme* (Hedw.) G. Roth. = *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *cupressifome*  
*Drepanium cupressiforme* var. *filiforme* (Brid.) G. Roth. = *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *filiforme* Brid.  
*Drepanium cupressiforme* var. *tectorum* (Brid.) G. Roth. = *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *lacunosum* Brid.  
*Drepanium cupressiforme* var. *uncinatum* (Schimp.) G. Roth. = *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *cupressifome*  
*Drepanocladus aduncus* var. *kneiffii* (Schimp.) Mönk. = *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst.  
*Drepanocladus exannulatus* (Schimp.) Warnst. = *Sarmentypnum exannulatum* (Schimp.) Hedenäs  
*Drepanocladus exannulatus* var. *pinnatus* (Boulay) G. Roth. = *Sarmentypnum exannulatum* (Schimp.) Hedenäs  
*Drepanocladus fluitans* (Hedw.) Warnst. = *Warnstorfia fluitans* (Hedw.) Loeske  
*Drepanocladus kneiffii* (Schimp.) Warnst. = *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst.  
*Drepanocladus revolvens* (Sw. ex anon.) Warnst. = *Scorpidium revolvens* (Sw. ex anon.) Rubers  
*Drepanocladus uncinatus* (Hedw.) Warnst. = *Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske  
*Drepanocladus vernicosus* (Mitt.) Warnst. = *Hamatocaulis vernicosus* (Mitt.) Hedenäs  
*Dryptodon patens* (Hedw.) Brid. = *Grimmia ramondii* (Lam. & DC.) Margad.  
*Encalypta commutata* Nees & Hornsch. = *Encalypta alpina* Sm.  
*Encalypta contorta* Hoppe ex Lindb. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Encalypta streptocarpa* Hedw.  
*Encalypta rhabdocarpa* Schwägr. *nom. inval. err. orthogr.* = *Encalypta rhaptocarpa* Schwägr.  
*Encalypta vulgaris* var. *obtusifolia* (Funck) Husn. = *Encalypta vulgaris* Hedw.  
*Entosthodon ericetorum* (De Not.) Müll. Hal. = *Entostodon obtusus* (Hedw.) Lindb.  
*Eurhynchium abbreviatum* (Turner) Brockm. = *Oxyrrhynchium schleicheri* (R. Hedw.) Röll.

- Eurhynchium circinatum* (Brid.) Schimp. = *Scorpiurium circinatum* (Bruch) M. Fleisch. & Loeske  
*Eurhynchium crassinervium* (Taylor) Schimp. = *Cirriphyllum crassinervium* (Taylor) Loeske & M. Fleisch.  
*Eurhynchium meridionale* (Schimp.) De Not. = *Plasteurhynchium meridionale* (Schimp.) M. Fleisch.  
*Eurhynchium myosuroides* (Brid.) Schimp. = *Isothecium myosuroides* Brid.  
*Eurhynchium praelongum* (Hedw.) Schimp. = *Kindbergia praelonga* (Hedw.) Ochyra  
*Eurhynchium praelongum* subsp. *schleicheri* (R. Hedw.) Kindb. = *Oxyrrhynchium schleicheri* (R. Hedw.) Röhl.  
*Eurhynchium praelongum* subsp. *swartzii* (Turn.) Kindb. = *Oxyrrhynchium hians* (Hedw.) Loeske  
*Eurhynchium pulchellum* (Hedw.) Jenn. = *Eurhynchiastrum pulchellum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen var.  
*pulchellum*  
*Eurhynchium pumilum* (Wilson) Schimp. = *Microeurhynchium pumilum* (Wilson) Ignatov & Vanderp.  
*Eurhynchium schleicheri* (R. Hedw.) Milde = *Oxyrrhynchium schleicheri* (R. Hedw.) Röhl.  
*Eurhynchium speciosum* (Brid.) Jur. = *Oxyrrhynchium speciosum* (Brid.) Warnst.  
*Eurhynchium stokesii* (Turner) Schimp. = *Kindbergia praelonga* (Hedw.) Ochyra  
*Eurhynchium striatulum* (Spruce) Schimp. = *Plasteurhynchium striatulum* (Spruce) M. Fleisch.  
*Eurhynchium striatum* subsp. *meridionale* (Schimp.) J.J. Amann = *Plasteurhynchium meridionale* (Schimp.)  
M. Fleisch.  
*Eurhynchium strigosum* (Hoffm. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Eurhynchiastrum*  
*pulchellum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen var. *pulchellum*  
*Eurhynchium swartzii* (Turner) Curnow = *Oxyrrhynchium hians* (Hedw.) Loeske  
*Eurhynchium velutinoides* Schimp. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Sciuro-hypnum flotowianum* (Sendtn.) Ignatov  
& Huttunen  
*Fissidens bambergeri* Schimp. ex Milde = *Fissidens viridulus* (Sw. ex anon.) Wahlenb. var. *viridulus*  
*Fissidens cristatus* Wilson ex Mitt. = *Fissidens dubius* P. Beauv.  
*Fissidens decipiens* De Not. = *Fissidens dubius* P. Beauv.  
*Fissidens incurvus* Starke ex Röhl. = *Fissidens viridulus* (Sw. ex anon.) var. *incurvus* (Starke ex Röhl.) Waldh.  
*Fontinalis antipyretica* f. *alpestris* Milde = *Fontinalis antipyretica* Hedw. subsp. *antipyretica*  
*Fontinalis antipyretica* var. *montana* H. Müll. = *Fontinalis antipyretica* Hedw. subsp. *antipyretica*  
*Fontinalis duriaei* Schimp. = *Fontinalis hypnoides* C. Hartm. var. *duriaei* (Schimp.) Kindb.  
*Funaria calcarea* Wahlenb. = *Entosthodon muhlenbergii* (Turner) Fife  
*Funaria dentata* Crome var. *hibernica* (Hook.) Loeske = *Entosthodon muhlenbergii* (Turner) Fife  
*Funaria muhlenbergii* Turner = *Entosthodon muhlenbergii* (Turner) Fife  
*Grimmia affinis* Hornsch. = *Grimmia longirostris* Hook.  
*Grimmia apocarpa* Hedw. = *Schistidium apocarpum* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
*Grimmia commutata* Huebener *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Grimmia ovalis* (Hedw.) Lindb.  
*Grimmia conferta* Funck = *Schistidium confertum* (Funck) Bruch & Schimp.  
*Grimmia leucophaea* Grev. = *Grimmia laevigata* (Brid.) Brid.  
*Grimmia ovata* F. Weber & D. Mohr = *Grimmia ovalis* (Hedw.) Lindb.  
*Grimmia pulvinata* var. *obtusata* (Brid.) Huebener = *Grimmia pulvinata* (Hedw.) Sm.  
*Grimmia schultzii* (Brid.) Huebener *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Grimmia decipiens* (Schultz.) Lindb.  
*Gymnostomum aquaticum* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr = *Cinclidotus aquaticus* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
*Gymnostomum conicum* Schleich. ex Schwägr. = *Microbryum davallianum* (Sm.) R.H. Zander  
*Gymnostomum ovatum* Hedw. = *Pterygoneurum ovatum* (Hedw.) Dixon  
*Gymnostomum pyriforme* Hedw. = *Physcomitrium pyriforme* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
*Gymnostomum rupestre* Scheich. ex Schwägr. = *Gymnostomum aeruginosum* Sm. var. *aeruginosum*  
*Gymnostomum tenue* Schrad. ex Hedw. = *Gyroweisia tenuis* (Schrad. ex Hedw.) Schimp.  
*Homalia complanata* (Hedw.) De Not. = *Alleniella complanata* (Hedw.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt  
*Homalothecium nitens* (Hedw.) H. Rob. = *Tomentypnum nitens* (Hedw.) Loeske  
*Homalothecium sericeum* var. *robustum* Warnst. = *Homalothecium sericeum* (Hedw.) Schimp.  
*Hygroamblystegium irriguum* (Hook. & Wilson) Loeske = *Hygroamblystegium tenax* (Hedw.) Jenn.  
*Hygrohypnum palustre* Loeske *nom. illeg.* = *Hygrohypnum luridum* (Hedw.) Jenn.  
*Hylocomium loreum* (Hedw.) Schimp. = *Rhytidiadelphus loreus* (Hedw.) Warnst.

- Hylocomium oakesii* (Sull.) Schimp. = *Hylocomiastrum pyrenaicum* (Spruce) M. Fleisch.  
*Hylocomium purum* (Hedw.) De Not. = *Pseudoscleropodium purum* (Hedw.) M. Fleisch.  
*Hylocomium pyrenaicum* (Spruce) Lindb. = *Hylocomiastrum pyrenaicum* (Spruce) M. Fleisch.  
*Hylocomium schreberi* Willd. ex Brid. = *Pleurozium schreberi* (Willd. ex Brid.) Mitt.  
*Hylocomium squarrosum* (Hedw.) Schimp. = *Rhytidiadelphus squarrosus* (Hedw.) Warnst.  
*Hylocomium triquetrum* (Hedw.) Schimp. = *Rhytidiadelphus triquetrus* (Hedw.) Warnst.  
*Hymenostomum crispatum* Nees & Hornsch. = *Weissia controversa* Hedw. var. *crispata* (Nees & Hornsch.) Nyholm  
*Hymenostomum microstomum* (Hedw.) R. Br. ex Nees & Hornsch. = *Weissia brachycarpa* (Nees & Hornsch.) Jur.  
*Hymenostomum murale* Spruce = *Weissia wimmeriana* (Sendtn.) Bruch & Schimp.  
*Hymenostomum rostellatum* (Brid.) Schimp. = *Weissia rostellata* (Brid.) Lindb.  
*Hymenostomum tortile* (Schwägr.) Bruch & Schimp. = *Weissia condensa* (Voit) Lindb.  
*Hymenostylium curvirostre* Mitt. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Hymenostylium recurvirostrum* (Hedw.) Dixon var. *recurvirostrum*  
*Hypnum abietinum* Hedw. = *Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch. var. *abietina*  
*Hypnum aduncum* Hedw. var. *kneiffii* (Schimp.) Schimp. = *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst.  
*Hypnum ambiguum* (De Not.) A. Jaeger = *Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst.  
*Hypnum arcuatum* Lindb. *hom. illeg.* = *Calliergonella lindbergii* (Mitt.) Hedenäs  
*Hypnum chrysophyllum* Brid. = *Campyliadelphus chrysophyllus* (Brid.) R.S. Chopra  
*Hypnum commutatum* Hedw. = *Palustriella commutata* (Hedw.) Ochyra  
*Hypnum commutatum* subsp. *irrigatum* (Zetterst.) Boulay = *Palustriella commutata* (Hedw.) Ochyra  
*Hypnum cordifolium* Hedw. = *Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb.  
*Hypnum cupressiforme* var. *cuspidatum* Jur. = *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *cupressifome*  
*Hypnum cupressiforme* var. *elatum* Schimp. = *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *lacunosum* Brid.  
*Hypnum cupressiforme* subsp. *imponens* (Hedw.) Boulay = *Hypnum imponens* Hedw.  
*Hypnum cupressiforme* var. *longirostre* Schimp. = *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *cupressifome*  
*Hypnum cupressiforme* var. *mamillatum* Brid. = *Hypnum andoi* A.J.E. Sm.  
*Hypnum cupressiforme* var. *tectorum* Brid. = *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *lacunosum* Brid.  
*Hypnum cupressiforme* var. *uncinatum* Boulay = *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *cupressifome*  
*Hypnum cuspidatum* Hedw. = *Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske  
*Hypnum cuspidatum* var. *pungens* Schimp. = *Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske  
*Hypnum denticulatum* L. = *Plagiothecium denticulatum* (Hedw.) Schimp. var. *denticulatum*  
*Hypnum dilatatum* Wilson in Schimp. = *Hygrohypnum duriusculum* (De Not.) D.W. Jamieson  
*Hypnum exannulatum* Schimp. = *Sarmentypnum exannulatum* (Schimp.) Hedenäs  
*Hypnum exannulatum* var. *purpurascens* Schimp. = *Sarmentypnum exannulatum* (Schimp.) Hedenäs  
*Hypnum falcatum* Brid. = *Palustriella falcata* (Brid.) Hedenäs  
*Hypnum filicinum* Hedw. = *Cratoneuron filicinum* (Hedw.) Spruce  
*Hypnum fluitans* L. = *Warnstorfia fluitans* (Hedw.) Loeske  
*Hypnum fluitans* var. *falcatum* Schimp. *hom. illeg.* = *Warnstorfia fluitans* (Hedw.) Loeske  
*Hypnum giganteum* Schimp. = *Calliergon giganteum* (Schimp.) Kindb.  
*Hypnum incurvatum* (Hedw.) P. Beauv. *hom. illeg.* = *Lescuraea incurvata* (Hedw.) E. Lawton  
*Hypnum incurvatum* Schrad. ex Brid. = *Homomallium incurvatum* (Schrad. ex Brid.) Loeske  
*Hypnum lindbergii* Mitt. = *Calliergonella lindbergii* (Mitt.) Hedenäs  
*Hypnum kneiffii* (Schimp.) Wilson = *Drepanocladus aduncus* (Hedw.) Warnst.  
*Hypnum loreum* Hedw. = *Rhytidiadelphus loreus* (Hedw.) Warnst.  
*Hypnum lutescens* Hedw. = *Homalothecium lutescens* (Hedw.) H. Rob. var. *lutescens*  
*Hypnum molluscum* Hedw. = *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt.  
*Hypnum molluscum* var. *crispulum* Holler ex Molendo = *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt.  
*Hypnum molluscum* var. *squarrulosum* Boulay = *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt.  
*Hypnum murale* Dicks. = *Rhynchostegium murale* (Hedw.) Schimp.

- Hypnum myurum* Brid. *nom. illeg.* = *Isothecium alopecuroides* (Lam. ex Dubois) Isov.  
*Hypnum palustre* Huds. ex Brid. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Hygrohypnum luridum* (Hedw.) Jenn.  
*Hypnum parietinum* L. ex Wahlenb. *hom. illeg.* = *Pleurozium schreberi* (Willd. ex Brid.) Mitt.  
*Hypnum praelongum* Hedw. = *Kindbergia praelonga* (Hedw.) Ochyra  
*Hypnum protensum* Brid. = *Campylium protensum* (Brid.) Kindb.  
*Hypnum purum* L. = *Pseudoscleropodium purum* (Hedw.) M. Fleisch.  
*Hypnum resupinatum* Taylor = *Hypnum cupressiforme* Hedw. var. *resupinatum* (Taylor) Schimp.  
*Hypnum riparium* Hedw. = *Leptodictyum riparium* (Hedw.) Warnst.  
*Hypnum rugosum* Ehrh. ex Hedw. = *Rhytidium rugosum* (Ehrh. ex Hedw.) Kindb.  
*Hypnum rutabulum* Hedw. = *Brachythecium rutabulum* (Hedw.) Schimp. var. *rutabulum*  
*Hypnum schreberi* Willd. ex Brid. = *Pleurozium schreberi* (Willd. ex Brid.) Mitt.  
*Hypnum sericeum* L. = *Homalothecium sericeum* (Hedw.) Schimp.  
*Hypnum serpens* Hedw. = *Amblystegium serpens* (Hedw.) Schimp.  
*Hypnum sommerfeltii* Myrin = *Campylophyllum sommerfeltii* (Myrin) Hedenäs  
*Hypnum splendens* Hedw. = *Hylocomium splendens* (Hedw.) Schimp.  
*Hypnum squarrosum* L. ex Hedw. = *Rhytidiadelphus squarrosus* (Hedw.) Warnst.  
*Hypnum stellatum* Schreb. ex Hedw. = *Campylium stellatum* (Hedw.) Lange & C.E.O. Jensen  
*Hypnum stellatum* var. *protensum* (Brid.) Röhl. = *Campylium protensum* (Brid.) Kindb.  
*Hypnum stramineum* Dicks. ex Brid. = *Straminergon stramineum* (Dicks. ex Brid.) Hedenäs  
*Hypnum sulcatum* Schimp. *hom. illeg.* var. *subsulcatum* Schimp. = *Palustriella commutata* (Hedw.) Ochyra  
*Hypnum silvaticum* L. = *Plagiothecium nemorale* (Mitt.) A. Jaeger  
*Hypnum tamariscinum* Hedw. = *Thuidium tamariscinum* (Hedw.) Schimp.  
*Hypnum triquetrum* (L.) B.S.G. = *Rhytidiadelphus triquetrus* (Hedw.) Warnst.  
*Hypnum uncinatum* Hedw. = *Sanionia uncinata* (Hedw.) Loeske  
*Hypnum undulatum* Hedw. = *Plagiothecium undulatum* (Hedw.) Schimp.  
*Hypnum vaucheri* var. *julaceum* (Brid.) Husn. = *Hypnum vaucheri* Lesq.  
*Hypnum velutinum* L. ex Hedw. = *Brachytheciastrum velutinum* (Hedw.) Ignatov & Huttunen var. *velutinum*  
*Hypnum virescens* Boulay = *Palustriella commutata* (Hedw.) Ochyra  
*Isothecium filescens* (Brid.) Moenk. = *Plasteurhynchium striatulum* (Spruce) M. Fleisch.  
*Isothecium myurum* Brid. = *Isothecium alopecuroides* (Lam. ex Dubois) Isov.  
*Isothecium myurum* var. *robustum* Schimp. = *Isothecium alopecuroides* (Lam. ex Dubois) Isov.  
*Isothecium viviparum* Lindb. = *Isothecium alopecuroides* (Lam. ex Dubois) Isov.  
*Isothecium viviparum* var. *scabridum* Limpr. = *Isothecium alopecuroides* (Lam. ex Dubois) Isov.  
*Leptohymenium gracile* (Hedw.) Huebener = *Nogopterium gracile* (Hedw.) Crosby & W.R. Buck  
*Leptotrichum flexicaule* (Schwägr.) Hampe = *Ditrichum flexicaule* (Schwaegr.) Hampe  
*Leptotrichum glaucescens* (Hedw.) Hampe = *Saelania glaucescens* (Hedw.) Broth.  
*Leptotrichum homomallum* (Hedw.) Hampe = *Ditrichum heteromallum* (Hedw.) E. Britton  
*Leptotrichum pallidum* (Hedw.) Hampe = *Ditrichum pallidum* (Hedw.) Hampe  
*Lescuraea striata* (Schwägr.) Schimp. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Lescuraea mutabilis* (Brid.) Lindb. ex I. Hagen  
*Lescuraea striata* var. *saxicola* Schimp = *Lescuraea saxicola* (Schimp.) Molendo  
*Leskea nervosa* (Brid.) Myrin = *Pseudoleskeella nervosa* (Brid.) Nyholm  
*Leucodon sciuroides* var. *morensis* (Schwägr.) Kindb. = *Leucodon sciuroides* (Hedw.) Schwägr.  
*Mielichhoferia nitida* Nees & Hornsch. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Mielichhoferia mielichhoferiana* (Funck) Loeske  
*Mniobryum albicans* (Wahlenb.) Limpr. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Pohlia wahlenbergii* (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews var. *wahlenbergii*  
*Mniobryum carneum* (F. Weber & D. Mohr) Limpr. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Pohlia melanodon* (Brid.) A.J. Shaw  
*Mnium affine* Blandow ex Funck = *Plagiomnium affine* (Blandow ex Funck) T.J. Kop.  
*Mnium affine* var. *elatum* Bruch & Schimp. = *Plagiomnium elatum* (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.

- Mnium capillare* (Hedw.) With. = *Ptychostomum capillare* (Hedw.) Holyoak & N. Pedersen  
*Mnium cuspidatum* Hedw. = *Plagiomnium cuspidatum* (Hedw.) T.J. Kop.  
*Mnium cuspidatum* Neck. ex Lindb. *hom. illeg.* = *Plagiomnium affine* (Blandow ex Funck) T.J. Kop.  
*Mnium hygrometricum* (Hedw.) With. = *Funaria hygrometrica* Hedw.  
*Mnium orthorrhynchium* Bruch & Schimp. = *Mnium lycopodioides* Schwägr.  
*Mnium punctatum* Hedw. = *Rhizomnium punctatum* (Hedw.) T.J. Kop.  
*Mnium punctatum* var. *elatum* Schimp. = *Rhizomnium magnifolium* (Horik.) T.J. Kop.  
*Mnium rostratum* Schrad. = *Plagiomnium rostratum* (Schrad.) T.J. Kop.  
*Mnium rugicum* Laur. = *Plagiomnium ellipticum* (Brid.) T.J. Kop.  
*Mnium seligeri* Jur. = *Plagiomnium elatum* (Bruch & Schimp.) T.J. Kop.  
*Mnium serpyllifolium* Neck. ex J. St. Hil. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Rhizomnium punctatum* (Hedw.) T.J. Kop.  
*Mnium serratum* Brid. = *Mnium marginatum* (Dicks. ex With.) P. Beauv. var. *marginatum*  
*Mnium triquetrum* L. ex Jolycl. = *Meesia triquetra* (L. ex Jolycl.) Ångstr.  
*Mnium undulatum* Hedw. = *Plagiomnium undulatum* (Hedw.) T.J. Kop.  
*Neckera complanata* (Hedw.) Huebener = *Alleniella complanata* (Hedw.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt  
*Neckera crispa* Hedw. = *Exsertotheca crispa* (Hedw.) S. Olsson, Enroth & D. Quandt  
*Oncophorus glaucus* (Hedw.) Bruch & Schimp. = *Leucobryum glaucum* (Hedw.) Ångstr  
*Orthodicranum strictum* Broth. = *Dicranum tauricum* Sapjegin  
*Orthotrichum affine* var. *neglectum* (Venturi) Venturi in Husn. = *Orthotrichum affine* Schrad. ex Brid.  
*Orthotrichum anomalum* var. *defluens* Venturi = *Orthotrichum anomalum* Hedw.  
*Orthotrichum anomalum* var. *saxatile* Milde = *Orthotrichum anomalum* Hedw.  
*Orthotrichum fallax* Bruch ex Brid. = *Orthotrichum schimperii* Hammar  
*Orthotrichum leiocarpum* Bruch & Schimp. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Orthotrichum striatum* Hedw.  
*Orthotrichum obtusifolium* Brid. = *Nyholmiella obtusifolia* (Brid.) Holmen & Warncke  
*Orthotrichum sturmii* Hoppe & Hornsch. = *Orthotrichum rupestre* Schleich. ex Schwaegr.  
*Oxystegus cylindricus* (Bruch ex Brid.) Hilp. = *Oxystegus tenuirostris* (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm.  
*Phascum acaulon* L. = *Tortula acaulon* (With.) R.H. Zander var. *acaulon*  
*Phascum bryoides* Dicks. = *Tortula protobryoides* R.H. Zander  
*Phascum cuspidatum* Hedw. = *Tortula acaulon* (With.) R.H. Zander var. *acaulon*  
*Phascum nitidum* Hedw. = *Pseudephemerum nitidum* (Hedw.) Loeske  
*Philonotis falcata* Hook. = *Philonotis calcarea* (Bruch & Schimp.) Schimp.  
*Philonotis fontana* var. *falcata* (Hook.) Brid. = *Philonotis calcarea* (Bruch & Schimp.) Schimp.  
*Philonotis seriata* var. *falcata* Loeske = *Philonotis seriata* Mitt.  
*Plagiopus oederi* (Brid.) Limpr. = *Plagiopus oederianus* (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson var. *oederianus*  
*Plagiothecium denticulatum* var. *densum* Schimp. = *Plagiothecium denticulatum* (Hedw.) Schimp.  
*Plagiothecium roeseanum* Schimp. = *Plagiothecium cavifolium* (Brid.) Z. Iwats.  
*Plagiothecium silesiacum* (P. Beauv.) Br. eur. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Herzogiella seligeri* (Brid.) Z. Iwats.  
*Plagiothecium sylvaticum* (Brid.) B.S.G. = *Plagiothecium nemorale* (Mitt.) A. Jaeger  
*Platyhypnidium riparioides* (Hedw.) Dixon. = *Rhynchostegium riparioides* (Hedw.) Cardot  
*Platyhypnidium rusciforme* M. Fleisch. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Rhynchostegium riparioides* (Hedw.) Cardot  
*Pleuridium alternifolium* auct. = *Pleuridium subulatum* (Hedw.) Rabenh.  
*Pleuridium alternifolium* Dicks. = *Pleuridium subulatum* (Hedw.) Rabenh.  
*Pleuridium nitidum* (Hedw.) Rabenh. = *Pseudephemerum nitidum* (Hedw.) Loeske  
*Pleurochaete squarrosa* (Brid.) Lindb. = *Tortella squarrosa* (Brid.) Limpr.  
*Pogonatum alpinum* (Hedw.) Röhl. = *Polytrichastrum alpinum* (Hedw.) G.L. Sm.  
*Pohlia gracilis* (Bruch & Schimp.) Lindb. *hom. illeg.* = *Pohlia filum* (Schimp.) Martensson  
*Polytrichum alpinum* Hedw. = *Polytrichastrum alpinum* (Hedw.) G.L. Sm.  
*Polytrichum piliferum* var. *hoppei* (Hornsch.) Rabenh. = *Polytrichum piliferum* Hedw.  
*Polytrichum sexangulare* Flörke ex Brid. = *Polytrichastrum sexangulare* (Brid.) G.L. Sm.  
*Polytrichum undulatum* Hedw. = *Atrichum undulatum* (Hedw.) P. Beauv.

- Pottia caespitosa* (Bruch ex Brid.) Müll. Hal. = *Pottiopsis caespitosa* (Bruch ex Brid.) Blockeel & A.J.E. Sm.  
*Pottia intermedia* (Turner) Fürnr. = *Tortula caucasica* Broth.  
*Pottia lanceolata* (Hedw.) Müll. Hal. = *Tortula lindbergii* Broth.  
*Pottia lanceolata* var. *leucodonta* Schimp. = *Tortula lindbergii* Broth.  
*Pottia minutula* (Schwägr.) Hampe = *Microbryum davallianum* (Sm.) R.H. Zander  
*Pottia rufescens* (Schultz) Warnst. var. *conica* (Schleich. ex Schwägr.) Giacom. = *Microbryum davallianum* (Sm.) R.H. Zander  
*Pottia truncata* (Hedw.) Müll. Hal. = *Tortula truncata* (Hedw.) Mitt.  
*Pseudoleskea atrovirens* (Dicks. ex Brid.) Schimp. = *Lescuraea incurvata* (Hedw.) E. Lawton  
*Pseudoleskea incurvata* (Hedw.) Loeske = *Lescuraea incurvata* (Hedw.) E. Lawton  
*Pseudoleskea patens* (Lindb.) Kindb. = *Lescuraea patens* Lindb.  
*Pterigynandrum smithii* (Hedw.) Lam. & DC. = *Leptodon smithii* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr  
*Pterogonium gracile* (Hedw.) Sm. = *Nogopterium gracile* (Hedw.) Crosby & W.R. Buck  
*Pterogonium ornithopodioides* (Huds.) Lindb. = *Nogopterium gracile* (Hedw.) Crosby & W.R. Buck  
*Ptychodium plicatum* (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. = *Lescuraea plicata* (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Broth.  
*Racomitrium canescens* var. *epilosum* H. Müll. ex Milde = *Racomitrium ericoides* (Brid.) Brid.  
*Racomitrium canescens* var. *ericoides* (Brid.) Hampe = *Racomitrium ericoides* (Brid.) Brid.  
*Racomitrium patens* Schimp. = *Grimmia ramondii* (Lam. & DC.) Margad.  
*Rhynchostegiella algiriana* (Brid. ex P. Beauv.) Warnst. = *Rhynchostegiella tenella* (Dicks.) Limpr.  
*Rhynchostegiella pallidirostris* (Brid.) Loeske nom. illeg. incl. spec. prior. = *Microeurhynchium pumilum* (Wilson) Ignatov & Vanderp.  
*Rhynchostegium circinatum* (Bruch) De Not. = *Scorpiurium circinatum* (Bruch) M. Fleisch. & Loeske  
*Rhynchostegium crassinervium* (Taylor) De Not. = *Cirriphyllum crassinervium* (Taylor) Loeske & M. Fleisch.  
*Rhynchostegium curvisetum* (Brid.) Schimp. = *Rhynchostegiella curviseta* (Brid.) Limpr.  
*Rhynchostegium murale* var. *julaceum* Schimp. = *Rhynchostegium murale* (Hedw.) Schimp.  
*Rhynchostegium praelongum* (Hedw.) De Not. var. *swartzii* (Turner) Venturi & Bott. = *Oxyrrhynchium hians* (Hedw.) Loeske  
*Rhynchostegium pumilum* (Wilson) De Not. = *Microeurhynchium pumilum* (Wilson) Ignatov & Vanderp.  
*Rhynchostegium rusciforme* (F.W. Weiss ex Brid.) Schimp. nom. illeg. = *Rhynchostegium riparioides* (Hedw.) Cardot  
*Rhynchostegium rusciforme* var. *inundatum* (Brid.) Schimp. = *Rhynchostegium riparioides* (Hedw.) Cardot  
*Rhynchostegium rusciforme* var. *lutescens* Schimp. = *Rhynchostegium riparioides* (Hedw.) Cardot  
*Rhynchostegium rusciforme* var. *prolixum* (Dicks. ex Brid.) Schimp. = *Rhynchostegium riparioides* (Hedw.) Cardot  
*Rhynchostegium speciosum* (Brid.) Venturi & Bott. = *Oxyrrhynchium speciosum* (Brid.) Warnst.  
*Rhynchostegium stokesii* (Turner) De Not. = *Kindbergia praelonga* (Hedw.) Ochyra  
*Rhynchostegium striatulum* (Spruce) De Not. = *Plasteurhynchium striatulum* (Spruce) M. Fleisch.  
*Rhynchostegium striatum* (Hedw.) De Not. = *Eurhynchium striatum* (Hedw.) Schimp.  
*Rhynchostegium tenellum* (Dicks.) Schimp. = *Rhynchostegiella tenella* (Dicks.) Limpr.  
*Schistidium alpicola* (Hedw.) Limpr. nom. rejic. var. *rivulare* (Brid.) Limpr. nom. rejic. = *Schistidium rivulare* (Brid.) Podp.  
*Schistidium apocarpum* var. *gracile* (Schleich. ex Roehl.) Bruch & Schimp. = *Schistidium trichodon* (Brid.) Poelt  
*Schistidium apocarpum* subsp. *vulgare* Loeske nom. illeg. incl. typ. spec. = *Schistidium apocarpum* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
*Schistidium gracile* (Schleich. ex Roehl.) Limpr. = *Schistidium trichodon* (Brid.) Poelt  
*Scleropodium illecebrum* Schimp. = *Scleropodium touretii* (Brid.) L.F. Koch  
*Sphagnum acutifolium* Ehrh. ex Schrad. = *Sphagnum capillifolium* (Ehrh.) Hedw.  
*Sphagnum acutifolium* var. *deflexum* Schimp. = *Sphagnum capillifolium* (Ehrh.) Hedw.  
*Sphagnum brevifolium* (Lindb. ex Braithw.) Röhl = *Sphagnum fallax* (H. Klinggr.) H. Klinggr.



- Sphagnum compactum* var. *imbricatum* Warnst. = *Sphagnum compactum* Lam. & DC.  
*Sphagnum compactum* var. *squarrosulum* (Russow) Warnst. = *Sphagnum compactum* Lam. & DC.  
*Sphagnum cymbifolium* (Ehrh.) Hedw. = *Sphagnum palustre* L.  
*Sphagnum cymbifolium* var. *compactum* (Lam. & DC.) Schultz = *Sphagnum compactum* Lam. & DC.  
*Sphagnum cymbifolium* var. *squarrosulum* Nees & Hornsch. = *Sphagnum palustre* L.  
*Sphagnum girgensohnii* var. *strictum* Russow = *Sphagnum girgensohnii* Russow  
*Sphagnum klinggraeffi* Röhl *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Sphagnum palustre* L.  
*Sphagnum lescurii* Sull. in Gray = *Sphagnum auriculatum* Schimp.  
*Sphagnum magellanicum* var. *laxum* Röhl = *Sphagnum magellanicum* Brid.  
*Sphagnum nemoreum* Scop. = *Sphagnum capillifolium* (Ehrh.) Hedw.  
*Sphagnum obesum* (Wilson) Warnst. = *Sphagnum auriculatum* Schimp.  
*Sphagnum palustre* var. *pycnocladum* (Martenson) Röhl = *Sphagnum palustre* L.  
*Sphagnum plumulosum* Röhl = *Sphagnum subnitens* Russow & Warnst.  
*Sphagnum rigidum* (Nees & Hornsch.) Schimp. *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Sphagnum compactum* Lam. & DC.  
*Sphagnum rothii* Röhl. var. *tenue* Röhl = *Sphagnum angustifolium* (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen  
*Sphagnum rufescens* (Nees & Hornsch.) Warnst. = *Sphagnum auriculatum* Schimp.  
*Sphagnum schimperi* Röhl = *Sphagnum capillifolium* (Ehrh.) Hedw.  
*Sphagnum squarrosulum* var. *squarrosulum* Schimp. = *Sphagnum teres* (Schimp.) Ångstr.  
*Sphagnum subbicolor* Hampe = *Sphagnum palustre* L.  
*Sphagnum subsecundum* var. *robustum* (Warnst.) Cardot = *Sphagnum platyphyllum* (Lindb. ex Braithw.) Sull. ex Warnst.  
*Sphagnum teres* var. *squarrosulum* (Schimp.) Warnst. = *Sphagnum teres* (Schimp.) Ångstr.  
*Sphagnum teres* var. *strictum* Cardot = *Sphagnum teres* (Schimp.) Ångstr.  
*Sphagnum teres* var. *subteres* (Lindb.) Röhl = *Sphagnum teres* (Schimp.) Ångstr.  
*Sphagnum turgidum* Röhl *nom. illeg. incl. spec. prior.* = *Sphagnum auriculatum* Schimp.  
*Splachnum angustatum* Hedw. = *Tetraplodon angustatus* (Hedw.) Bruch & Schimp.  
*Streblotrichum convolutum* (Hedw.) P. Beauv. = *Barbula convoluta* Hedw. var. *convoluta*  
*Syntrichia laevipila* var. *laevipilaeformis* (De Not.) J.J. Amann = *Syntrichia laevipila* Brid.  
*Syntrichia ruraliformis* (Besch.) Mans. = *Syntrichia ruralis* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr var. *ruraliformis* (Besch.) Delogne  
*Systegium crispum* (Hedw.) Schimp. = *Weissia longifolia* Mitt.  
*Thamnum alopecurum* (Hedw.) Schimp. = *Thamnobryum alopecurum* (Hedw.) Gangulee  
*Thamnobryum alopecurum* var. *cavernarum* (Hedw.) Bruch & Schimp. = *Thamnobryum alopecurum* (Hedw.) Gangulee  
*Thuidium abietinum* (Hedw.) Schimp. = *Abietinella abietina* (Hedw.) M. Fleisch. var. *abietina*  
*Thuidium decipiens* De Not. = *Palustriella decipiens* (De Not.) Ochyra  
*Tortella densa* (Lorentz & Molendo) Crundw. & Nyholm = *Tortella inclinata* (R. Hedw.) Limpr. var. *densa* (Lorentz & Molendo) Limpr.  
*Tortula aloides* (Koch ex Schultz) De Not. = *Aloina aloides* (Koch ex Schultz) Kindb.  
*Tortula ambigua* (Bruch & Schimp.) Ångstr. = *Aloina ambigua* (Bruch & Schimp.) Limpr.  
*Tortula laevipila* (Brid.) Schwägr. = *Syntrichia laevipila* Brid.  
*Tortula laevipila* var. *laevipilaeformis* (De Not.) Limpr. = *Syntrichia laevipila* Brid.  
*Tortula montana* (Nees) Lindb. *hom. illeg.* = *Syntrichia montana* Nees  
*Tortula muralis* f. *incana* (Bruch & Schimp.) Sapjegin = *Tortula muralis* Hedw.  
*Tortula muralis* f. *obcordata* (Schimp.) Mönk. = *Tortula muralis* Hedw.  
*Tortula muralis* var. *obcordata* (Schimp.) Limpr. = *Tortula muralis* Hedw.  
*Tortula muralis* f. *rupestris* (A. Chev.) Sapjegin = *Tortula muralis* Hedw.  
*Tortula muralis* var. *rupestris* A. Chev. = *Tortula muralis* Hedw.  
*Tortula obtusifolia* Schwägr. = *Tortula muralis* Hedw. subsp. *obtusifolia* (Schwagr.) Culm.  
*Tortula papillosa* Wilson = *Syntrichia papillosa* (Wilson) Jur.

- Tortula princeps* De Not. = *Syntrichia princeps* (De Not.) Mitt.  
*Tortula revolvens* var. *obtusata* Reimers = *Tortula revolvens* (Schimp.) G. Roth.  
*Tortula ruraliformis* (Besch.) W. Ingham = *Syntrichia ruralis* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr var. *ruraliformis* (Besch.) Delogne  
*Tortula ruralis* (Hedw.) P. Gaernt, B. Mey. & Schreb. = *Syntrichia ruralis* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr var. *ruralis*  
*Tortula ruralis* subsp. *ruraliformis* (Besch.) Dixon = *Syntrichia ruralis* (Hedw.) F. Weber & D. Mohr var. *ruraliformis* (Besch.) Delogne  
*Tortula subulata* var. *integrifolia* (Boulay) Brizi = *Tortula schimperi* M.J. Cano, O. Werner & J. Guerra  
*Tortula tortuosa* Hedw. = *Tortella tortuosa* (Hedw.) Limpr.  
*Tortula unguiculata* (Hedw.) P. Beauv. nom. illeg. = *Barbula unguiculata* Hedw.  
*Tortula vinealis* (Brid.) Spruce = *Didymodon vinealis* (Brid.) R.H. Zander  
*Trichostomum brachydontium* var. *littorale* (Mitt.) C.E.O. Jensen = *Trichostomum brachydontium* Bruch  
*Trichostomum brachydontium* subsp. *mutabile* (Bruch) Giacom. = *Trichostomum brachydontium* Bruch  
*Trichostomum crispulum* subsp. *brevifolium* (Sendtn. ex Müll. Hal.) Giacom. = *Trichostomum crispulum* Bruch  
*Trichostomum crispulum* var. *brevifolium* (Sendtn. ex Müll. Hal.) Bruch & Schimp. = *Trichostomum crispulum* Bruch  
*Trichostomum crispulum* var. *viridulum* (Bruch) Dixon = *Trichostomum crispulum* Bruch  
*Trichostomum flavovirens* Bruch = *Tortella flavovirens* (Bruch) Broth. var. *flavovirens*  
*Trichostomum mutabile* Bruch = *Trichostomum brachydontium* Bruch  
*Trichostomum nitidum* (Lindb.) Schimp. = *Tortella nitida* (Lindb.) Broth.  
*Trichostomum tophaceum* Brid. = *Didymodon tophaceus* (Brid.) Lisa  
*Trichostomum triumphans* De Not. = *Pottiopsis caespitosa* (Bruch ex Brid.) Blockeel & A.J.E. Sm.  
*Trichostomum triumphans* var. *pallidisetum* (H. Müll.) Husn. = *Pottiopsis caespitosa* (Bruch ex Brid.) Blockeel & A.J.E. Sm.  
*Warnstorfia exannulata* (Schimp.) Loeske = *Sarmentypnum exannulatum* (Schimp.) Hedenäs  
*Webera albicans* (Wahlenb.) Schimp. = *Pohlia wahlenbergii* (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews var. *wahlenbergii*  
*Webera albicans* var. *glacialis* (Brid.) Schimp. = *Pohlia wahlenbergii* (F. Weber & D. Mohr) A.L. Andrews var. *glacialis* (Brid.) E.F. Warb.  
*Webera annotina* (Hedw.) Bruch in Schwägr. = *Pohlia annotina* (Hedw.) Lindb.  
*Webera carnea* Schimp. = *Pohlia melanodon* (Brid.) A.J. Shaw  
*Webera commutata* Schimp. = *Pohlia drummondii* (Müll. Hal.) A.L. Andrews  
*Webera commutata* var. *gracilis* (Bruch & Schimp.) Schimp. = *Pohlia filum* (Schimp.) Martensson  
*Webera cruda* (Hedw.) Fürnr. = *Pohlia cruda* (Hedw.) Lindb.  
*Webera gracilis* (Bruch & Schimp.) De Not. = *Pohlia filum* (Schimp.) Martensson  
*Webera nutans* Hedw. = *Pohlia nutans* (Hedw.) Lindb.  
*Webera polymorpha* Hoppe & Hornsch. = *Pohlia elongata* Hedw. var. *greeni* (Brid.) A.J. Shaw  
*Weissia viridula* Hedw. ex Brid. nom. illeg. incl. spec. prior. = *Weissia controversa* Hedw. var. *controversa*  
*Zieria julacea* Schimp. nom. illeg. incl. spec. prior. = *Ptychostomum zieri* (Dicks. ex Hedw.) Holyoak & N. Pedersen

## Bibliografia

- Aleffi M (2005) New Check-list of the *Hepaticae* and *Anthocerotae* of Italy. Fl. Medit. 15: 485-566.
- Aleffi M (2016) La flora briofitica dei Gessi dell'Emilia-Romagna. Sottoterra 143: 21-27.
- Aleffi M, Pellis G, Puglisi M (2014) The bryophyte flora of six gypsum outcrops in the Northern Apennines (Nature 2000 Network, Emilia Romagna Region, Italy). Plant Biosyst. 148(4): 825-836.
- Aleffi M & Schumacker R (1995) Check-list and red list of the liverworts (*Marchantiophyta*) and hornworts (*Anthocerotophyta*) of Italy. Fl. Medit. 5: 73-161.
- Aleffi M & Silenzi AR (2000) Flora briologica degli affioramenti gessosi del Parco Regionale "Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa" (Emilia-Romagna). Arch. Geobot. 6(1): 1-16.
- Aleffi M, Tacchi R, Cortini-Pedrotti C (2008) Check-list of the Hornworts, Liverworts and Mosses of Italy. Bocconeia 22: 1-256.
- Avetta C (1897) Flora crittogamica della Provincia di Parma. Malpighia 11: 181-197.
- Barsali E (1907) Censimento delle epatiche toscane. Nuovo Giorn. Bot. Ital. n.s. 14: 5-49.
- Barsali E (1914) Frammenti d'epaticologia italiana. Bull. Soc. Bot. Ital. 5: 41-44.
- Bassi S (2007) Gli habitat di interesse comunitario in Emilia-Romagna. Appendice alla carta degli Habitat, SIC e delle ZPS dell'Emilia-Romagna. Regione Emilia-Romagna. Bologna, 62 pp.
- Bertarelli LV (1916) Guida d'Italia del Touring Club Italiano 2. Milano, 440 pp.
- Bertolani Marchetti D (1959) La vegetazione dei fontanazzi modenesi. Webbia 15(1): 141-167.
- Bertoloni A (1859) Flora Italica cryptogama. Vol. 1. Bologna, 662 pp.
- Bertoloni G (1844) Iter in apenninum bononiensem. Bologna, 25 pp.
- Bertoloni G (1865) Notizie intorno alle piante spontanee dei Monti Porrettani. Mem. Reale Accad. Sci. Ist. Bologna 4: 1-70.
- Blom HH (1996) A revision of the *Schistidium apocarpum* complex in Norway and Sweden. Bryophytorum Bibliotheca 49. Berlin, 334 pp.
- Bonini I (2009) Contributo alla flora briologica della Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino (Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna) In: Bottacci (ed) La Riserva naturale integrale di Sasso Fratino 1959-2009. 50 di conservazione della biodiversità. CFS/UTB Pratovecchio, pp. 151-160.
- Bottini A (1913) Spigolature briologiche N. 2. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa Mem. 22: 149-195.
- Bottini A (1914) Spigolature briologiche N. 3. Atti Soc. Tosc. Sci. Nat. Pisa Mem. 23: 37-43.
- Bottini A (1919) Sfnologia italiana. Mem. Accad. Lincei. 13: 1-87.
- Bouvet E (2008) Studio dei biodeteriogeni delle architetture funerarie dell'Ottagono della Villetta (Parma). Tesi di Laurea. Università di Parma.
- Bracciforti A (1877) Flora Piacentina. Piacenza, 384 pp.
- Brizi U (1889) Addenda ad floram italicam. Contribuzione all'Epaticologia italiana. Malpighia 2: 414-425.
- Brizi U (1892-1894) Reliquie Notarisiane. I Muschi. Annuario Reale Ist. Bot. Roma 5: 5-37.
- Brullo S, Lo Giudice R, Privitera M (1991) Phytogeographical considerations on the psammophilous mosses from Mediterranean area. Botanika Chronika 10: 873-887.
- Casali C (1899a) Aggiunte alla flora crittogamica del Reggiano. Bull. Soc. Bot. Ital. 5/6: 93-96.
- Casali C (1899b) Le Briofite del Reggiano. Avellino, 35 pp.
- Castaldo R & Di Martino V (1968-1969) Le leucocisti di *Sphagnum recurvum* P. Beauv. studiate comparativamente al microscopio elettronico a scansione ed al microscopio elettronico a trasmissione. Delpinoa 10/11: 63-71.
- Cobau R (1932) Su la Flora dei "Gessi" bolognesi. Nuovo Giorn. Bot. Ital. n.s. 39(2): 313-345.
- Cocconi G (1881) Piante del Bolognese. In: Club Alpino Italiano (eds.) L'Appennino Bolognese. Descrizioni e itinerari. Bologna, pp. 448-772.
- Corbetta F (1973) Note illustrativa sull'alta Conca del Dardagna, Monti della Riva e Lago di Pratignano. Inform. Bot. Ital. 5: 133-136.
- Cortini-Pedrotti C (1992) Check-list of the Mosses of Italy. Fl. Medit. 2: 119-221.
- Cortini-Pedrotti C (2001) New Check-list of the Mosses of Italy. Fl. Medit. 11: 23-107.

- Crandall-Stotler B, Stotler RE, Long DG (2009) Morphology and classification of the *Marchantiophyta*. In: Goffinet B & Shaw AJ (eds) Bryophyte Biology 2nd edition. Cambridge, pp. 1-54.
- Credaro V, Ferrari C, Pirola A, Speranza M, Ubaldi D (1980) Carta della vegetazione del crinale appenninico dal Monte Giovo al Corno alle Scale (Appennino Tosco-Emiliano). C.N.R. Collana del programma finalizzato "Promozione della qualità dell'ambiente" AQ/1/81. Roma, 30 pp.
- Crundwell AC & Nyholm E (1974) *Funaria muhlenbergii* and related European species. *Lindbergia* 2: 222-229.
- Crundwell AC & Nyholm E (1977) *Dicranella howei* Ren. & Card. and its relationship to *D. varia* (Hedw.) Schimp. *Lindbergia* 4: 35-38.
- Cuccuini P (1997) L'Erbario crittogamico italiano: storia e struttura di una collezione. Museo botanico dell'Università, Sezione del Museo di storia naturale. Firenze, 165 pp.
- Del Testa A (1903) Nuova contribuzione alla flora della Romagna. *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* n.s. 10: 234-265.
- Dia MG (1987) Note briogeografiche. V. Distribuzione ed ecologia di *Ulota crispa* (Hedw.) Brid. in Italia. *Cryptog. Bryol. Lichénol.* 8(3): 241-250.
- Dia MG & Raimondo FM (1984) Nomenclatural and taxonomic observations on "*Racomitrium marginatum*" Lojac. *Webbia* 38: 687-693.
- Dia MG & Raimondo FM (1986) Contributi alla brioflora sicula. III. *Inform. Bot. Ital.* 18: 113-116.
- Dismier G (1929) *Orthotrichum Shawii* Wils. nouveau pour l'Italie et *Cololejeunea Rossettiana* (Massal.) Schiffn. pour l'Algerie. *Rev. Bryol.* n.s. 2: 207-208.
- Düll R (1985) Zygodon in Europe and Macaronesia with special regard to Central Europe. *Abstracta Botanica* 9 suppl. 2: 45-54.
- Fariselli R (2015) Le Briofite della Pineta di Milano Marittima (Provincia di Ravenna). *Quad. Studi Nat. Romagna* 41: 45-56.
- Fariselli R, Speranza M, Aleffi M (2017) Bryological flora of the regional historic Park of Monte Sole (Emilia-Romagna, Italy). *Ital. Bot.* 3: 99-108.
- Farneti R (1889) Enumerazione dei muschi del bolognese. Prima centuria. *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 21: 381-388.
- Ferrari C (1974) La vegetazione delle rupi gessose di Miserazzano e della Croara (Bologna). *Notiz. Fitosoc.* 8: 65-74.
- Ferrari C (2002a) Carta della vegetazione 1:25.000 con itinerari naturalistici. Alto Appennino reggiano (Fogli Est e Ovest). Servizio Cartografico e Geologico, Regione Emilia-Romagna. Bologna.
- Ferrari C (2002b) Carta della vegetazione 1:25.000 con itinerari naturalistici. Alta Val Parma e Cedra. Servizio Cartografico e Geologico, Regione Emilia-Romagna. Bologna.
- Ferrari C, Guido M, Montanari C, Accorsi CA (1981) La vegetazione attuale del Lago di Pratignano con carta della vegetazione 1:3500 In AAVV: L'alta Valle del Panaro Vol. II. Modena, pp. 76-85.
- Ferrarini E (1982) Carta della vegetazione dell'Appennino Tosco-Emiliano dal Passo della Cisa al Passo delle Radici. Note illustrative. *Boll. Mus. St. Nat. Lunig.* 2: 5-26.
- Fiori A (1884) Primo contributo alla flora briologica del Modenese e del Reggiano. *Atti Soc. Naturalisti Modena Rend.* 2: 157-158.
- Fiori A (1886) Muschi del Modenese e del Reggiano. Ia Contribuzione. *Atti Soc. Naturalisti Modena Mem.* 5: 127-179.
- Fiori A (1892a) Rivista statistica dell'Epaticologia Italiana. Primo elenco delle Epatiche del Modenese e Reggiano. *Malpighia* 6: 41-49.
- Fiori A (1892b) Seconda contribuzione alla Briologia Emiliana. *Malpighia* 6: 564-570.
- Fitzgerald C & Bottini A (1881) Prodrómo della briologia dei bacini del Serchio e della Magra. *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 13: 23-121.
- Geheeb A (1883) Bryologische Fragmente II. *Flora* 66: 483-491.
- Gerdol R & Piccoli F (1984) Sand dune vegetation in the Po Delta (N-Italy). *Ecol. Medit.* 10(3/4): 119-131.
- Gerdol R & Tomaselli M (1988) Phytosociology and ecology of stream vegetation in the summit region of the northern Apennines. *Boll. Mus. St. Nat. Lunig.* 6/7: 89-93.
- Gerdol R & Tomaselli M (1993) The vegetation of wetlands in the northern Apennines (Italy). *Phytocoenologia*

21(4): 421-469.

- Giacomini V (1950) Ricerche sulla flora briologica xerotermitica delle Alpi Italiane. *Vegetatio* 3: 1-123.
- Goffinet B, Buck WR, Shaw AJ (2009) Morphology, anatomy, and classification of the *Bryophyta*. In: Goffinet B & Shaw AJ (eds) *Bryophyte Biology* 2nd edition. Cambridge, pp. 55-138.
- Lange MT (1868) Toscanke Mosser et Bryologisk Bidrag. *Bot. Tidsskr.*: 226-254.
- Lange MT (1875) Sui muschi di Toscana. *Notizie briologiche. Nuovo Giorn. Bot. Ital.* 7: 118-147.
- Lazzari G, Merloni N, Saiani D (2007) Flora di Punte Alberete-Valle Mandriole. Parco Delta del Po. Quaderni dell'IBIS n. 1. Ravenna, 31 pp.
- Lazzari G, Merloni N, Saiani D (2008) Flora della Bassa del Bardello e delle dune litoranee di Ravenna. Parco Delta del Po. Quaderni dell'IBIS n. 2. Ravenna, 40 pp.
- Lazzari G, Merloni N, Saiani D (2009) Flora delle Riserve Naturali dello Stato nell'area costiera di Ravenna. Quaderni dell'IBIS n. 3. Ravenna, 47 pp.
- Levier E (1901) Sfagni italiani determinati dal Sig. C. Warnstorff. *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* n.s. 8: 75-86.
- Levier E (1905) Appunti di briologia italiana. Primo elenco (muschi frondosi). *Bull. Soc. Bot. Ital.* 3/4: 115-125.
- Limpricht KG (1904) Die Laubmoose Deutschlands, Österreichs und Schweiz unter Berücksichtigung der übrigen Länder Europas u. Sibiriens In: Rabenhorst I (ed) *Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz*. 2 Auflage, IV, Abteilung III. Leipzig, 864 pp.
- Massalongo C (1895) Le specie italiane del genere *Jungermannia*. Monografia. *Atti Soc. Veneto-Trentina Sci. Nat.* 6: 1-45.
- Massalongo C (1902) Le specie italiane del genere *Scapania*. Monografia. *Malpighia* 16: 393-438.
- Massalongo C (1903) Le epatiche dell'Erbario Crittogamico Italiano. *Comun. Accad. Sci. Med. Nat. Ferrara* 1-20.
- Massalongo C (1912) Le Ricciaceae della flora italica. *Atti Ist. Veneto* 71 (5): 823-892.
- Massalongo C (1916) Le "Marchantiacee" della Flora Europea. Monografia. *Atti Ist. Veneto* 75: 669-757.
- Merloni N & Piccoli F (2001) La vegetazione del complesso Punte Alberete e Valle Mandriole (Parco Regionale del Delta del Po). *Braun-Blanquetia* 29: 1-17.
- Müller K (1906-1916) Die Lebermoose Deutschlands, Österreichs und Schweiz mit Berücksichtigung der übrigen Länder Europas In: Rabenhorst I (ed) *Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz*. 2 Auflage, VI, Abteilung I-II. Leipzig.
- Nowak H & Poelt J (1979) Zur Systematik, Morphologie und Verbreitung von *Grimmia tergestina* (*Musci, Grimmiaceae*). *Willdenowia* 9: 111-129.
- Pellis G, Pezzi G, Velli A, Aleffi M (2014) Notuale crypogamicae 8 (51-60). *Inform. Bot. Ital.* 46(1): 87-92.
- Piccoli F (1976) Flora e vegetazione delle casse di espansione di Campotto e Valle Santa (Ferrara). *Lav. Soc. Ital. Biogeogr.* 6: 231-262.
- Piccoli F (1977) Le infestanti delle risaie ferraresi. *Agric. Ferrarese* 82: 179-186.
- Piccoli F & Gerdol R (1979) La vegetazione di alcune zone umide del bolognese. *Ann. Univ. Ferrara n.s.* 2: 83-98.
- Piccoli F & Gerdol R (1981) Rice-field weed communities in Ferrara Province (Northern Italy). *Aquatic Bot.* 10: 317-328.
- Piccoli F, Gerdol R, Ferrari C (1983) Carta della vegetazione del Bosco della Mesola (Ferrara). *Atti Ist. Bot. Lab. Crittog. Univ. Pavia* 2: 3-23.
- Piccoli F & Merloni N (1989) Vegetation dynamics in coastal wetlands. An example in Northern Italy: the Bardello. *Ecol. Medit.* 15(1/2): 81-95.
- Pichi P & Bottini A (1888) Prime muscinee dell'Appennino casentino. *Bull. Soc. Bot. Ital.* 20: 321-329.
- Podpera J (1903) Miscellen zur Kenntnis der europäischen arten Gattung *Bryum*. *Beih. Bot. Centralbl.* 15: 483-492.
- Pollini C (1824) *Flora veronensis*. Verona, 898 pp.
- Provasi T (1926) Osservazioni e ricerche sulla vegetazione di alcuni laghetti dell'Appennino tosco-emiliano. *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* n.s. 33: 681-725.
- Provasi T (1938) Florula dei laghetti dell'Appennino parmense e reggiano. *Nuovo Giorn. Bot. Ital.* n.s.

- 45(2): 1-36.
- Quelle F (1906) *Barbula Fiorii*, ein Charaktermoos mitteldeutscher Gipsberge. Hedwigia 45: 289-297.
- Raffaelli M (1971) Osservazioni ecologiche sulla vegetazione igrofila di un laghetto del Monte Fumaiolo (Appennino romagnolo). Webbia 26(1): 211-236.
- Raffaelli M (1973) Il genere "*Andreaea*" Hedw. in Italia. Distribuzione, caratteri distintivi e chiave analitica delle specie. Webbia 28(1): 1-30.
- Raffaelli M (1976) Gli Sfagni Tosco-Emiliani. Webbia 30(1): 159-175.
- Raffaelli M, Mori Secci M, Mariotti Lippi M, Fiorini G (1997) Indagini floristico-vegetazionali e actuopalinologiche sul Lago Baccio e sul Lago del Greppo (Appennino Tosco-Emiliano). Webbia 51(2): 201-235.
- Raimondo FM & Dia MG (1978) Note briogeografiche. I. Il genere *Sphagnum* L. in Sicilia. Naturalista Sicil. 2(3/4): 109-126.
- Raimondo FM & Dia MG (1978-1979) Note briogeografiche. II. *Cryphaea heteromalla* (Hedw.) Mohr in Sicilia. Atti Accad. Sci. Lett. Arti Palermo 38: 153-171.
- Raimondo FM, Scialabba A, Dia MG (1980) Note briogeografiche. III. Distribuzione in Italia di *Aulacomnium palustre* (Hedw.) Schwaegr. ed ecologia della specie nelle stazioni siciliane. Naturalista Sicil. 4(3/4): 79-99.
- Razzara S (1980) Note floristiche e fitogeografiche sulla florula muscinale palustre del Passo della Cappelletta – Borgo Val di Taro (Appennino parmense). Atti V Convegno Gruppo "G. Gadio" Ecologia delle acque interne dell'Italia settentrionale. Varese, pp. 141-147.
- Razzara S (1981) Primo contributo alla florula muscinale dell'Alte Valli del Taro e del Ceno (Appennino Parmense). Giorn. Bot. Ital. 115: 166-167.
- Re F (1798) Viaggio al monte Ventasso ed alle terme di Quara nel reggiano. Parma, 36 pp.
- Ros RM, Mazimpaka V, Abou-Salama U, Aleffi M, Blockeel TL, Brugués M, MJ Cano, Cros RM, Dia MG, Dirkse GM, El-Saadawi W, Erdag A, Ganeva A, Gabriel R, González-Mancebo JM, Herrnstadt I, Khalil K, Kürschner H, Lanfranco E, Losada-Lima A, Refai MS, Rodriguez-Nunez S, Sabovljevic M, Sérgio C, Shabbara HM, Sim-Sim M, Soderstrom L (2007) Hepatics and Anthocerotales of the Mediterranean, an annotated Check List. Cryptog. Bryol. 28(4): 351-437.
- Ros RM, Mazimpaka V, Abou-Salama U, Aleffi M, Blockeel TL, Brugués M, Cros RM, Dia MG, Dirkse GM, Draper I, El-Saadawi W, Erdag A, Ganeva A, Gabriel R, González-Mancebo JM, Granger C, Herrnstadt I, Hugonnot V, Khalil K, Kürschner H, Losada-Lima A, Luís L, Mifsud S, Privitera M, Puglisi M, Sabovljevic M, Sérgio C, Shabbara HM, Sim-Sim M, Sotiaux A, Tacchi R, Vanderpoorten A, Werner O (2013) Mosses of the Mediterranean: an annotated Check List. Cryptog. Bryol. 34(2): 99–283.
- Rossetti C (1893) Aggiunte alla Epaticologia Italiana (Nota preventiva). Atti Congr. Bot. Int. Genova 234-237.
- Rossi G & Ferrari C (1994) A guide to the excursion to Mount Prado, northern Apennine, Italy (27 June 1992). Fitosociologia 26: 201-209.
- Sanesi G (1962) Osservazioni sulle caratteristiche e l'evoluzione dei suoli della Foresta di Campigna (Forlì). Relazioni con la vegetazione forestale. Ann. Accad. Ital. Sci. Forest. 11: 97-137.
- Sburlino G, Marchiori S, Razzara S (1980) La vegetazione delle zone umide del Passo della Cappelletta (Borgo Val di Taro – PR). Atti V Convegno Gruppo "G. Gadio" Ecologia delle acque interne dell'Italia settentrionale. Varese, pp. 129-139.
- Schimper WP (1876) Synopsis muscorum europaeorum praemissa introductionae de elementis bryologicis tractante. Vol. II. Stuttgart, 886 pp.
- Tomaselli M (1991) The snow-bed vegetation in the Northern Apennines. Vegetatio 94: 177-189.
- Tomaselli M & Agostini N (1990) Vegetation patterns and dynamics on a rock glacier in the northern Apennines. Pirineos 136: 33-46.
- Tomaselli M & Gerdol R (1983) Analisi e valutazione fitogeografico-ecologica della distribuzione di alcune entità appartenenti alla flora igrofila dell'Alto Appennino Tosco-Emiliano. Atti Ist. Bot. Lab. Crittog. Univ. Pavia 2: 107-146.
- Tomaselli M, Manzini ML, Del Prete C (1994) Carta della vegetazione 1:25.000 con itinerari naturalistici.

- Parco regionale dell'Alto Appennino modenese (Fogli Est e Ovest). Servizio Cartografico e Geologico, Regione Emilia-Romagna. Bologna.
- Tomaselli M, Rossi G, Manzini ML, Del Prete C (2002) Carta della vegetazione 1:25.000 con itinerari naturalistici. Parco regionale del Corno alle Scale. Servizio Cartografico e Geologico, Regione Emilia-Romagna. Bologna.
- Velluti C (1993) Contributo all'analisi fitogeografica dei faggeti e della vegetazione ipsofila del versante padano dell'Appennino settentrionale. Piante vascolari, briofite, licheni. Tesi di Dottorato di Ricerca in "Geobotanica", VI Ciclo. Pavia
- Venturi G (1885a) Notes sur le genre *Pottia*. Rev. Bryol. 12: 51-55.
- Venturi G (1885b) Nouveautés bryologiques. Rev. Bryol. 12: 65-67.
- Venturi G (1886) Alcuni appunti sopra varie specie di muschi italiani. Nuovo Giorn. Bot. Ital. 18: 67-74.
- Venturi G (1899) Le muscinee del Trentino. Trento, 107 pp.
- Venturi G & Bottini A (1884) Enumerazione critica dei muschi italiani. Atti Soc. Crittog. Ital. 3: 153-227.
- Zangheri P (1925) Il naturalista forlivese p. Cesare Majoli (1746-1823) e la sua opera "Plantarum collectio". Nuovo Giorn. Bot. Ital. n.s. 32(2): 115-205.
- Zangheri P (1959) Flora e vegetazione della fascia gessoso-calcareo del basso Appennino romagnolo. Webbia 14(2): 243-595.
- Zangheri P (1966a) Flora e vegetazione del medio e alto Appennino Romagnolo. Webbia 21: 1-450.
- Zangheri P (1966b) Repertorio sistematico e topografico della Flora e Fauna vivente e fossile della Romagna. Memorie Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Verona, 480 pp.
- Zodda G (1921) Cenni sulle briofite forlivesi. Bull. Soc. Bot. Ital. 5: 49-52.
- Zodda G (1934) Flora Italica Cryptogama, IV. Bryophyta, Hepaticae. Rocca San Casciano, 330 pp.



*Check List delle Briofite dell'Emilia-Romagna offre una sintesi delle conoscenze in merito alla distribuzione delle briofite in Emilia-Romagna sulla base dei dati disponibili nei lavori pubblicati fino al 2017. Si è costruito un database di oltre 7300 record di cui 6900 effettivamente utilizzati nella compilazione della Check List. Vengono qui riportati gli elenchi delle specie segnalate (epatiche e muschi) suddivise secondo le diverse provincie. All'interno degli elenchi, per ogni segnalazione si indica la località di rinvenimento. Sulla base dei dati disponibili sono presenti in Emilia-Romagna 546 taxa (comprendenti specie, sottospecie e varietà) di cui 87 epatiche e 459 muschi.*